

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして検査所要日数、基準値を変更いたしますので謹んでご案内申し上げます。

ご利用の先生方には大変ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ■ 検査内容変更理由及び実施日

外部委託に変更のため、2020年6月1日(月)ご依頼分より変更  
委託先: エスアールエル

#### ■ 対象項目および変更内容

別紙ご参照ください

以上

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL: 075-631-6230

## ■対象項目および変更内容

コード	検査項目名称	所要日数		基準値		検査案内 掲載ページ (2020年度版)
		新	現行	新	現行	
3367	トリプシン	3~5	2~3	変更なし	100~550 (ng/mL)	P1
0807	M2BPGi (Mac-2 結合蛋白 糖鎖修飾異性体)	3~5	2	陰性(-):1.00 未満 陽性(1+):1.00~3.00 未満 陽性(2+):3.00 以上 (C.O.I)	陰性(-):1.00 未満 陽性(1+):1.00~2.99 陽性(2+):3.00 以上 (C.O.I)	P4
3022	尿 $\alpha$ 1-マイクログロブ リン( $\alpha$ 1-MG)	3~5	1~2	M 1.0~15.5 F 0.5~9.5 (mg/L)	M 0.8~14.1 F 0.5~7.0 (mg/L)	P4
3012	アポリポ 蛋白A I	3~5	1~2	変更なし	M 119~155 F 126~165 (mg/dL)	P6
3013	アポリポ 蛋白A II	3~5	1~2	変更なし	M 25.9~35.7 F 24.6~33.3 (mg/dL)	P6
3014	アポリポ 蛋白B	3~5	1~2	変更なし	M 73~109 F 66~101 (mg/dL)	P6
3015	アポリポ 蛋白C II	3~5	1~2	変更なし	M 1.8~4.6 F 1.5~3.8 (mg/dL)	P6
3016	アポリポ 蛋白C III	3~5	1~2	変更なし	M 5.8~10.0 F 5.4~9.0 (mg/dL)	P6
3017	アポリポ 蛋白E	3~5	1~2	変更なし	M 2.7~4.3 F 2.8~4.6 (mg/dL)	P6
0426	ミトコンドリア AST (m-AST)(m-GOT)	3~5	1~2	7 以下 (U/L)	0~5 (U/L)	P9
0699	血清浸透圧	3~5	2	276~292 (mOsm/Kg $\cdot$ H <sub>2</sub> O)	270~295 (mOsm/Kg $\cdot$ H <sub>2</sub> O)	P10
0799	尿浸透圧	3~5	2	濃縮時 850 以上 希釈時 40~85 (Fishberg 試験時) (mOsm/Kg $\cdot$ H <sub>2</sub> O)	50~1300 (mOsm/Kg $\cdot$ H <sub>2</sub> O)	P10
3328	エリスロポエチン	3~5	2	変更なし	4.2~23.7 (mIU/mL)	P11
3259	TRACP-5b(骨型酒石 酸抵抗性 ACP)	3~5	3	M 170~590 F(YAM:若年者成人 平均値) 120~420 (mU/dL)	M 170~590 F 120~420 (mU/dL)	P12
4035	BAP(骨型アルカリフォスファ ターゼ)	3~5	2	変更なし	M 3.7~20.9 F 閉経前 2.9~14.5 F 閉経後 3.8~22.6 ( $\mu$ g/L)	P12

## ■対象項目および変更内容

コード	検査項目名称	所要日数		基準値		検査案内 掲載ページ (2020年度版)
		新	現行	新	現行	
3479	シアル化糖鎖抗原 KL-6	3~5	1~2	500 未満 (U/mL)	500 以下 (U/mL)	P12 ※1
3392	ヒト心房性ナトリウム利 尿ペプチド(HANP)	3~5	2~4	43.0 以下 (pg/mL)	43 以下 (pg/mL)	P24
1491	HA抗体 (HAAb)	3~5	1~2	(-)1.00 未満 (+)1.00 以上(S/CO)	(-)1.00 未満(S/CO)	P34
1494	IgMHA抗体 (IgM HAAb)	3~5	1~2	変更なし	(-)0.80 未満 (±)0.80~1.20 (+)1.21 以上 (S/CO)	P34
1543	高感度HCV コア抗原	3~5	1~2	変更なし	3.0 未満 (fmol/L)	P35 ※2
3079	ヒト TARC 定量 (Th2 ケモカイン)	3~5	2	変更なし	小児(6~12ヶ月): 1367 未満 小児(1~2歳): 998 未満 小児(2歳以上): 743 未満 成人:450 未満 (pg/mL)	P39
3804	単純ヘルペス IgG(EIA)	3~5	2~5	2.0 未満 陰性	(-)	P46
0305	トロンボテスト	3~5	1~2	変更なし	70 以上 (%)	P65
3628	便中ヘリコバクター ピロリ抗原	3~5	2~3	陰性	(-)	P76 ※3

※1 3479:シアル化糖鎖抗原KL-6 検査方法の変更 (新)CLEIA法、(現行)ラテックス凝集比濁法

※2 1543:高感度HCVコア抗原 検体量の変更 (新)血清 0.8mL (現行)血清 0.4mL

※3 3628:便中ヘリコバクターピロリ抗原に関しては容器が「K:生便」より下記専用容器へ変更となります。

K3:便中ヘリコバクターピロリ抗原専用容器

