

検査案内 2026-2027



索引
ご利用の手引き

内分泌学的検査
腫瘍関連検査

ウイルス感染症検査

免疫学的検査

アレルギー検査

生化学的検査

血液学的検査

一般検査
微生物学的検査


薬物検査

細胞性免疫検査

病理学的検査
細胞診検査
アミノ酸解析サービス

緊急報告検査値範囲
検査方法の概略
参考文献一覧

専用容器の
取り扱い方法



プライバシーマーク



医療関連サービスマーク



公益財団法人日本適合性
認定協会 (JAB)

個人情報保護方針

株式会社日本医学臨床検査研究所（以下、「当社」といいます。）は、健康で豊かな社会づくりに貢献するという経営理念のもと、臨床検査事業を柱とした様々な医療関連サービスを提供しております。近年、患者様尊重の視点に立った質の高い医療の提供が求められるとともに、医療にまつわる情報開示やIT化に伴う特定個人情報を含めた個人情報（以下、「個人情報」と記す）保護の重要性について、社会の関心がますます高まる中、ステークホルダーの皆様からお預かりした個人情報の保護は当社の社会的責務であり、また事業活動の基本と考えております。当社では、個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、個人情報保護マネジメントシステムを確立し、全従業員に個人情報保護の重要性を認識させるとともに、個人情報の安全管理措置を周知徹底することをもって、個人情報の漏えい、滅失またはき損を防止し、個人情報の保護に邁進することを宣言いたします。

「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項

<https://www.jcl.co.jp/privacy>

■当社が取扱う個人情報の利用目的、共同利用者、第三者提供、開示等の請求に関する事項、安全管理措置に関する事項、苦情及び相談の申出先、認定個人情報保護団体の名称及び苦情の申出先につきましては、当社ホームページの上記「公表事項」をご覧ください。

1. 個人情報保護に関する法令等の遵守について

当社は、個人情報を取り扱う際に、「個人情報の保護に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」をはじめとする法令や、国が定める指針その他の規範を遵守します。

2. 個人情報の適切な取り扱いの実施

当社は、事業活動において必要な範囲内で個人情報の利用目的を明確に定め、適切に個人情報の取得、利用、提供を行います。取得した個人情報は利用目的の範囲内に限定して利用し、目的外での利用を行わないための措置を講じます。

3. 個人情報の安全性の確保について

当社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等のリスクに対して合理的な安全対策および是正措置を講じます。

4. 個人情報の取り扱いに関する開示等の請求、苦情について

当社は、ご本人様からの個人情報の開示、訂正、削除、利用停止等の請求および苦情等に対して誠実かつ迅速に対応いたします。

5. 継続的改善について

当社は個人情報保護マネジメントシステムを実施し管理する責任者を定め、自らの規定する点検、会議体における討議、社長による見直しなどをもって、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な改善・向上に努めます。

2005年4月1日 制定

2022年9月20日 最終改訂

株式会社 日本医学臨床検査研究所

京都府久世郡久御山町大橋辺16番地10

代表取締役社長 勝間田 清人

■当社個人情報保護方針に関するお問い合わせ先

当社ホームページの「お問い合わせ」フォームにて、当社までご連絡ください。

<https://www.jcl.co.jp/contact>

2026～2027 総合検査案内

目次

索引 ご利用の手引き	索引 2 ご利用の手引き 19	
内分泌学的検査 腫瘍関連検査	視床下部・下垂体関連検査 ... 24 甲状腺関連検査 25 副甲状腺関連検査 26 副腎髄質関連検査 27 副腎皮質関連検査 28	性腺・胎盤関連検査 29 膵・消化管関連検査 31 心臓関連検査 31 その他 32 腫瘍関連検査 33
ウイルス感染症検査	抗体検査 36 抗原検査 44 HTLV-I検査 49 HIV検査 49	肝炎ウイルス検査 52
免疫学的検査	感染症抗体検査 55 感染症抗原検査 56 感染症関連検査 58 自己免疫関連検査 61	免疫血液学的検査 66 免疫グロブリン 67 補体 67 血漿蛋白 68
アレルギー検査	アレルギー検査 71	
生化学的検査	蛋白・膠質反応 74 酵素関連物質 75 低分子窒素化合物 78 糖質関連物質 80 有機酸 81 脂質関連物質 82 ビタミン 86	電解質 88 生体微量金属 89 生体色素 89 ポリフィリン 90 毒物・産業医学 91 その他 92 クリアランス・機能試験 94
血液学的検査	血液一般・形態検査 95 血小板活性化検査 96 凝固系一般検査 97 凝固因子検査 97	凝固・線溶系検査 98
一般検査 微生物学的検査	尿一般検査 100 糞便検査 101 髄液検査・その他 102 検査材料および採取方法 103 一般細菌 104	抗酸菌 105 一般細菌特殊検査 106 薬剤感受性標準セット 107 薬剤略号一覧 107
薬物検査	抗てんかん剤 108 精神神経用剤 110 強心剤 110 不整脈用剤 111	抗生物質製剤 113 抗真菌剤 113 その他 114
細胞性免疫検査	細胞性免疫検査 116	
病理学的検査 細胞診検査 アミノ酸解析サービス	病理組織検査 117 病理標本作製 117 細胞診検査 118 AIRS・AICS 119	
緊急報告検査値範囲 検査方法の概略 参考文献一覧	緊急報告検査値範囲 121 検査方法の概略 122 参考文献一覧 125	
専用容器の取り扱い方法	専用容器の取り扱い方法 140	

五十音

ア	ページ	診療報酬区分	実施料
亜鉛 (Zn)	89	D007 36	132
(α_1)アシドグリコブロテイン	68		
アスコルビン酸(ビタミンC)	86	D007 59	296
アスピリン→サリチル酸	114	B001 02	特
アスペノン→アブリンジン	112	B001 02	特
アスペルギルス抗原	59	D012 32	157
アスペルギルス抗体IgG	59	D012 62	390
アセタゾラミド	109	B001 02	特
(抗)アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)	64	D014 44	752
アセトアミノフェン	114	D007 46	180
アセトン定量	81		
アディポネクチン(LA)	32		
アデノウイルス(CF) (NT)	36	D012 11 イ	79
アデノウイルスDNA定性	45		
アデノシンデアミナーゼ(ADA)	77	D007 11	32
アトピー鑑別試験(12種吸入性アレルギー)	71	D015 20	194
アブリンジン	112	B001 02	特
アポリポ蛋白A- I	85	D007 10 イ	31
アポリポ蛋白A- II	85	D007 10 イ	31
アポリポ蛋白B	85	D007 10 イ	31
アポリポ蛋白C- II	85	D007 10 イ	31
アポリポ蛋白C- III	85	D007 10 イ	31
アポリポ蛋白E	85	D007 10 イ	31
アミオダロン	112	B001 02	特
アミカシン	113	B001 02	特
アミカマイシン→アミカシン	113	B001 02	特
アミサリン→プロカインアミド	111	B001 02	特
アミノ酸分析2種類(チロシン・フェニルアラニン) [LC/MS]	79	D010 04 イ+D010 04 イ	279+279
アミノ酸分析(39種類, 9種類) [LC/MS]	79	D010 04 □	1074
アミノ酸分析(41種類)	79	D010 04 □	1074
アミラーゼ(AMY)	75	D007 01	11
アミラーゼアイソザイム	75	D007 14	48
(P型)アミラーゼ定量	75	D007 14	48
(血清)アミロイドA蛋白(SAA)	69	D015 06	47
アルカリフォスファターゼ(ALP) IFCC	76	D007 01	11
(骨型)アルカリフォスファターゼ(BAP)	26, 76, 93	D008 27	157
アルカリフォスファターゼアイソザイム→ALPアイソザイム	76	D007 14	48
アルドステロン(CLEIA)	28	D008 15	122
アルドステロン(CLEIA)/レニン活性比	32	D008 15+D008 08	122+100
アルドステロン(CLEIA)/レニン濃度比	32	D008 15+D008 09	122+102
アルドラーゼ	76	D007 01	11
アルファフェトプロテイン定量	33	D009 02	98・腫2
アルブミン(AIb)	68, 74	D007 01	11
(尿中)アルブミン	68, 74	D001 10	99
(尿中)アルブミン(クレアチニン換算値)	68, 74	D001 10	99
アルブミン・グロブリン比(A/G比)	74		
アルベカシン	113	B001 02	特

ア	ページ	診療報酬区分	実施料
アルミニウム(AI)	92	D007 29	109
アレピアチン→フェニトイン	108	B001 02	特
アンカロン→アミオダロン	112	B001 02	特
アンギオテンシン I 転換酵素(ACE)	77	D007 38	136
(α_1)アンチトリプシン	68	D006 10	80
アンチトロンビン(AT)	98	D006 09	70
アンチプラスミン(α_2 プラスミンインヒビター)	98	D006 17	128
アンモニア	78	D007 16	50

イ	ページ	診療報酬区分	実施料
イーケブラ→レベチラセタム	109	B001 02	特
(尿中)一般検査	100	D000	★26
(一般細菌)培養同定(口腔, 気道, 呼吸器)	104	D018 01	180
(一般細菌)培養同定(消化器)	104	D018 02	200
(一般細菌)培養同定(泌尿器, 生殖器)	104	D018 04	190
(一般細菌)培養同定(血液, 穿刺液)	104	D018 03	240
(一般細菌)培養同定(その他部位)	104	D018 05	180
(一般細菌)嫌気性菌培養	104	D018 注1	137
(一般細菌)感受性検査	104	D019 01/02/03	特・腫2・腫3
イヌリン定量[酵素法]	92	D007 32	120
(抗)胃壁細胞抗体	63		
イマチニブ	114	B001 02	特
インスリン	31	D008 08	100
インスリン抗体	31	D014 06	107
インスリン様成長因子→IGF- I (ソマトメジン-C)SDスコア	24	D008 42	212
インタクトPTH→副甲状腺ホルモン(PTH)-インタクト	26	D008 29	161
インデラル→プロプラノロール	112		
インフルエンザウイルス(CF) [HI]	37	D012 11 ト・チ	79
インプロメノ→プロムベリドール	110	B001 02	特

ウ	ページ	診療報酬区分	実施料
ウイルス同定	44		
ウイルス分離	44		
ウロボルフィリン(血中)	90		
ウロビリノーゲン(尿一般定性検査)	100	D000	★26

エ	ページ	診療報酬区分	実施料
エクセgran→ソニサミド	109	B001 02	特
エコーウイルス	37, 38	D012 11 ホ	79
エステル型コレステロール(Echo)	82		
エストラジオール(E_2) (ECLIA)	29	D008 33	167
エタノール	92	D007 26	105
エトスクシミド	108	B001 02	特
エビリオプチマル→エトスクシミド	108	B001 02	特
エベロリムス	114	B001 02	特
(子宮頸管粘液中顆粒球)エラスターゼ	30	D004 08	113
エラスターゼ1	33, 75	D009 08	120・腫2

特：特定薬剤治療管理料

腫2：悪性腫瘍特異物質治療管理料

★：保険医療機関内で実施した場合のみ算定できます。

エ	ページ	診療報酬区分	実施料
エリスロポエチン	32	D008 41	209
エルタシン→ゲンタマイシン	113	B001 02	特
塩基性フェトプロテイン(BFP)	34	D009 17	150・腫2
塩酸/バンコマイシン→バンコマイシン	113	B001 02	特
(塩酸)ビルシカイニド	111	B001 02	特
エンテロウイルス	39		
エンドトキシン定量	58	D012 55	229

オ	ページ	診療報酬区分	実施料
黄体形成ホルモン(LH)	24	D008 12	105
黄体ホルモン→プロゲステロン	29	D008 23	139
オーム病クラミドフィラ(クラミジア)シタシ	55	D012 11 ネ	79
オステオカルシン	26	D008 25	153
オリゴクロナルバンド	67	D004 11	507

カ	ページ	診療報酬区分	実施料
外見(キサントクロミー)(髄液一般検査)	102	D004 04	77
ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)	34	D009 24	175・腫2
活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)	97	D006 07	29
カテコールアミン3分画	28	D008 29	161
カテコールアミン総	28	D008 37	184
カドミウム	92		
ガバベンチン	109	B001 02	特
カフィール→ジソピラミド	111	B001 02	特
可溶性IL-2レセプター	34	D009 36	438・腫2
可溶性フィブリンモノマー複合体(SFMC)	98	D006 11	93
可溶性メソテリン関連ペプチド	34	D009 20	220・腫2
(抗)ガラクトース欠損IgG抗体	61	D014 08	111
カリウム(K)	88	D007 01	11
(子宮頸管粘液中)顆粒球エラスターゼ	30	D004 08	116
カルシウム(Ca)	88	D007 01	11
(抗)カルジオリピン β_2 グリコプロテインI複合体抗体(抗CL・ β_2 GP I抗体)	62	D014 28	223
(抗)カルジオリピンIgG抗体	62	D014 29	226
(抗)カルジオリピンIgM抗体	62	D014 29	226
カルシトニン	26	D008 18	127
カルニチン分画	87	D007 23+D007 23	95+95
カルバマゼピン	108	B001 02	特
肝細胞増殖因子(HGF)	32	D007 53	227
カンジダマンナン抗原	58	D012 23	134
(抗)肝腎マイクロソーム1抗体→抗LKM-1抗体	63	D014 27	215
(一般細菌)感受性検査	104	D019 01/02/03	菌の鑑別・菌の
(抗酸菌)感受性検査(間接法)4薬剤以上	105	D022	415
関節液検査	102	D004 02	50
間接クームス試験	66	D011 02 □	47
癌胎児性抗原(CEA)	33	D009 03	99・腫2
(ヒト)癌胎児性フィブロネクチン	22	D015 22	204
寒冷凝集反応	58	D014 01	11

キ	ページ	診療報酬区分	実施料
キシロカイン→リドカイン	111	B001 02	特
凝固因子活性検査(第II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII因子)	97	D006 32	223
凝固抑制因子検査(第VII, IX因子)	97	D006 20	144

ク	ページ	診療報酬区分	実施料
グアナゼ	77	D007 12	35
(間接)クームス試験	66	D011 02 □	47
(直接)クームス試験	66	D011 02 イ	34
クラミドフィラ(クラミジア)シタシ(オーム病クラミドフィラ)	55	D012 11 ネ	79
クラミドフィラ(クラミジア)シタシ	55		
クラミジアトラコマティス	55	D012 43	200
クラミジアトラコマティスDNA	56	D023 01	188
クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエ IgA	55	D012 10	75
クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエ IgG	55	D012 09	70
クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエ IgM	55	D012 30	152
クリオグロブリン定性	67	D015 05	42
グリコアルブミン	80	D007 17	55
グリコヘモグロビンA1c→ヘモグロビンA1c(HbA1c)	80	D005 09	49
クリプトコックス・ネオフォルマンス抗原	59	D012 36	164
グリバック→イマチニブ	114	B001 02	特
(HCV群別)グルーピング	53	D013 11	215
グルコース	80	D007 01	11
クレアチニン	78	D007 01	11
クレアチニンクリアランス	94		
クレアチニンクリアランス(24時間法)	94		
クレアチンフォスフォキナーゼ→CK(CPK)	76	D007 01	11
クレアチンフォスフォキナーゼ-MB→CK-MB(CPK-MB)(CLEIA)	76	D007 22	90
クレアチンフォスフォキナーゼ-MB→CK-MB(CPK-MB)(免疫阻止-UV法)	76		
クロール(CI)	88	D007 01	11
クロール定量(髄液検査)	102	D007 01	11
クロナゼパム	109	B001 02	特
クロバザム	109	B001 02	特
クロム	92		

ケ	ページ	診療報酬区分	実施料
(末梢)血液一般検査	95	D005 05	21
血液型(ABO式)	66	D011 01	39
血液型(Rh(D因子)式)	66	D011 01	39
血液型(Rh-Hr式)	66	D011 03	163
血液型不適合妊娠	66		
血液像	95	D005 03	15
結核菌群核酸同定(TRC)	105	D023 14	410
結核菌特異的IFN- γ	57	D015 29	593
血小板数(PLT)	95	D005 05	21
血小板関連IgG(PA IgG)	64	D011 06	190
(抗)血小板抗体	64	D011 08	261
血小板第4因子(PF-4)	96	D006 27	173

ケ		ページ	診療報酬区分	実施料
血小板第4因子・ヘパリン複合体抗体(HIT抗体)	64, 96	D011 10	390	
血色素量(Hb)	95	D005 05	21	
血清 HER2タンパク	33	B001 03 □	腫2	
血清亜鉛(Zn)	89	D007 37	132	
血清アミロイドA蛋白(SAA)	69	D015 06	47	
血清抗p53抗体	33	D009 22	163・腫2	
血清鉄(Fe)	89	D007 01	11	
血清銅(Cu)	89	D007 05	23	
血清補体価	61, 67	D015 04	38	
結石分析〔成分比率〕	92	D010 02	117	
血中11-OHCS	28	D008 02	60	
血中ケトン体分画	81	D007 19	59	
血糖→グルコース	80	D007 01	11	
ケトン体(尿一般定性検査)	100	D000	★26	
(血中)ケトン体分画	81	D007 19	59	
ケモカイン→TARC	71	D015 17	179	
ゲンタシン→ゲンタマイシン	113	B001 02	特	
ゲンタマイシン	113	B001 02	特	

コ		ページ	診療報酬区分	実施料
(HCV抗原)コア蛋白質	54	D013 05	102	
抗AChR抗体(抗アセチルコリンレセプター抗体)	64	D014 44	752	
抗ARS抗体	63	D014 23	190	
抗CCP抗体	61	D014 24	193	
抗BP180抗体	64	D014 34	270	
抗CL・β ₂ GP I 抗体(抗カルジオリビンβ ₂ グリコプロテインI 複合体抗体)	62	D014 28	223	
抗DNA抗体(RIA)	61	D014 17	159	
抗ds-DNA IgG抗体	61	D014 17	159	
抗ds-DNA IgM抗体	61			
抗GAD抗体	31	D008 20	134	
抗GBM抗体(抗糸球体基底膜抗体)	63	D014 32	257	
抗IA-2抗体	31	D008 43	213	
抗Jo-1抗体(CLEIA)	63	D014 12	140	
抗LKM-1抗体	63	D014 27	215	
抗MuSK抗体(抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体)	64	D014 46	1000	
抗RNAポリメラーゼⅢ抗体	62	D014 19	166	
抗RNP抗体(CLEIA)	62	D014 13	144	
抗Scl-70抗体(CLEIA)	62	D014 16	157	
抗Sm抗体(CLEIA)	62	D014 14	147	
抗SS-A/Ro抗体(CLEIA)	62	D014 18	161	
抗SS-B/La抗体(CLEIA)	62	D014 15	153	
抗ss-DNA IgG抗体	61	D014 17	159	
抗ss-DNA IgM抗体	61			
抗TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)(CLEIA)	25	D014 11	138	
抗アクアポリン 4 抗体	63	D014 46	1000	
抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)	64	D014 44	752	
抗胃壁細胞抗体	63			

コ		ページ	診療報酬区分	実施料
抗核抗体 (ANA)	61	D014 05	99	
抗ガラクトース欠損IgG抗体	61	D014 08	111	
抗カルジオリピンβ ₂ グリコプロテインⅠ複合体抗体 (抗CL・β ₂ GPⅠ抗体)	62	D014 28	223	
抗カルジオリピンIgG抗体	62	D014 29	226	
抗カルジオリピンIgM抗体	62	D014 29	226	
抗肝腎マイクログソーム1抗体→抗LKM-1抗体	63	D014 27	215	
抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体 (抗MuSK抗体)	64	D014 46	1000	
抗血小板抗体	64	D011 08	261	
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 (抗TPO抗体) (CLEIA)	25	D014 11	138	
抗好中球細胞質抗体 (MPO-ANCA)	63	D014 31	250	
抗好中球細胞質抗体 (PR3-ANCA)	63	D014 31	250	
抗サイログロブリン抗体 (CLEIA)	25	D014 10	136	
好酸球数	95	D005 04	17	
(抗酸菌)塗抹鏡検	105	D017 01+D017 01注1	65+35	
(抗酸菌)分離培養 (液体法)	105	D020 01	315	
(抗酸菌)分離培養 (小川法)	105	D020 02	224	
(抗酸菌)感受性検査 (間接法)	105	D022	415	
抗酸菌同定 (質量分析)	105	D021	376	
抗糸球体基底膜抗体 (抗GBM抗体)	63	D014 32	257	
抗シトルリン化ペプチド (CCP) 抗体	61	D014 24	193	
甲状腺刺激ホルモン (TSH) (CLEIA) IFCC	24, 25	D008 06	98	
甲状腺刺激ホルモン (TSH) レセプター抗体 (CLEIA)	25	D014 26	208	
抗ストレプトリジン-0抗体 (ASO)	58	D012 01	15	
抗セントロメア抗体 (CLEIA)	63	D014 20	173	
酵素抗体染色	117	N002 09	400	
抗体同定・抗体価測定 (不規則性抗体)	66	D011 04	174	
(抗) 好中球細胞質抗体 (MPO-ANCA)	63	D014 31	250	
(抗) 好中球細胞質抗体 (PR3-ANCA)	63	D014 31	250	
抗デスモグレイン1抗体	64	D014 38	300	
抗デスモグレイン3抗体	64	D014 34	270	
抗トポイソメラーゼⅠ抗体→抗Scl-70抗体 (CLEIA)	62	D014 16	157	
抗内因子抗体	63			
抗表皮成分自己抗体 (直接法)	64	N002 (08)+N002 (08注2)	400+1200	
抗平滑筋抗体	63			
抗ヘリコバクターピロリ抗体 (LA)	58	D012 12	80	
抗ミトコンドリアM2抗体	63	D014 22	189	
抗ミトコンドリア抗体	63	D014 21	181	
(抗リン脂質抗体)→抗カルジオリピンβ ₂ グリコプロテインⅠ複合体抗体	62	D014 28	223	
(抗リン脂質抗体)→抗カルジオリピン抗体 (IgG)	62	D014 29	226	
(抗リン脂質抗体)→抗カルジオリピン抗体 (IgM)	62	D014 29	226	
コクサッキーウイルス (CF) (NT)	38, 39	D012 11 □	79	
極長鎖脂肪酸	84	D010 08 □	1141	
骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ (TRACP-5b)	93	D008 26	156・腫2	
骨型アルカリフォスファターゼ (BAP)	26, 76, 93	D008 27	157	
コプロボルフィリン (血中)	90	D007 51	210	
コプロボルフィリン (尿中)	90	D001 15	131	
コプロボルフィリン定性	90			

特：特定薬剤治療管理料

腫2：悪性腫瘍特異物質治療管理料

★：保険医療機関内で実施した場合のみ算定できます。

コ		ページ	診療報酬区分	実施料
コリンエステラーゼ (ChE)		77	D007 01	11
抗利尿ホルモン (AVP)		24	D008 47	224
コルチゾール		28	D008 14	121
(遊離) コレステロール		82	D007 01	11
(総) コレステロール (T-Cho)		82	D007 03	17
コレステロールエステル比		82		
コレステロール分画		85	D007 18	57

サ		ページ	診療報酬区分	実施料
(肺) サーフアクトタンパク質A (SP-A)		70	D007 34	130
(肺) サーフアクトタンパク質D (SP-D)		70	D007 38	136
サイクリックAMP		32	D008 29	161
サイトケラチン18フラグメント (CK-18F)		70	D007 49	194
サイトケラチン19フラグメント (シフラ) (CYFRA)		34	D009 19	154・腫2
サイトメガロウイルス		42	D012 11 ハ	79
サイトメガロウイルス (IgM, IgG)		42	D012 46 ハ	200
サイトメガロウイルスDNA定性		47		
サイトメガロウイルスpp65抗原 (C7-HRP)		47	D012 60	356
細胞診検査 (婦人科)		118	N004 01	150
細胞診検査 [喀痰集細胞法]		118	N004 02	190
細胞数 (髄液一般検査)		102	D004 04	77
細胞種類 (髄液一般検査)		102	D004 04	77
(遊離) サイロキシン (Free T ₄)		25	D008 14	121
サイロキシン (T ₄) [CLEIA]		25	D008 11	105
サイロキシン結合グロブリン (TBG)		25	D008 19	130
サイログロブリン [CLEIA]		25	D008 17	128
(抗) サイログロブリン抗体 [CLEIA]		25	D014 10	136
サリチル酸		114	B001 02	特
ザロンチン→エトサクシミド		108	B001 02	特
酸化LDL (MDA-LDL)		85	D007 49	194
サンリズム→ビルシカイニド		111	B001 02	特

シ		ページ	診療報酬区分	実施料
ジアセバム		109	B001 02	特
ジアックス→ジアセバム		109	B001 02	特
シアリルLe ^x -i抗原 (SLX)		33	D009 13	140・腫2
シアリルLe ^x 抗原 (CSLEX)		33	D009 18	152・腫2
シアル化糖鎖抗原KL-6→KL-6		70	D007 28	108
シアル酸		80		
子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ		30	D004 08	113
(抗) 糸球体基底膜抗体 (抗GBM抗体)		63	D014 32	257
シクロスリン		114	B001 02	特
ジゴキシン		110	B001 02	特
ジゴシン→ジゴキシン		110	B001 02	特
シスタチンC [金コロイド凝集法]		69	D007 29	109
ジソピラミド		111	B001 02	特
ジフェニルヒダントイン→フェニトイン		108	B001 02	特

シ		ページ	診療報酬区分	実施料
シフラ (CYFRA) (サイトケラチン19フラグメント)		34	D009 19	154・腫2
シベンソリン		111	B001 02	特
脂肪酸分画		84	D010 07	389
(尿中) シュウ酸		81	D001 19	200
絨毛性ゴナドトロピン (β HCG)		30	D008 19	130
絨毛性ゴナドトロピンβサブユニット (HCG-β)		30	D008 18	129
女性AICS (6種)		119		

心筋トロポニンT	31, 69	D007 29	109
シングルアレルゲン (特異的IgE)	71, 73	D015 13	各110
神経特異エノラーゼ (NSE)	34	D009 14	142・腫2
心室筋ミオシン軽鎖 I	31, 69	D007 47	184
(ヒト) 心臓由来脂肪酸結合蛋白 (H-FABP)	31, 69	D007 35	131
浸透圧 (血清)	88	D005 03	15
浸透圧 (部分尿)	88	D001 03	16
(ヒト) 心房性ナトリウム利尿ペプチド (HANP)	31	D008 46	221

ス		ページ	診療報酬区分	実施料
髄液一般検査		102	D004 04	77
脾PLA ₂ (脾ホスホリパーゼA ₂)		75	D007 50	204
脾アミラーゼ→P型アミラーゼ定量		75	D007 14	48
脾グルカゴン		31	D008 24	150
水痘・带状疱疹ウイルス		41	D012 11 ナ	79
水痘・带状疱疹ウイルス (IgM, IgG)		41	D012 46 チ	200
水痘・带状疱疹ウイルスDNA定性		46		
水痘・带状疱疹ウイルス抗原 (FA)		46	D012 54	227
脾ホスホリパーゼA ₂ (脾PLA ₂)		75	D007 50	204
(抗) ストレプトリジン-O抗体 (ASO)		58	D012 01	15

セ		ページ	診療報酬区分	実施料
精子不動化抗体 (SI50)		64		
精子不動化抗体 (不動化法)		64		
成人T細胞白血病ウイルス抗体 (ATLV抗体) [CLEIA]		49	D012 33	159
成人T細胞白血病ウイルス抗体 (ATLV抗体) [LIA]		49	D012 64	425
成長ホルモン (GH)		24	D008 10	104
赤血球形態		95	D005 03	15
赤血球数 (RBC)		95	D005 05	21
セルシン→ジアセバム		106	B001 02	特
セルロプラスミン		68	D015 09	90
セレニカR→バルプロ酸		108	B001 02	特
セレネース→ハロベリドール		110	B001 02	特
セロトニン		27		
潜血 (尿一般定性検査)		100	D000	★26
染色標本作製		117		
(抗) セントロメア抗体 (CLEIA)		63	D014 20	174
前立腺特異抗原 (PSA)		33	D009 09	121・腫2
前立腺特異抗原 (PSA) F/T比→PSA F/T比		33	D009 17	150・腫2

特：特定薬剤治療管理料

腫2：悪性腫瘍特異物質治療管理料

★：保険医療機関内で実施した場合のみ算定できます。

ソ		ページ	診療報酬区分	実施料
総IgE→IgE(非特異的IgE)		71	D015 11	100
総コレステロール(T-Chol)		82	D007 03	17
(尿中)総三塩化物		91		
総胆汁酸		85	D007 13	47
総蛋白(TP)(血清)		74	D007 01	11
総蛋白(TP)(髄液)	74, 102	D007 01	11	
総蛋白(TP)(蓄尿)	74, 100	D001 01	7	
総鉄結合能(TIBC)		89	D007 01	11
総ビリルビン(T-Bil)		89	D007 01	11
総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)		79	D010 05	283
総ホモシステイン		80	D010 04 イ	279
ソナコン→ジアセバム	109	B001 02	特	
ゾニサミド	109	B001 02	特	
ソビラール→プロパフェノン	111	B001 02	特	
ソマトメジン-C(IGF-1)SDスコア	24	D008 42	212	

タ		ページ	診療報酬区分	実施料
第Ⅱ因子(凝固因子活性検査)		97	D006 32	223
第Ⅴ因子(凝固因子活性検査)		97	D006 32	223
第Ⅶ因子(凝固因子活性検査)		97	D006 32	223
第Ⅷ因子(凝固因子活性検査)		97	D006 32	223
第Ⅷ因子(凝固抑制因子検査)		97	D006 20	144
第Ⅸ因子(凝固因子活性検査)		97	D006 32	223
第Ⅸ因子(凝固抑制因子検査)		97	D006 20	144
第Ⅹ因子(凝固因子活性検査)		97	D006 32	223
第ⅩⅠ因子(凝固因子活性検査)		97	D006 32	223
第ⅩⅡ因子(凝固因子活性検査)		97	D006 32	223
第ⅩⅢ因子(凝固因子活性検査)		97	D006 32	223
大腸菌ペロトキシン	106	D023-2 03	184	
ダイアモックス→アセタゾラミド	109	B001 02	特	
タクロリムス	114	B001 02	特	
タゴシッド→テイコブラニン	113	B001 02	特	
(総)胆汁酸	85	D007 13	47	
単純ヘルペスウイルス	42	D012 11 ヘ	79	
単純ヘルペスウイルス(1型, 2型)	42	D012 11 ヘ	79	
単純ヘルペスウイルス(IgM, IgG)	42	D012 46 イ	200	
単純ヘルペスウイルスDNA定性	46			
単純ヘルペスウイルスDNA定量	46	D023 17	450	
単純ヘルペスウイルスIgG(髄液中)	42	D012 46 イ	200	
単純ヘルペスウイルス特異抗原(FA)	46	D012 42	180	
男性AICS(5種)	119			
蛋白(尿一般定性検査)	100	D000	★26	
蛋白定量(髄液検査)	102	D007 01	11	
(総)蛋白(TP)(血清)	74	D007 01	11	
(総)蛋白(TP)(髄液)	74, 102	D007 01	11	
(総)蛋白(TP)(蓄尿)	74, 100	D001 01	7	
蛋白分画	74	D007 04	18	

タ		ページ	診療報酬区分	実施料
---	--	-----	--------	-----

タンボコール→フレカイニド 111 B001 02 特

チ		ページ	診療報酬区分	実施料
中性脂肪(TG)		82	D007 01	11
直接クーモス試験		66	D011 02 イ	34
直接ビリルビン		89	D007 01	11
チロシン・フェニルアラニン(アミノ酸分析2種類[LC/MS])	79	D010 04 イ+D010 04 イ	279+279	
(尿)沈渣(フローサイトメトリー)	100	D002-2	★24	

ツ		ページ	診療報酬区分	実施料
ツツガムシカーブIgG, IgM		55	D012 47	203
ツツガムシカトールIgG, IgM		55	D012 47	203
ツツガムシギリアムIgG, IgM		55	D012 47	203

テ		ページ	診療報酬区分	実施料
---	--	-----	--------	-----

テイコブラニン	113	B001 02	特
デオキシビリジノリン	26, 34, 70	D008 39	191・腫2
デオキシビリジノリン(DPD)(骨粗鬆症)	93	D008 39	191
テオドール→テオフィリン	114	B001 02	特
テオフィリン	114	B001 02	特
テオロング→テオフィリン	114	B001 02	特
テグレートール→カルバマゼピン	108	B001 02	特
テストステロン	29	D008 13	119
(抗)デスモグレイン1抗体	63	D014 38	300
(抗)デスモグレイン3抗体	63	D014 34	270
鉄(Fe)	89	D007 01	11
(総)鉄結合能(TIBC)	89	D007 01	11
(不飽和)鉄結合能(UIBC)	89	D007 01	11
デバケン→バルプロ酸	108	B001 02	特
デヒドロエピアンドロステロンサルフェート(DHEA-S)	28	D008 31	164
テレスミン→カルバマゼピン	108	B001 02	特

ト		ページ	診療報酬区分	実施料
---	--	-----	--------	-----

トイ→メキシレチン	111	B001 02	特
糖(尿一般定性検査)	100	D000	★26
糖定量(髄液検査)	102	D007 01	11
銅(Cu)	89	D007 05	23
トータルPAI-1(tPA・PAI-1複合体)	99	D006 34	240
ドーバミン総	28		
トキソプラズマIgG抗体	59	D012 14	93
トキソプラズマIgM抗体	59	D012 15	95
特異的IgE(12種吸入性アレルゲン)→アトピー鑑別試験(12種吸入性アレルゲン)	71, 72	D015 20	194
特異的IgE(MAST36アレルゲン)	71, 72	D015 13	1430
特異的IgE(viewアレルギー39)	71	D015 13	1430
特異的IgE(シングルアレルゲン)	71, 73	D015 13	各110
特異的IgE(マルチアレルゲン)	71, 72	D015 13	各110
トピラマート	109	B001 02	特

特：特定薬剤治療管理料

腫2：悪性腫瘍特異物質治療管理料

★：保険医療機関内で実施した場合のみ算定できます。

ト		ページ	診療報酬区分	実施料
トブラシン→トブラマイシン		113	B001 02	特
トブラマイシン		113	B001 02	特
(抗)トポイソメラーゼⅠ抗体→抗ScI-70抗体(CLEIA)		61	D014 16	157
(一般細菌)塗抹鏡検		104	D017 03	67
(抗酸菌)塗抹鏡検		105	D017 01+D017 01注	65+35
トランスサイレチン→プレアルブミン		68	D015 12	101
トランスフェリン		68	D015 07	60
(尿中)トランスフェリン(クレアチニン換算値)		68	D001 09	98
(尿中)トランスフェリン		68	D001 09	98
トリグリセライド→中性脂肪(TG)		82	D007 01	11
(尿中)トリクロル酢酸		91		
トリプシン		75	D007 48	189
トリメタジオン		109	B001 02	特
(遊離)トリヨードサイロニン(Free T ₃)		25	D008 14	121
トリヨードサイロニン(T ₃) (CLEIA)		25	D008 07	99
(心筋)トロポニンT	31, 69	D007 29		109
トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(TAT)		98	D006 25	166
トロンボモジュリン		99	D006 29	204

ナ		ページ	診療報酬区分	実施料
ナイアシン(ニコチン酸)		87		
(抗)内因子抗体		63		
ナトリウム(Na)		88	D007 01	11
ナバ→アセトアミノフェン		114	D007 47	180
鉛(Pb)		91		

ニ		ページ	診療報酬区分	実施料
ニコチン酸(ナイアシン)		87		
ニトラゼパム		109	B001 02	特
日本脳炎ウイルス		39	D012 11 ツ	79
乳酸		81	D007 13	47
乳酸脱水素酵素→LD(LDH)IFCC		76	D007 01	11
乳酸脱水素酵素アイソザイム→LD(LDH)アイソザイム		76	D007 14	48
ニューモシスチスロベチDNA定性		57		
尿酸(UA)		78	D007 01	11
尿素窒素(UN)		78	D007 01	11
尿中2,5-ヘキササンジオン		91		
尿中Ⅳ型コラーゲン		69	D001 16	179
尿中N-メチルホルムアミド		91		
尿中アセトン定量		81		
尿中アルブミン	68, 74	D001 10		99
尿中アルブミン(クレアチニン換算値)	68, 74	D001 10		99
尿一般定性検査	100	D000		★26
尿蛋白定量	74, 100	D001 01		7
尿中シュウ酸	81	D001 19		200
尿中スチレン代謝物	91			
尿中総三塩化物	91			

ニ		ページ	診療報酬区分	実施料
尿中トランスフェリン		68	D001 09	98
尿中トリクロル酢酸		91		
尿中馬尿酸		91		
尿中ミオグロビン(CLEIA)		69	D007 35	131
尿中メチル馬尿酸		91		
尿中免疫電気泳動(尿中ベンスジョーンズ蛋白の同定)		67	D015 21	201
尿沈渣(フローサイトメトリー)	100	D002-2		★24
尿糖定量(蓄尿)(部分尿)	100	D001 02		9

ネ		ページ	診療報酬区分	実施料
ネオプテリン		92		
ネオペリドール→ハロペリドール		110	B001 02	特
ネルボン→ニトラゼパム		109	B011 02	特

ノ		ページ	診療報酬区分	実施料
(ヒト)脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)		31	D008 19	130
ノルバース→ジソピラミド		111	B001 02	特

ハ		ページ	診療報酬区分	実施料
肺サーファクタントプロテインA(SP-A)		70	D007 34	130
肺サーファクタントプロテインD(SP-D)		70	D007 38	136
ハイセレニン→バルプロ酸		108	B001 02	特
梅毒定性RPR(LA)		60	D012 01	15
梅毒定性TP抗体(LA)		60	D012 04	32
梅毒定量TP抗体(LA)		60	D012 06	53
梅毒定量RPR(LA)		60	D012 05	34
(一般細菌)培養同定(口腔、気道、呼吸器)		104	D018 01	180
(一般細菌)培養同定(消化器)		104	D018 02	200
(一般細菌)培養同定(泌尿器、生殖器)		104	D018 04	190
(一般細菌)培養同定(血液、穿刺液)		104	D018 03	240
(一般細菌)培養同定(その他部位)		104	D018 05	180
ハイドロキシプロリン(総)		80	D010 04 イ	279
白血球数(WBC)		95	D005 05	21
白血球像		95	D005 03	15
(尿中)馬尿酸		91		
バニリルマンデル酸→VMA		27	D008 04	90
バファリン→サリチル酸		114	B001 02	特
ハプトグロビン(型判別)		68	D015 14	129
ハベカシン→アルベカシン		113	B001 02	特
パラインフルエンザウイルス		37	D012 11 ヌ・ル・ラ	79
(遊離)バルプロ酸		108	B001 02	特
バルプロ酸		108	B001 02	特
(ヒト)バルボウイルスB19DNA定性		45		
(ヒト)バルボウイルスB19IgG		41		
(ヒト)バルボウイルスB19IgM		41	D012 46 ト	200
パレコウイルス1型(エコーウイルス22型)		38	D012 11 ホ	79
バレリン→バルプロ酸		108	B001 02	特

ハ	ページ	診療報酬区分	実施料
ハロステン→ハロペリドール	110	B001 02	特
ハロペリドール	110	B001 02	特
ハロマンズ→ハロペリドール	110	B001 02	特
バンコマイシン	113	B001 02	特
反応(pH)(髄液一般検査)	102	D004 04	77

ヒ	ページ	診療報酬区分	実施料
ヒアルロン酸(胸水)	80		
ヒアルロン酸(血清)	80	D007 45	179
ヒクリン→アミカシン	113	B001 02	特
鼻汁中好酸球	95	D005 03	15
ビタミンA	86		
ビタミンB ₁	86	D007 55	239
ビタミンB ₂	86	D007 54	231
ビタミンB ₆	86		
ビタミンB ₁₂	86	D007 38	136
ビタミンC(アスコルビン酸)	86	D007 59	296
ビタミンE	87		
ビタミンK分画	87, 99		
ヒダントール→フェニトイン	108	B001 02	特
比重(髄液一般検査)	102	D004 04	77
比重(尿一般定性検査)	100	D000	★26
ヒト癌胎児性フィブロネクチン	30	D015 22	204
非特異的IgE→IgE	71	D015 11	100
ヒト絨毛性ゴナドトロピン(β-HCG)	30	D008 19	130
ヒト絨毛性ゴナドトロピンβサブユニット(HCG-β)	30	D008 18	129
ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)	31, 69	D007 35	131
ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)	31	D008 46	221
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)	31	D008 19	130
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)	31	D008 21	136
ヒトパピローマウイルス(HPV)ジェノタイプ	48	D023 27	2000
ヒトバルボウイルスB19DNA定性	45		
ヒトバルボウイルスB19IgG	41		
ヒトバルボウイルスB19IgM	41	D012 46 ト	200
ヒトヘルペスウイルス6型DNA定性	46		
ヒトヘルペスウイルス7型DNA定性	46		
ヒメノール→ビルメノール	112	B001 02	特
百日咳菌DNA	59	D023 13	360
百日咳抗体IgG	59	D012 57	250
百日咳抗体IgM	59	D012 12	80
(抗)表皮成分自己抗体(直接法)	64	N002(08)+N002(08注2)	400+1200
病理組織検査(1臓器)	117	N000	860
病理組織検査(2臓器)	117	N000	1720
病理組織検査(3臓器)	117	N000	2580
ピリナジン→アセトアミノフェン	114	D007 47	180
ビリルビン(尿一般定性検査)	100	D000	★26
(総)ビリルビン	89	D007 01	11

ヒ	ページ	診療報酬区分	実施料
ビルシカイニド	111	B001 02	特
ビルビン酸	81	D007 13	47
ビルメノール	112	B001 02	特

フ	ページ	診療報酬区分	実施料
(ファディートブ)→アトビー鑑別試験(12種吸入性アレルギー)	71	D015 20	194
フィブリノゲン(FIB)	97	D006 04	23
(可溶性)フィブリンモノマー複合体(SFMC)	98	D006 11	93
フィブリンモノマー複合体定量	98	D006 30	215
風疹ウイルス	41	D012 11 レ	79
風疹ウイルス[IgM, IgG]	41	D012 46 □	200
(遊離)フェニトイン	108	B001 02	特
フェニトイン	108	B001 02	特
フェノバル→フェノバルビタール	108	B001 02	特
フェノバルビタール	108	B001 02	特
フェリチン	68	D007 25	102
フォン・ウィルブランド因子活性(リストセチンコファクター)	98	D006 15	126
フォン・ウィルブランド因子抗原定量	98	D006 21	147
フォン・ウィルブランド因子マルチマー解析	98		
不規則性抗体(抗体同定・抗体価測定)	66	D011 04	174
副甲状腺ホルモン(PTH)-イインタクト	26	D008 29	161
副甲状腺ホルモン(Whole PTH)	26	D008 29	161
副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)	26	D008 38	185
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)	24	D008 37	184
不飽和鉄結合能(UIBC)	89	D007 01	11
プラスミノゲン	98	D006 13	100
フリーT ₃ →遊離トリヨードサイロニン(Free T ₃)	25	D008 14	121
フリーT ₄ →遊離サイロキシニン(Free T ₄)	25	D008 14	121
フリーテストステロン	29	D008 26	156
プリミドン	108	B001 02	特
プリムロン→プリミドン	108	B001 02	特
プレアルブミン	68	D015 12	101
フレカイニド	111	B001 02	特
プレグナンジオール(P ₂)	29	D008 43	213
プレグナントリオール(P ₃)	29	D008 48	232
(ProGRP)→ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)	34	D009 24	175・腫2
プロウイルス→HTLV-I(ATLV)DNA(クロナリティ)	49		
プロカインアミド	111	B001 02	特
プロカルシトニン	58	D007 58	276
プログラフ→タクロリムス	114	B001 02	特
プロゲステロン	29	D008 23	139
プロコラーゲンⅢペプチド(P-Ⅲ-P)(CLIA)	69	D007 38	136
ブロック作製	117		
プロテインC(抗原量)	99	D006 31	220
プロテインC活性	99	D006 33	227
プロテインS(抗原量)	99	D006 23	152
プロテインS(遊離型抗原量)	99	D006 23	152

特：特定薬剤治療管理料

腫2：悪性腫瘍特異物質治療管理料

★：保険医療機関内で実施した場合のみ算定できます。

フ	ページ	診療報酬区分	実施料
プロテインS活性	99	D006 24	163
プロトボルフィリン	90	D007 57	272
プロトロンビン時間(PT)	97	D006 02	18
プロトロンビンフラグメントF1+2	98	D006 28	192
プロノン→プロバフェノン	111	B001 02	特
プロバフェノン	111	B001 02	特
プロプラノロール	112		
プロムベリドール	110	B001 02	特
プロラクチン	24	D008 06	98
(抗酸菌)分離培養(液体法)	105	D020 01	315
(抗酸菌)分離培養(小川法)	105	D020 02	224

ヘ	ページ	診療報酬区分	実施料
平均赤血球容積(MCV)	95	D005 05	21
平均赤血球血色素量(MCH)	95	D005 05	21
平均赤血球血色素濃度(MCHC)	95	D005 05	21
(抗)平滑筋抗体	63		
(尿中2,5)ヘキサンジオン	91		
ペプシノゲン	77		
ペブリジル	112	B001 02	特
ペブリコール→ペブリジル	112	B001 02	特
ヘマトクリット値(Ht)	95	D005 05	21
(便中)ヘモグロビン定性	101	D003 05	37
ヘモグロビンA1c(HbA1c)	80	D005 09	49
(便中)ヘモグロビン及びトランスフェリン	101	D003 08	56
ヘリコバクター培養同定	106	D018 02	200
ヘリコバクター感受性	106	D019 01	185
(抗)ヘリコバクターピロリ抗体(LA)	58	D012 12	80
(便中)ヘリコバクターピロリ抗原	58	D012 24	138
(単純)ヘルペスウイルス	42	D012 11 ヘ	79
(単純)ヘルペスウイルス[1型, 2型]	42	D012 11 ヘ	79
(単純)ヘルペスウイルス(IgM, IgG)	42	D012 46 イ	200
(単純)ヘルペスウイルスDNA定性	46		
(単純)ヘルペスウイルスDNA定量	46	D023 17	450
(単純)ヘルペスウイルスIgG(髄液中)	42	D012 46 イ	200
(単純)ヘルペスウイルス特異抗原(FA)	46	D012 42	180
(ヒト)ヘルペスウイルス6型DNA定性	46		
(ヒト)ヘルペスウイルス7型DNA定性	46		
ベンザリン→ニトラゼパム	109	B001 02	特
ベンスジョーンズ蛋白の同定(尿中免疫電気泳動)	67	D015 21	201
便中ヘモグロビン定量(1日目)(2日目)	101	D003 07	41
便中ヘモグロビン定性(1日目)(2日目)	101	D003 05	37
便中ヘモグロビン及びトランスフェリン	101	D003 08	56
便中ヘリコバクターピロリ抗原	58	D012 24	138
ペントラキシン3(PTX3)	32		
扁平上皮癌関連抗原→SCC	34	D009 04	101・腫2

ホ	ページ	診療報酬区分	実施料
ホールPTH→副甲状腺ホルモン(Whole PTH)	26	D008 29	161
(豚)ホスホリパーゼA ₂ (豚PLA ₂)	75	D007 50	204
補体因子(C3)	67	D015 08	70
補体因子(C4)	67	D015 08	70
(血清)補体価	61, 67	D015 04	38
(総)ホモシステイン	80	D010 04 イ	279
ホモバニリン酸→HVA	27	D008 03	69
ポリコナゾール	113	B001 02 カ	特
ホリゾン→ジアゼパム	109	B001 02	特

マ	ページ	診療報酬区分	実施料
マイコプラズマニューモニエ	55	D012 04	32
マイコプラズマニューモニエDNA	56	D023 06	291
マイスタン→クロバザム	109	B001 02	特
マグネシウム(Mg)	88	D007 01	11
(α ₂)マクログロブリン	68	D006 18	138
麻疹ウイルス	40	D012 11 ソ	79
麻疹ウイルス(IgM, IgG)	40	D012 46 ホ	200
末梢血液一般検査	95	D005 05	21
末梢血液像	95	D005 03	15
マンガン	92	D007 08	27

ミ	ページ	診療報酬区分	実施料
ミオグロビン	31, 69	D007 35	131
(心室筋)ミオシン軽鎖 I	31, 69	D007 47	184
未染標本作製	117		
(抗)ミトコンドリアM2抗体	63	D014 22	189
(抗)ミトコンドリア抗体	63	D014 21	181
ミノアレピアチン→トリメタジオン	109	B001 02	特

ム	ページ	診療報酬区分	実施料
無機リン(P)	88	D007 03	17
ムラミダーゼ→リゾチーム	75		
ムンプスウイルス	40	D012 11 リ	79
ムンプスウイルス(IgM, IgG)	40	D012 46 ヘ	200

メ	ページ	診療報酬区分	実施料
メキシチール→メキシレチン	111	B001 02	特
メキシレート→メキシレチン	111	B001 02	特
メキシレチン	111	B001 02	特
メソトレキセート→メトトレキサート	114	B001 02	特
メタネフリン・ノルメタネフリン分画	27	D008 45	220
(尿中)メチル馬尿酸	91		
メトトレキサート	114	B001 02	特
免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比(フリーライトチェーン)	67	D015 28	388
免疫電気泳動(特異抗血清による同定)	67	D015 24	218
免疫電気泳動(尿中ベンスジョーンズ蛋白の同定)	67	D015 21	201

モ	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

網状赤血球数 95 D005 02 12

ヤ	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

薬剤によるリンパ球刺激試験 (DLST) 116 D016 07

ユ	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

有機酸スクリーニング検査 81 D010 08 イ ★1141

遊離コレステロール (F-Cho) 82 D007 01 11

遊離サイロキシ (Free T₄) 25 D008 14 121

遊離トリヨードサイロニン (Free T₃) 25 D008 14 121

遊離HCG-β 30 D008 18 129

ユニフィル→テオフィリン 114 B001 02 特

ヨ	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

葉酸 87 D007 40 146

ラ	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

ラコサミド 109 B001 02 特

ラモトリギン 109 B001 02 特

ランドセン→クロナゼパム 109 B001 02 特

卵巣刺激ホルモン (FSH) 24 D008 12 105

リ	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

リーマス→リチウム 89, 110 B001 02 特

(IgG型) リウマチ因子 61 D014 25 198

リウマチ因子 (RF) 定量 61 D014 02 30

リストセチンコファクター (フォン・ウィルブランド因子活性) 98 D006 15 126

リスモダン→ジソピラミド 111 B001 02 特

リスラミドR→ジソピラミド 111 B001 02 特

リゾチーム 75

リチウム 89, 110 B001 02 特

リチオマール→リチウム 89, 110 B001 02 特

リドカイン 111 B001 02 特

リパーゼ 75 D007 06 24

リポ蛋白分画 (アガロース電気泳動法) 85 D007 15 49

リポ蛋白リパーゼ (LPL) 85 D007 53 219

リボトリール→クロナゼパム 109 B001 02 特

リボ蛋白 (a) 85 D007 27 107

硫酸キニジン→キニジン 111 B001 02 特

(無機) リン (P) 88 D007 03 17

淋菌DNA 56 D023 02 198

淋菌およびクラミジアトラコマチスDNA同時測定 56 D023 05 262

リン脂質 82 D007 02 15

(リン脂質抗体)→抗カルジオリピンβ₂グリコプロテイン I 複合体抗体 62 D014 28 223

(リン脂質抗体)→抗カルジオリピンIgG抗体 62 D014 29 226

(リン脂質抗体)→抗カルジオリピンIgM抗体 62 D014 29 226

リントン→ハロペリドール 110 B001 02 特

ル	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

ルイネシン→ゲンタマイシン 113 B001 02 特

ループスアンチコアグラント (APTT凝固時間法) 62, 99

ループスアンチコアグラント (希釈ラッセル蛇毒時間法) 62, 99 D014 33 265

ループスアンチコアグラント (リン脂質中和法) 62, 99 D014 33 265

ルナブロン→ブロムペリドール 110 B001 02 特

ルミナール→フェノバルビタール 108 B001 02 特

レ	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

レキシシン→カルバマゼピン 108 B001 02 特

レチノール結合蛋白 (RBP) 68, 86 D015 14 129

レニン活性 (PRA) (EIA) 32 D008 08 100

レニン濃度 (ARC) (CLEIA) 32 D008 09 102

レベチラセタム 109 B001 02 特

レムナント様リポ蛋白コレステロール (RLP-C) 82 D007 43 174

ロ	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

ロイシニアミノペプチダーゼ→LAP 76 D007 01 11

ロイシンリッチ α₂グリコプロテイン 63 D007 56 268

ワ	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

ワコビタール→フェノバルビタール 108 B001 02 特

特：特定薬剤治療管理料

腫2：悪性腫瘍特異物質治療管理料

★：保険医療機関内で実施した場合のみ算定できます。

アルファベット

A	ページ	診療報酬区分	実施料
ABC分類	77		
ABO式血液型	66	D011 01	39
ACA→抗セントロメア抗体 (ELISA)	63	D014 20	173
ACE(アンギオテンシン I 転換酵素)	77	D007 38	136
AChR→抗アセチルコリンレセプター抗体	64	D014 44	752
ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)	24	D008 37	184
ADA(アデノシンデアミナーゼ)	77	D007 11	32
AFP→α-フェトプロテイン定量	33	D009 02	98・腫2
A/G比(アルブミン・グロブリン比)	74		
AICS→女性AICS(6種)、男性AICS(5種)	119		
Al(アルミニウム)	92	D007 29	109
Alb(アルブミン)	68, 74	D007 01	11
AIRS→男性AIRS・女性AIRS	119		
ALD→アルドラーゼ	76	D007 01	11
ALP→アルカリフォスファターゼIFCC	76	D007 01	11
ALPアイソザイム	76	D007 14	48
ALT(GPT)	76	D007 03	17
AMA→抗ミトコンドリア抗体	63	D014 21	181
AMY(アミラーゼ)	75	D007 01	11
AMYアイソザイム→アミラーゼアイソザイム	75	D007 14	48
ANA(抗核抗体)	61	D014 05	99
ANP→ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)	31	D008 46	221
APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)	97	D006 07	29
ARC→レニン濃度	32	D008 09	102
(抗)ARS抗体	66	D014 23	190
ASMA→抗平滑筋抗体	63		
ASO(抗ストレプトリジン-O抗体)	58	D012 01	15
AST(GOT)	76	D007 03	17
ATⅢ(アンチトロンビンⅢ)	98	D006 09	70
ATLV(HTLV-I)抗体(CLEIA)	49	D012 33	153
ATLV(HTLV-I)抗体(LIA)	49	D012 64	425
ATLV(HTLV-I)プロウイルスDNA(クロナリティ)	49		
B	ページ	診療報酬区分	実施料
BAP(骨型アルカリフォスファターゼ)	26, 76, 93	D008 27	157
BCA225	33	D009 20	158・腫2
BFP(塩基性フェトプロテイン)	34	D009 17	150・腫2
BGP→オステオカルシン	26	D008 25	153
B-J蛋白→尿中免疫電気泳動(尿中ベンスジョーンズ蛋白の同定)	67	D015 21	201
BMG→β ₂ -ミクログロブリン	69	D015 10	98
BNP(ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド)	31	D008 19	130
(抗)BP180抗体	64	D014 34	270
BS→グルコース	80	D007 01	11
BUN→尿素窒素(UN)	78	D007 01	11
B型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)	53	D013 12	246
C	ページ	診療報酬区分	実施料
C1q(補体因子)	67		
C1インアクチベーター活性(C1エステラーゼインヒビター活性)	67, 98	D015 24	253

C	ページ	診療報酬区分	実施料
C1エステラーゼインヒビター活性(C1インアクチベーター活性)	67, 98	D015 24	253
C3(補体因子)	67	D015 08	70
C4(補体因子)	67	D015 08	70
CA→カテコールアミン総	28	D008 37	184
CA→寒冷凝集反応	58	D014 01	11
CA-3F→カテコールアミン3分画	28	D008 29	161
CA15-3	33	D009 06	112・腫2
CA19-9	33	D009 09	121・腫2
CA54/61	34	D009 25	184・腫2
CA72-4	34	D009 15	146・腫2
CA125	34	D009 11	136・腫2
cAMP→サイクリックAMP	32	D008 29	161
C-ANCA→抗好中球細胞質抗体(PR3-ANCA)	63	D014 31	250
Ca(カルシウム)	88	D007 01	11
(抗)CCP抗体	61	D014 24	193
Cd→カドミウム	92		
CEA(癌胎児性抗原)	33	D009 03	99・腫2
CH50→血清補体価	61, 67	D015 04	38
ChE(コリンエステラーゼ)	77	D007 01	11
CK(CPK)	76	D007 01	11
CK-MB(CPK-MB)(CLIA)	76	D007 22	90
CK-18F(サイトケラチン18フラグメント)	70	D007 49	194
Cl(クロール)	88	D007 01	11
(抗)CL・β ₂ GP I抗体→抗カルジオリピンβ ₂ グリコプロテインI複合体抗体	62	D014 28	223
CMV→サイトメガロウイルス	42	D012 11	ハ 79
CMV→サイトメガロウイルス(IgM, IgG)	42	D012 46	ハ 200
CMV DNA→サイトメガロウイルスDNA定性	47		
CMV pp65抗原(C7-HRP)→サイトメガロウイルスpp65抗原(C7-HRP)	47	D012 60	356
Con-Aによるリンパ球幼若化検査	116	D016 07	345
Cp→セルロプラスミン	68	D015 09	90
CPK(CK)	76	D007 01	11
CPK-MB(CK-MB)(CLIA)	76	D007 22	90
CPK-MB(CK-MB)(免疫阻止-UV法)	76		
CPR(C-ペプチド)	31	D008 12	105
Cr→クレアチニン	78	D007 01	11
Cr→クロム	92		
CRP(C反応性蛋白)定量	69	D015 01	16
CSLEX(シアリルLex抗原)	33	D009 18	152・腫2
CT→カルシトニン	26	D008 16	127
Cu(銅)	89	D007 05	23
CYFRA(シフラ)(サイトケラチン19フラグメント)	34	D009 19	154・腫2
(HB)c抗体(CLIA)	52	D013 06	130
C反応性蛋白(CRP)定量	69	D015 01	16
C-ペプチド(CPR)	31	D008 12	105
D	ページ	診療報酬区分	実施料
DA→ドーパミン総	28		
DHEA-S(デヒドロエピアンドロステロンサルフェート)	28	D008 31	164
DLST(薬剤によるリンパ球刺激試験)	116	D016 07	

D		ページ	診療報酬区分	実施料
(抗)DNA抗体(RIA)		61	D014 17	159
DPD→デオキシビリジノリン		26, 34, 70	D008 39	191・腫2
DPD(デオキシビリジノリン)(骨粗鬆症)		93	D008 39	191
(抗)ds-DNA IgG抗体		61	D014 17	159
(抗)ds-DNA IgM抗体		61		
DUPAN-2		33	D009 07	115・腫2
Dダイマー		98	D006 16	127

E		ページ	診療報酬区分	実施料
E ₂ (エストラジオール)(ECLA)		29	D008 33	167
EBウイルスDNA(クロナリティ)		47		
EBウイルスDNA定量		47	D023 08	310
EBウイルス抗EA IgG(EIA)		43	D012 46 二	200
EBウイルス抗EA-DR IgA(FA)		43	D012 11 二	79
EBウイルス抗EA-DR IgG(FA)		43	D012 46 二	200
EBウイルス抗EBNA IgG(EIA)		43	D012 46 二	200
EBウイルス抗EBNA(FA)		43	D012 11 二	79
EBウイルス抗VCA IgA(FA)		43	D012 11 二	79
EBウイルス抗VCA[IgG, IgM](EIA)		43	D012 46 二	200
EBウイルス抗VCA[IgG, IgM](FA)		43	D012 46 二	200
Echo(エステル型コレステロール)		82		
EL-1→エラスターゼ1		33, 75	D009 08	120・腫2
EPO→エリスロポエチン		32	D008 41	209
(HB)e抗原		52	D013 04	98
(HB)e抗体		52	D013 04	98

F		ページ	診療報酬区分	実施料
F1+2→プロトロンビン フラグメントF1+2		98	D006 28	192
Fbg→フィブリノーゲン(FIB)		97	D006 04	23
F-Chol→遊離コレステロール		82	D007 01	11
FDP定量(血漿)		98	D006 12	95
FDP定量(部分尿)		98	D001 08	77
Fe(鉄)		89	D007 01	11
Free T ₃ (遊離トリヨードサイロニン)		25	D008 14	121
Free T ₄ (遊離サイロキシニン)		25	D008 14	121
FSH(卵巣刺激ホルモン)		24	D008 12	105
FT ₃ →遊離トリヨードサイロニン(Free T ₃)		25	D008 14	121
FT ₄ →遊離サイロキシニン(Free T ₄)		25	D008 14	121

G		ページ	診療報酬区分	実施料
GA→グリコアルブミン		80	D007 17	55
(抗)GAD抗体		31	D008 20	134
GBM抗体→抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)		63	D014 32	257
GH(成長ホルモン)		24	D008 10	104
GLU→グルコース		80	D007 01	11
GOT(AST)		76	D007 03	17
GPT(ALT)		76	D007 03	17
GU→グアナーゼ		77	D007 12	35

H		ページ	診療報酬区分	実施料
HA→ヒアルロン酸(胸水)		80		
HA→ヒアルロン酸(血清)		80	D007 45	179
HANP(ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド)		31	D008 46	221
HA抗体		52	D013 08	146
HA抗体-IgM		52	D013 08	146
Hb(血色素量)		95	D005 05	21
HbA1c→ヘモグロビンA1c(HbA1c)		80	D005 09	49
HBc抗体(CLIA)		52	D013 06	130
HBc抗体-IgM		52	D013 08	146
HBe抗原		52	D013 04	98
HBe抗体		52	D013 04	98
HBs抗原(HQ)		52	D013 03	88
HBs抗体(CLEIA)		52	D013 03	88
HBV DNA定量(IU)(リアルタイムPCR)		53	D023 04	256
HBVゲノタイプ		52	D013 14	340
HBコア関連抗原→HBcrAg		53	D013 12	246
(β)HCG(絨毛性ゴナドトロピン)		30	D008 19	130
HCG-βサブユニット		30	D008 18	129
HCV RNAコアジェノタイプ		54		
HCV RNA定量(リアルタイムPCR)		54	D023 15	412
HCV群別(グルーピング)		53	D013 11	215
HCV抗原(コア蛋白質)		54	D013 05	102
HCV抗体(第3世代)		53	D013 05	102
HDL _{2,3} コレステロール		82		
HDL-コレステロール		82	D007 03	17
H-FABP(ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白)		31, 69	D007 35	131
HGF(肝細胞増殖因子)		32	D007 53	227
HHV-6 DNA→ヒトヘルペスウイルス6型DNA		46		
HHV-7 DNA→ヒトヘルペスウイルス7型DNA		46		
HIAA→5-HIAA(5-ハイドロキシインドール酢酸)		27	D008 05	95
HIT抗体(血小板第4因子・ヘパリン複合体抗体)		64, 96	D011 10	390
HIV-1 RNA定量(リアルタイムPCR)		49	D023 18	520
HIV-1/2特異抗体		49	D012 67	660
HIV抗原・抗体		49	D012 16	109
Hp→ハプトグロビン(型判別)		66	D015 14	129
HSV DNA→単純ヘルペスウイルスDNA定性		46		
HSV→単純ヘルペスウイルス		42	D012 11 へ	79
HSV→単純ヘルペスウイルス(1型, 2型)		42	D012 11 へ	79
HSV→単純ヘルペスウイルス(IgM, IgG)		42	D012 46 イ	200
HSV→単純ヘルペスウイルスIgG(髄液中)		42	D012 46 イ	200
HSV特異抗原→単純ヘルペスウイルス特異抗原(FA)		46	D012 42	180
Ht(ヘマトクリット値)		95	D005 05	21
HTLV-I(ATLV)抗体(CLEIA)		49	D012 33	153
HTLV-I(ATLV)抗体(LIA)		49	D012 64	425
HTLV-I(ATLV)プロウイルスDNA(クロナリティ)		49		
HTLV-I 核酸検出定性		49	D023 17	450
HTLV-I プロウイルスDNA定性		49		
HVA		27	D008 03	69

I	ページ	診療報酬区分	実施料
(抗)IA-2抗体	31	D008 43	213
IEP→免疫電気泳動	67		
IgA	67	D015 04	38
IgA-HEV抗体(定性)	54	D013 10	210
IgE(RAST)→特異的IgE(シングル・マルチアレルゲン)	71	D015 13	各110
IgE(RIST)→IgE(非特異的IgE)	71	D015 11	100
IgE(アトピー鑑別試験)→アトピー鑑別試験(12種吸入性アレルゲン)	71	D015 20	194
IgE(非特異的IgE)	71	D015 11	100
IGF-1(ソマトメジン-C)SDスコア	24	D008 42	212
IgG	67	D015 04	38
IgG型リウマチ因子	61	D014 25	198
IgGサブクラス分画	67		
IgM	67	D015 04	38
IgM-HA抗体	52	D013 08	146
IgM-HBc抗体	52	D013 08	146
(可溶性)IL-2レセプター	34	D009 36	438・腫2
Intact-PTH→副甲状腺ホルモン(PTH)-インタクト	26	D008 29	161
IRI→インスリン	31	D008 8	100
IRT→トリプシン	75	D007 48	189

J	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

(抗)Jo-1抗体(CLEIA)	63	D014 12	140
------------------	----	---------	-----

K	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

K(カリウム)	88	D007 01	11
KL-6	70	D007 28	108

L	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

LA→ループスアンチコアグラント(APTT凝固時間法)	62, 99		
LA→ループスアンチコアグラント(希釈ラッセル蛇毒時間法)	62, 99	D014 33	265
LA→ループスアンチコアグラント(リン脂質中和法)	62, 99	D014 33	265
LAP	76	D007 01	11
LD(LDH)IFCC	76	D007 01	11
LD(LDH)アイソザイム	76	D007 14	48
LDH(LD)IFCC	76	D007 01	11
LDH(LD)アイソザイム	67	D007 14	48
LDL-コレステロール	82	D007 04	18
LH(黄体形成ホルモン)	24	D008 12	105
(抗)LKM-1抗体	63	D014 27	215
LP(a)→リポ蛋白(a)	85	D007 27	107
LPL(リポ蛋白リパーゼ)	85	D007 53	219
LRG(ロイシンリッチα ₂ グリコ蛋白)	63	D007 56	268
L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)	78	D001 20	210
L-ドーバ	28		

M	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

(抗ミトコンドリア)M2抗体	63	D014 22	189
MAC核酸同定(TRC)	105	D023 16	421
Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi)	70	D007 49	194

M	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

MAST36アレルゲン(特異的IgE)	71, 72	D015 13	1430
Mb→ミオグロビン	31, 69	D007 35	131
MCV(平均赤血球容積)	95	D005 05	21
MCH(平均赤血球色素量)	95	D005 05	21
MCHC(平均赤血球色素濃度)	95	D005 05	21
MDA-LDL(酸化LDL)	85	D007 49	194
Mg(マグネシウム)	88	D007 01	11
MLC I→心室筋ミオシン軽鎖 I	31, 69	D007 47	184
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	61	D014 09	116
Mn→マンガン	92	D007 08	27
MN-2F→メタネフリン・ノルメタネフリン分画	27	D008 45	220
MPO-ANCA(抗好中球細胞質抗体)	63	D014 31	250
(抗)MuSK抗体	64	D014 46	1000

N	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

Na(ナトリウム)	88	D007 01	11
(NAG)N-アセチルグルコサミニダーゼ	77	D001 05	41
NCC-ST-439	33	D009 06	112・腫2
NH ₃ (アンモニア)	78	D007 16	50
NSE(神経特異エノラーゼ)	34	D009 14	142・腫2
NT-proBNP(ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント)	31	D008 19	136
NTx(I型コラーゲン架橋N-テロペプチド)	26, 34, 70	D008 25	153・腫2
NTx(I型コラーゲン架橋N-テロペプチド)(骨粗鬆症)	93	D008 25	153
N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)	77	D001 05	41
(尿中)N-メチルホルムアミド	91		

P	ページ	診療報酬区分	実施料
---	-----	--------	-----

P(無機リン)	88	D007 03	17
P ₂ →プレグナンジオール	29	D008 43	213
P ₃ →プレグナントリオール	29	D008 48	232
P-Ⅲ-P(プロコラーゲンⅢペプチド)(CLIA)	69	D007 38	136
PA→前立腺特異抗原(PSA)	33	D009 09	121・腫2
PAIgG(血小板関連IgG)	64	D011 06	190
P-ANCA→抗好中球細胞質抗体(MPO-ANCA)	63	D014 31	250
Pb(鉛)	91		
PCA→抗胃壁細胞抗体	64		
PF-4(血小板第4因子)	96	D006 27	173
PG→ペプシノゲン	77		
pH(尿一般定性検査)	100	D000	★26
pH(反応)(唾液一般検査)	102	D004 04	77
PHAによるリンパ球幼若化検査	116	D016 07	345
PICテスト(α ₂ プラスミンインヒビター・プラスミン複合体)	98	D006 22	150
PIVKA-II	33	D009 10	131・腫2
PLA ₂ →膜ホスホリパーゼA ₂ (膜PLA ₂)	75	D007 50	204
Plg→プラスミノゲン	98	D006 13	100
PLT(血小板数)	95	D005 05	21
PR3-ANCA(抗好中球細胞質抗体)	63	D014 31	250
PRA(レニン活性)	32	D008 08	100
PR-F→蛋白分画	74	D007 04	18

特：特定薬剤治療管理料

腫2：悪性腫瘍特異物質治療管理料

★：保険医療機関内で実施した場合のみ算定できます。

P		ページ	診療報酬区分	実施料
PRL→プロラクチン		24	D008 06	98
ProGRP(ガストリン放出ペプチド前駆体)		34	D009 24	175・腫2
PSA(前立腺特異抗原)		33	D009 09	121・腫2
PSA F/T比		33	D009 17	150・腫2
PT→プロトロンビン時間(PT)		97	D006 02	18
PTH(副甲状腺ホルモン)(Whole PTH)		26	D008 29	161
PTH(副甲状腺ホルモン)-インタクト		26	D008 29	161
PTHrP(副甲状腺ホルモン関連蛋白)		26	D008 38	185
PTフラグメントF1+2(プロトロンビンフラグメントF1+2)		98	D006 28	192
P型アミラーゼ定量		75	D007 14	48

R		ページ	診療報酬区分	実施料
RBC(赤血球数)		95	D005 05	21
RBP(レチノール結合蛋白)		68, 86	D015 14	129
RET(網状赤血球数)		95	D005 02	12
RF(リウマチ因子)定量		61	D014 02	30
Rh(D因子)式血液型		66	D011 01	39
Rh-Hr式血液型		66	D011 03	163
RLP-C(リムナント様リポ蛋白コレステロール)		82	D007 43	174
(抗)RNP抗体(CLEIA)		62	D014 13	144
RSウイルス(CF)(NT)		37	D012 11	タ 79

S		ページ	診療報酬区分	実施料
SAA(血清アミロイドA蛋白)		69	D015 06	47
SCC		34	D009 04	101・腫2
(抗)Scl-70抗体(CLEIA)		62	D014 16	157
SFMC(可溶性フィブリンモノマー複合体)		98	D006 11	93
SLX(シアリルLex-i抗原)		33	D009 13	140・腫2
SM-C→IGF-1(ソマトメジン-C)SDスコア		24	D008 42	212
(抗)Sm抗体(CLEIA)		62	D014 14	147
SP-A(肺サーファクタント蛋白A)		70	D007 34	130
SPan-1		33	D009 15	144・腫2
SP-D(肺サーファクタント蛋白D)		70	D007 38	136
(抗)SS-A/Ro抗体(CLEIA)		61	D014 18	161
(抗)SS-B/La抗体(CLEIA)		61	D014 15	153
(抗)ss-DNA IgG抗体		61	D014 17	159
(抗)ss-DNA IgM抗体		61		
SSEA-1抗原→シアリルLex-i抗原(SLX)		33	D009 13	140・腫2
(HB)s抗原(HQ)		52	D013 03	88
(HB)s抗体(CLEIA)		52	D013 03	88

T		ページ	診療報酬区分	実施料
T ₃ (トリヨードサイロニン)(CLEIA)		25	D008 07	99
T ₄ (サイロキシン)(CLEIA)		25	D008 11	105
TARC(Th2ケモカイン)		71	D015 17	179
TAT(トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体)		98	D006 25	166
TB→総ビリルビン		89	D007 01	11
TBA→総胆汁酸		85	D007 13	47
TBG→サイロキシン結合グロブリン		25	D008 19	130

T		ページ	診療報酬区分	実施料
TBI→TSHレセプター抗体		25	D014 26	208
TCA→尿中トリクロロ酢酸		91		
T-Chol(総コレステロール)		82	D007 03	17
Tg→サイログロブリン		25	D008 17	128
TG→中性脂肪(TG)		82	D007 01	11
TgAb→抗サイログロブリン抗体		25	D014 10	136
Th2ケモカイン→TARC		71	D015 17	179
TIBC(総鉄結合能)		89	D007 01	11
TM→トロンボモジュリン		99	D006 29	204
TnT→トロポニンT		31, 69	D007 29	109
total P1NP(I型プロコラーゲン-N-プロペプチド)		26, 93	D008 28	160
TP(総蛋白)(血清)		74, 102	D007 01	11
TP(総蛋白)(髄液)		74, 100	D007 01	11
TP(総蛋白)(蓄尿)		74	D001 01	7
tPA・PAI-1複合体(トータルPAI-1)		99	D006 34	240
TP-F→蛋白分画		74	D007 04	18
(抗)TPO-Ab→抗TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)		25	D014 11	138
Tr→トランスフェリン		68	D015 07	60
Tr→トランスフェリン(クレアチニン換算値)(尿中)		68	D001 09	98
Tr→トランスフェリン(尿中)		68	D001 09	98
TRAb→TSHレセプター抗体		25	D014 26	208
TRACP-5b(骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ)		93	D008 26	156・腫2
TSH(甲状腺刺激ホルモン)(CLEIA)IFCC		24, 25	D008 06	98
TSAb(甲状腺刺激抗体)		25	D014 39	330
TSHレセプター抗体(CLEIA)		25	D014 26	208
TTC→尿中総三塩化物		91		

U		ページ	診療報酬区分	実施料
UA(尿酸)		78	D007 01	11
UIBC(不飽和鉄結合能)		89	D007 01	11
UN(尿素窒素)		78	D007 01	11

V		ページ	診療報酬区分	実施料
View39(特異的IgE)		71	D015 13	1430
VMA→(バニリルマンデル酸)		27	D008 04	90
vWF→フォン・ウィルブラント因子		98	D006 21	147
VZV→水痘・帯状疱疹ウイルス		41	D012 11	ナ 79
VZV→水痘・帯状疱疹ウイルス(IgM, IgG)		41	D012 46	チ 200
VZV DNA→水痘・帯状疱疹ウイルスDNA定性		46		
VZV抗原→水痘・帯状疱疹ウイルス抗原(FA)		46	D012 54	227

W		ページ	診療報酬区分	実施料
WBC(白血球数)		95	D005 05	21
Whole PTH(副甲状腺ホルモン)		26	D008 29	161


Z		ページ	診療報酬区分	実施料
Zn(亜鉛)		89	D007 36	132

ギリシャ文字

α		ページ	診療報酬区分	実施料
α_1 AG→ α_1 アシドグロブリン		68		
α_1 AT→ α_1 アンチトリプシン		68	D006 10	80
α_1 -M→ α_1 -マイクログロブリン		68	D015 14	129
α_1 アシドグロブリン		68		
α_1 アンチトリプシン		68	D006 10	80
α_1 -マイクログロブリン		68	D015 14	129
α_2 プラスミンインヒビター→アンチプラスミン		98	D006 17	128
α_2 プラスミンインヒビター・プラスミン複合体(PICテスト)		98	D006 22	150
α_2 -マクログロブリン		68	D006 18	138
α -hANP→ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)		31	D008 46	221
α -フェトプロテイン定量		33	D009 02	98・腫2
β		ページ	診療報酬区分	実施料
β_2 GP I抗体→抗カルジオリビン β_2 グロブリンI複合体抗体		62	D014 28	223
β_2 -MG→ β_2 -マイクログロブリン		69	D015 10	98
β_2 -マイクログロブリン		69	D015 10	98
β -D-グルカン		58	D012 44	190
β -TG(β -トロンボグロブリン)		96	D006 26	171
β -カロチン		86		
β -トロンボグロブリン(β -TG)		96	D006 26	171
β -リボ蛋白		85		
γ		ページ	診療報酬区分	実施料
γ -GT(γ -GTP)		77	D007 01	11
γ -Sm(γ -セミノプロテイン)		33	D009 27	187・腫2
γ -セミノプロテイン(γ -Sm)		33	D009 27	187・腫2
δ		ページ	診療報酬区分	実施料
δ ALA(δ -アミノレブリン酸)		90	D001 12	106
δ -アミノレブリン酸(δ ALA)		90	D001 12	106

数字

	ページ	診療報酬区分	実施料
1,5AG(1,5-アンヒドロ-D-グルシトール)	80	D007 21	80
1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)	80	D007 21	80
1,25-(OH) ₂ ビタミンD	26, 87	D007 62	388
I CTP→I型コラーゲンC末端テロペプチド	34, 70	B001 03 □	腫2
I型コラーゲンC末端テロペプチド(ICTP)	34, 70	B001 03 □	腫2
I型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)	26, 34, 70	D008 25	153・腫2
I型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)(骨粗鬆症)	93	D008 25	153
I型プロコラーゲン-N-プロペプチド(total P1NP)	26・93	D008 28	160
(尿中)2,5-ヘキサンジオン	91		
II因子(凝固因子活性検査)	97	D006 32	223
IV型コラーゲン	69	D007 35	131
(尿中)IV型コラーゲン	69	D001 16	179
IV型コラーゲン・7S(CLEIA)	69	D007 41	148
5-HIAA	27	D008 05	95
5-HT→セロトニン	27		
5-S-CD(5-S-システニルドーパ)	34		
5-S-システニルドーパ(5-S-CD)	34		
V因子(凝固因子活性検査)	97	D006 32	223
5-ハイドロキシインドール酢酸→5-HIAA	27	D008 05	95
VII因子(凝固因子活性検査)	97	D006 32	223
VIII因子(凝固因子活性検査)	97	D006 32	223
VIII因子(凝固抑制因子検査)	97	D006 20	144
IX因子(凝固因子活性検査)	97	D006 32	223
IX因子(凝固抑制因子検査)	97	D006 20	144
X因子(凝固因子活性検査)	97	D006 32	223
(血中)11-OHCS	29	D008 02	60
X I因子(凝固因子活性検査)	108	D006 32	223
11-ハイドロオキシコルチステロイド→血中11-OHCS	28	D008 02	60
X II因子(凝固因子活性検査)	97	D006 32	223
12種吸入性アレルギー(アトピー鑑別試験)	71, 72	D015 20	194
X III因子(凝固因子活性検査)	97	D006 32	223
25-OHビタミンD(骨粗鬆症)	87	D007 30	117
25ヒドロキシビタミンD(くる病、骨軟化症)	87	D007 30	117



新規検査項目記入欄

新規検査項目記入欄

	項目コード (統一コード)	検 査 項 目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位) (治療濃度範囲)	備 考

取り引きのお申し込み

当社をご利用の際には当社営業部までご連絡ください。営業員がお伺いし、ご依頼の詳細についてご説明、ご相談をいたします。

個人情報保護方針に基づき、検査の受託から報告まで対応致します。

検査のご依頼方法

1. 依頼書

それぞれの依頼項目に適合した依頼書をご使用ください。

〈種類〉

- | | |
|---------------|--------------|
| 依頼書名 | 依頼書名 |
| 1. 総合検査依頼書 1 | 5. 病理組織検査依頼書 |
| 2. アレルギー検査依頼書 | 6. 細胞診検査依頼書 |
| 3. 細菌検査依頼書 | |
| 4. 連名依頼書 | |

2. 報告書

それぞれの依頼検査に適合した報告書にてご報告いたします。

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. 総合検査報告書 | 9. 血液型検査成績書 |
| 2. 検査報告書 2 | 10. 遺伝子検査報告書 |
| 3. 血液検査プロフィール | 11. Two-Color Analysis報告書 |
| 4. 一般細菌・抗酸菌・真菌検査報告書 | 12. 染色体検査報告書 |
| 5. ウイルス肝炎検査報告書 | 13. HLA検査報告書 |
| 6. TUMOR MARKER検査報告書 | 14. アミノ酸分析報告書 |
| 7. アレルギー検査報告書 | 15. 病理組織検査・細胞診検査報告書 |
| 8. 妊婦検査成績書 | 16. その他 |

3. 依頼書の記入要領

検査依頼書及び検体ラベルには下記事項をご記入ください。


- ①患者様氏名についてはカタカナでご記入ください。
- ②検体採取日、採取時刻をご記入ください。
- ③生年月日、年齢をご記入ください。
- ④性別、入院・外来、診療科名は該当するものに☑印でご記入ください。
- ⑤カルテNo、提出医、病棟はカタカナ、アルファベット、数字にてご記入ください。
- ⑥ご依頼項目はチェック欄に☑印をご記入ください。
- ⑦記載されていない項目をご依頼の場合は、欄外項目記入欄にご記入ください。
- ⑧検査項目に応じて、蓄尿量・身長・体重・臨床情報等をご記入ください。

4. 検体容器

検体容器については、140～166ページの「専用容器の取り扱い方法」をご参照ください。

5. 検体ラベル

- ①検体ラベルには、依頼書と同じ依頼No(9桁)とバーコードが印刷されておりますので、必ず依頼書に添付されたラベルを検体に貼付してください。
- ②血清、血算、グルコース、尿、凝固、2Na血漿は検査材料名を印刷した材料名表示ラベルをご使用ください。
- ③検体ラベルの氏名欄に依頼書と同じ氏名や材料名、負荷時間等をご記入ください。



〈記入例〉

他の依頼書も基本的な記入要領は同様です。

総合検査案内掲載内容

1. 検体量：検体量は再検査分を考慮して設定しております。
血清または血漿の場合、必要量の約3倍量をめやすに血液を採血してください。（検体採血方法は140ページをご参照ください）
2. 保存：指定の保存方法にてご提出ください。
凍結 必ず凍結（-10℃以下）保存してご提出ください。 **冷蔵** 冷蔵（2℃～15℃）で保存してご提出ください。
室温 必ず室温（16℃～30℃）で保存してご提出ください。
3. 基準値：「正常参考値および判定基準」は当社では「基準値」で表示しております。
4. 所要日数：原則的には検体をお預かりした翌日を起算日とし、結果を先生のお手元へお届けするまでの日数（通常の日曜日を含みます）です。再検査の場合や祝祭日の前後は、さらに若干の日数を要することがあります。
なお、記載されている材料以外でのご依頼の場合や、絶対凍マークの項目との同時のご依頼の場合は、表示日数より遅れることがあります。
5. 実施料・判断料：検体検査料は検体検査実施料と、検体検査判断料に区分されています。

検 体 検 査 判 断 料					
	判断料	判断料区分		判断料	判断料区分
1. 尿・糞便等検査判断料	34点	※1	4. 生化学的検査(Ⅱ)判断料	144点	※5
2. 血液学的検査判断料	125点	※3	5. 免疫学的検査判断料	144点	※6
3. 生化学的検査(Ⅰ)判断料	144点	※4	6. 微生物学的検査判断料	150点	※7

病 理 診 断			
		※8	
組織診断料	520点	病理判断料	130点
細胞診断料	200点		

6. 採取条件：検体を適正に採取するために、検体採取時に留意していただきたい事項です。（備考または専用容器の取り扱い方法をご参照ください。）
7. 提出条件：血清分離の要否など、適正な検査・測定を行うために必要な事項です。（備考または専用容器の取り扱い方法をご参照ください。）
速やかに遠心 採血後、長時間の室温放置は避け、速やかに遠心分離してください。遠心分離までに時間指定のある項目や、前処理、遠心分離前に冷却を必要とする項目等もありますので、備考欄または専用容器の取り扱い方法も併せてご参照ください。
冷却遠心 低温（4℃）にて遠心分離してください。
8. 緊急報告検査値範囲 **緊急**：緊急報告検査値範囲（121ページ参照）が設定されておりますので、範囲を超えた場合には、当社より緊急連絡させていただきます。
9. 予約検査 **予約検査**：予約検査となりますので、検体採取前に必ず当社までご連絡ください。
10. 曜日指定 **曜日指定**：指定曜日のみ（休日除く）受託可能となりますので、ご注意ください。受託可能日につきましては、本文の備考欄をご参照ください。
11. 参考文献：検査方法についての基本的な参考文献です。（125～139ページ参照）

12. 測定場所および測定委託先：備考欄に&印のない項目については、当社にて測定実施しております。

&3、&1、&%&0の項目については、エスアールエル下記ラボラトリーにて測定実施しております。

&Eから&ミの項目については、エスアールエルから下記ラボラトリーへ再委託となります。

記号	エスアールエル・グループ会社測定実施場所	検体搬送時間	記号	測定委託先	検体搬送時間
&1	エスアールエルセントラルラボラトリー	6時間以内	&Q	Athena diagnostics	2～3日以内
&3	エスアールエルMUQSラボラトリー		&Y	Nightingale health Japan株式会社	30時間以内
&%	日本医学臨床検査研究所 前橋ラボ		&イ	かずさDNA研究所	
&口	日本医学臨床検査研究所	30時間以内	&ツ	ミルスインターナショナル	
記号	測定委託先	検体搬送時間	&ニ	長崎大学	
&E	北里大塚バイオアッセイ研究所	30時間以内	&ハ	シノテスト サイエンス・ラボ	
&K	Quest Diagnostics incorporated (QD)	2～3日以内	&ミ	江東微生物研究所	6時間以内
&M	LSIメディエンス	30時間以内	&T	株式会社東京セントラルパソロジーラボラトリー	
&N	ビー・エム・エル				

営業時間 平 日 9:00～19:00
土曜日 9:00～18:00

検体搬送時間：当社から測定委託先までの検体搬送時間

検体のご提出と搬送方法

貴院への集配は () (指定日時)
() (指定場所)

へお問い合わせいたします。

お預かりしました検体は

- ① 当社ラボには 時頃(平均搬送時間：)
② には 時頃(平均搬送時間：)

搬入されます。

ご依頼検体の保管期間

お預かり致しました検体は、依頼日より2週間保管し、再検査や追加検査のご要望にお応えしております。ただし、尿一般検査、末梢血液検査、血糖検査など一部の検査につきましては2日間保管とさせていただきます。なお、保管期間を過ぎた検体につきましては、当社で処分させていただきます。また、当社から測定委託する項目につきましては、測定委託先の基準に基づいて保管させていただきます。

RIA測定項目のご依頼にあたっての注意事項

シンチグラフィー等で $in vivo$ に投与したアイソトープが残存するとRIAでの異常値発生の原因となることがありますので、あらかじめご了承ください。

免責について

ご依頼いただきました検査は当社検査実施基準に基づき行われますが、お預かりした検体の状態、または検査方法の技術的限界等により検査結果を臨床診断に資することが困難な場合があります。この場合当社はその検査結果に対し免責とさせていただきます。

災害時の対応

災害等想定する危機への対応手順として、初動対応、役員及び従業員の安否確認、要員や装備の確保、災害本部設置から解散、業務復旧後の事後処置等の全容を定めた事業継続策を構築しております。

新規検査項目記入欄

マーク一覧

受付・報告関連	予約検査		予約検査となりますので、検体採取前に必ず弊社へご連絡ください。
	曜日指定		指定曜日のみ(休日除く)受託可能となりますので、ご注意ください。受託可能日につきましては、本文の備考欄をご参照ください。
	緊急		緊急報告検査値範囲(121ページ参照)が設定されておりますので、範囲を超えた場合には、弊社より緊急連絡させていただきます。
	重複不可		他項目との重複依頼は避けてください。
検体取り扱い	速やかに遠心		採血(採尿)後、長時間の室温放置は避け、速やかに遠心分離してください。遠心分離までに時間指定のある項目や、前処理、遠心分離前に冷却を必要とする項目等もありますので、備考欄または専用容器の取り扱い方法も併せてご参照ください。
	冷却遠心		低温(4℃)にて遠心分離してください。
	凍結		必ず凍結(−10℃以下)保存してご提出ください。
	冷蔵		冷蔵(2℃~15℃)で保存してご提出ください。 なお、長期間にわたって保存される場合は、凍結してくださるようお願いいたします。ただし凍マークのついている項目は、長期間であっても凍結しないでください。
	室温		必ず室温(16℃~30℃)で保存してご提出ください。
	遮光		直射日光または蛍光灯等を避け、遮光した容器にてご提出ください。
検査値への影響	溶血不可		溶血検体は検査値に影響を及ぼす場合がありますので避けてください。
	不活化不可		不活化(非動化)検体は検査値に影響を及ぼす場合がありますので避けてください。
	酸性蓄尿不可		酸性蓄尿は検査値に影響を及ぼす場合がありますので避けてください。
	凍結不可		凍結(−10℃以下)保存は検査値に影響を及ぼす場合がありますので避けてください。

主な単位記号

L	liter	mmol	millimole(=0.001mol)
dL	deciliter(=0.1L)	μmol	micromole(=10 ⁻⁶ mol)
mL	milliliter(=0.001L)	nmol	nanomole(=10 ⁻⁹ mol)
μL	microliter(=10 ⁻⁶ L)	pmol	picomole(=10 ⁻¹² mol)
fL	femtoliter(=10 ⁻¹⁵ L)	fmol	femtomole(=10 ⁻¹⁵ mol)
kg	kirogram	mm	millimeter
g	gram	mm ²	squaremillimeter(平方ミリメートル)
mg	milligram(=0.001g)	mm ³	cubicmillimeter(立方ミリメートル)
μg	microgram(=10 ⁻⁶ g)	μm ³	cubicmicrometer(立方マイクロメートル)
ng	nanogram(=10 ⁻⁹ g)	Meq	megaequivalents
pg	picogram(=10 ⁻¹² g)	mEq	milliequivalent
U	unit	mOsm	milliosmole
mU	milliunit(0.001U)	%	percent
μU	microunit(10 ⁻⁶ U)	‰	permill
IU	international unit	cpm	counts per minutes
mIU	milliinternational unit(=0.001 IU)	U _A	unit allergen
AU	arbitrary unit	IU _A	international unit allergen
M	mol/L		

検査項目欄の見かた

検体をお預かりした翌日を起算日とし、結果をお届けするまでの日数です。
再検査の場合や祝祭日の前後はさらに日数を要することがあります。

実施料、判断料区分です。※については20ページをご参照ください。
●については保険点数算定上の、同時算定不可、回数制限の算定条件を抜粋して欄外に掲載しています。

項目コード	検査項目名	項目略称	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値 (単位)	備考
統一コード (日本臨床検査医 学会臨床検査項 目コードの分析 物コードを表示)	視床下部	4477 2 (4A056)	甲状腺刺激ホルモン (TSH) (GLEIA)IFCC	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	1~2 98 ※4	CLEIA	0.61~4.23 (μIU/mL)	
		3002 5 (4A010)	成長ホルモン(GH)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4 105 ※4	ECLIA	M 2.47以下 F 0.13~9.88 (ng/mL)	&I
		A282 8 (4A015)	IGF-1 (ソマトメジンC) (ECLIA)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (7日)	2~4 212 ※4	ECLIA	下記参照	年齢を明記してください。 &I
		6760 1 (4A030)	黄体形成ホルモン (LH)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4 105 ※4	CLIA	下記参照	

ご提出いただく検体の提出条件・提出量です。血清または血漿の場合、必要量の約3倍をめやすに血液を採取してください。

ご提出いただく検体の保存条件です。採血後の保存条件ではありませんのでご注意ください。()内の安定性とは検体の保存可能時間のめやすを記載しています。

検査ご依頼にあたっての注意事項です。

検査方法名です。検査方法の概略につきましては122~124ページをご参照ください。

採取容器
↓
提出容器
を示します。

容器の取り扱いについては下記の例をご参照ください。また、取り扱い方法に条件がある項目もありますので、備考欄または専用容器の取り扱い方法もご参照ください。

(例1) 検体が血清の場合

検体量 (mL)	容器
血清 0.5	01 ↓ X

汎用容器に血液を採取し、遠心分離後、血清0.5mLを別容器(X)に移し替えてご提出ください。
血清または血漿の場合、必要量の約3倍量をめやすに血液を採取してください。

(例2) 添加剤入り容器に採取し、遠心分離後、上清をご提出いただく場合

検体量 (mL)	容器
血漿 0.5	C ↓ X

当社専用容器(C)に血液を採取し、遠心分離後、血漿 0.5mLを別容器(X)に移し替えてご提出ください。
血清または血漿の場合、必要量の約3倍量をめやすに血液を採取してください。

(例3) 検体が添加剤入りの血液の場合

検体量 (mL)	容器
血液 5.0 (EDTA-2Na加)	A

当社専用容器(A)に血液 5.0mLを採取し、よく混和させ、そのままご提出ください。
採取および提出とも同一容器(A)で、別容器への移し替えは不要です。

検査結果のご報告

原則的には当社営業員が直接お届けいたします。

緊急報告を希望されるときは、検査依頼時にあらかじめご指示ください。検査結果が判明次第、原則としてFAX連絡させていただきます。

緊急報告検査値範囲の設定してある項目については、特にご指示がない場合でも電話およびFAX連絡させていただきます。

検査結果のお問い合わせ

検査内容等のお問い合わせ、ご意見、ご指摘等につきましては、当社データインフォメーションへお問い合わせください。
データインフォメーション TEL.027(265)6498

料金請求とお支払い方法

継続お取り扱い機関は1ヵ月をまとめてご請求申し上げ、支払方法はご契約に従ってお支払いいただきます。

その他の場合は原則として報告時にお支払いください。

※尚、振入の際の銀行振込金受領書をもって領収書に替えさせていただきます。また、ご要望があれば領収書の発行をいたしますので担当営業員にお申しつけください。

登録検査業務 生化学的検査、免疫学的検査、血液学的検査、尿・糞便等一般検査

内分泌学的検査

視床下部・下垂体関連検査

内分泌学的検査

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
A477 2 (4A056)	甲状腺刺激ホルモン (TSH) (CLEIA) IFCC	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	1~2	98 ※5	CLEIA	0.61~4.23 (μIU/mL)	
3002 5 (4A010)	成長ホルモン(GH)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	104 ※5	ECLIA	M 2.47以下 F 0.13~9.88 (ng/mL)	&I
B355 6 (4A015)	IGF-1 (ソマトメジンC) SDスコア	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (7日)	2~4	212 ※5	ECLIA	下記参照(ng/mL) -2SD~+2SD(SD)	年齢および性別を明記してください。 &1
6760 1 (4A030)	黄体形成ホルモン (LH)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	105 ※5	CLIA	下記参照	性別を明記してください。
6761 0 (4A035)	卵巣刺激ホルモン (FSH)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	105 ※5	CLIA	下記参照	&I
G614 3 (4A025)	副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)	速やかに 血漿 0.5	冷蔵 遠心 C ↓ X	凍結 (21日)	2~4	184 ※5	ECLIA	午前7時~10時 7.2~63.3 (pg/mL)	溶 ACTHはEDTA濃度増加により測定値が低下するため、容器の指定容量を採取してください。採血後、速やかに血漿分離してください。早朝安静時に指定の容器に採血し、速やかに混和させ、低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。 &I
G619 8 (4A020)	プロラクチン	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4	98 ※5	ECLIA	男性 4.29~13.69 閉経前女性 4.91~29.32 閉経後女性 3.12~15.39 (ng/mL)	&3
A208 0 (4A070)	抗利尿ホルモン (AVP)	速やかに 血漿 1.5	冷蔵 遠心 A ↓ X	凍結	5~7	224 ※5	RIA2抗体法	水制限 4.0以下 自由飲水 2.8以下 (pg/mL)	溶 採血後、速やかに血漿分離してください。早朝安静時に指定の容器に採血し、速やかに混和させ、低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。溶血でのご依頼は避けてください。 &1

[3355 6] IGF-1(ソマトメジンC) SDスコア年齢別・性別における基準値

(単位: ng/mL)

年齢(歳)	男 性	女 性	年齢(歳)	男 性	女 性	年齢(歳)	男 性	女 性
0	11~149	15~154	27	116~322	141~328	54	84~239	76~211
1	14~148	23~186	28	114~315	137~320	55	84~238	75~210
2	18~154	32~213	29	111~309	133~312	56	83~237	74~208
3	24~164	40~227	30	109~303	129~304	57	82~236	73~207
4	32~176	48~238	31	107~297	126~297	58	81~235	72~205
5	44~193	56~252	32	105~292	122~290	59	80~233	71~203
6	55~215	69~287	33	103~287	119~283	60	79~232	70~201
7	63~247	89~357	34	102~283	115~277	61	77~230	69~198
8	72~292	111~438	35	100~279	112~271	62	76~228	68~196
9	84~350	133~517	36	99~275	109~265	63	75~226	66~194
10	99~423	155~588	37	97~272	106~260	64	73~224	65~191
11	113~499	175~638	38	96~269	103~254	65	72~221	64~188
12	125~557	188~654	39	95~266	100~250	66	70~219	62~186
13	133~579	193~643	40	94~263	98~245	67	68~216	61~183
14	138~570	193~625	41	94~261	95~240	68	66~213	60~180
15	141~552	192~614	42	93~259	93~236	69	65~209	59~177
16	142~543	192~611	43	92~257	90~233	70	63~206	57~175
17	142~540	191~599	44	92~255	88~229	71	61~202	56~172
18	142~526	188~574	45	91~253	87~226	72	58~198	55~170
19	143~501	182~539	46	90~250	85~224	73	56~194	54~167
20	142~470	175~499	47	90~250	83~221	74	54~190	53~165
21	139~436	168~459	48	89~248	82~219	75	52~185	52~163
22	135~405	161~425	49	88~246	81~218	76	50~181	50~160
23	131~379	155~397	50	87~245	80~216	77	48~177	49~158
24	128~356	151~375	51	87~243	79~215	78	45~172	48~155
25	125~337	147~358	52	86~242	78~213	79	43~167	44~152
26	119~329	146~336	53	85~240	77~212	80以上	41~163	43~149

[6761] 卵巣刺激ホルモン(FSH) 基準値

(単位: mIU/mL)

女 性	卵胞期	3.01~14.72
	排卵期	3.21~16.60
	黄体期	1.47~ 8.49
	閉経後	157.79以下
男 性		2.00~ 8.30

[6760] 黄体形成ホルモン(LH) 基準値

(単位: mIU/mL)

女 性	卵胞期	1.76~10.24
	排卵期	2.19~88.33
	黄体期	1.13~14.22
	閉経後	5.72~64.31
男 性		0.79~ 5.72

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
A446 6 (48010)	トリヨードサイロニン (T ₃) [CLEIA] 4B010-0000-023-052	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	99 ※5	CLEIA	0.62~1.16 (ng/mL)	&I
A449 3 (48015)	遊離トリヨードサイロニン (Free T ₃)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	1~2	121 ※5	CLEIA	2.52~4.06 (pg/mL)	
A452 9 (48030)	サイロキシシン (T ₄) [CLEIA] 4B030-0000-023-052	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	105 ※5	CLEIA	4.53~8.38 (μg/dL)	&I
A455 6 (48035)	遊離サイロキシシン (Free T ₄)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	1~2	121 ※5	CLEIA	0.75~1.45 (ng/dL)	
9089 4 (48045)	サイロキシシン結合 グロブリン(TBG)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	130 ※5	CLEIA	14~31 (μg/mL)	&3
A472 7 (48040)	サイログロブリン [CLEIA] 4B040-0000-023-052	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (23日)	2~4	128 ※5	CLEIA	35.1以下 (ng/mL)	
A469 1 (56290)	抗サイログロブリン抗体 [CLEIA] 5G290-0000-023-052	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	136 ※6	CLEIA	19.3未満 (IU/mL)	
A458 3 (56285)	抗甲状腺 ペルオキシダーゼ抗体 (抗TPO抗体) [CLEIA] 5G285-0000-023-052	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	① 138 ※6	CLEIA	3.3未満 (IU/mL)	&I
A477 2 (4A056)	甲状腺刺激ホルモン (TSH) [CLEIA]IFCC	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	1~2	98 ※5	CLEIA	0.61~4.23 (μIU/mL)	
A475 4 (56310)	TSHレセプター抗体 [CLEIA] 5G310-0000-023-052	血清 0.8	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	① 208 ※6	CLEIA	2.0未満 (IU/L)	TSHレセプターのTSH結合部位を認識するM22抗体(抗TSHレセプターヒトモノクローナル抗体)を用いた第3世代TRAbです。 &I
B977 6 (56300)	甲状腺刺激抗体 (TSAb)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	① 330 ※6	Bioassay	110未満 (%)	溶血でのご依頼は避けてください。 (溶血検体では、測定値が低値となる可能性があります。) &1

①「抗TSHレセプター抗体(TRAb)」及び「甲状腺刺激抗体(TSAb)」を同時に行った場合は、いずれか一方のみ算定する。



内分泌学的検査

副甲状腺関連検査

内分泌学的検査

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
3154 7 (40025)	副甲状腺ホルモン (PTH)-インタクト	冷却遠心 血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	1~2	161 ※5	ECLIA	10~65 (pg/mL)	不
6475 8 (40026)	副甲状腺ホルモン (Whole PTH)	血漿 0.5	C ↓ X	冷蔵 (14日)	2~4	※5	CLEIA	8.3~38.7 (pg/mL)	指定の容器に採血し、よく混和させ、 血漿分離してください。血漿は冷蔵 保存してください。 &I
3624 5 (40030)	副甲状腺ホルモン 関連蛋白(PTHrP)	冷却遠心 血漿 0.5	D ↓ X	凍結 (7日)	5~7	185 ※4	RIA固相法 (IRMA)	1.1以下 (pmol/L)	不 指定の容器に採血し、よく混和させ、 低温(4℃)で血漿分離してください。 血漿は必ず凍結保存してください。 &1
3155 6 (40035)	カルシトニン	速やかに遠心 血清 0.5	01 ↓ X	凍結	2~4	127 ※5	ECLIA	男性 9.52以下 女性 6.40以下 (pg/mL)	速やかに血清分離後凍結保存してく ださい。 &I
3794 7 (30070)	1,25-(OH) ₂ ビタミンD	血清 0.6	01 ↓ X	冷蔵	3~7	① 388 ※4	RIA2抗体法	成人 20.0~60.0 小児 20.0~70.0 (pg/mL)	&1
A220 6 (42280)	オステオカルシン	血清 0.3	01 ↓ X	凍結	2~4	② 153 ※5	ECLIA	閉経前女性 7.8~30.8 閉経後女性 14.2~54.8 男性 8.4~33.1 (ng/mL)	溶 &I
4716 2 (50123)	I型コラーゲン架橋 N-テロペプチド (NTx)	部分尿3	Y	冷蔵	2~4	②③ 153 ※5 (腫2)	CLEIA	下記参照	午前中の第二尿をご提出ください。 血尿での提出は避けてください。
4742 3 (50146)	デオキシピリジノリン	部分尿3	Y	冷蔵	2~4	②③ 191 ※5 (腫2)	EIA	クレアチニン換算値 M2.1~5.4 F2.8~7.6 (nmol/mmol・CRE)	&1
3345 5 (38072)	骨型アルカリフォス ファターゼ(BAP)	血清 0.8	01 ↓ X	冷蔵	2~4	④ 157 ※5	CLEIA	男性 3.7~20.9 閉経前女性 2.9~14.5 閉経後女性 3.8~22.6 (μg/L)	&I
A197 3 (50120)	I型プロコラーゲン -N-プロペプチド (total P1NP)	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	④ 160 ※5	ECLIA	男性(30~83歳) 18.1~74.1 閉経前女性(30~44歳) 16.8~70.1 閉経後女性(45~79歳) 26.4~98.2 (ng/mL)	溶 溶血でのご依頼は避けてください (溶血の場合、データが低値傾向とな ります。) &I

(腫2): 悪性腫瘍特異物質治療管理料 (35ページ参照)

- ① 活性型ビタミンD3剤による治療開始後1月以内においては2回を限度とし、その後は3月に1回を限度として算定する。
 ② [NTx], 「オステオカルシン」, 「尿中DPD」, 「TRACP-5b」を併せて実施した場合は、いずれか1つのみ算定する。
 ③ 骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また、薬剤治療方針を変更した時は変更後6月以内に1回に限り算定できる。
 ④ 「骨型アルカリフォスファターゼ (BAP)」, 「インタクト I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド (Intact P1NP)」, 「I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド (P1NP)」
 及び「ALP・アイソザイム (PAG電気泳動法)」のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

[4716] I型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx)基準値, 判定基準

(単位: nmolBCE/mmol・CRE)

基準値 (参考値)	男 性	13.0~66.2
	閉経前女性	9.3~54.3
	閉経後女性	14.3~89.0
判定基準	骨吸収亢進の指標	55以上
	副甲状腺摘出術の適応	200以上
	悪性腫瘍(乳癌, 肺癌, 前立腺癌) の骨転移の指標	100以上

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
副 腎 髄 質 関 連 検 査	4016 9 (4E060)	VMA	血漿 1.5	A ↓ X	冷蔵 (21日)	4~6	90 ※5	HPLC	3.3~8.6 (ng/mL)	指定容器に採血し、よく混和させ、 血漿分離してください。血漿は冷蔵 保存してください。 & 1
	4513 7 (4E060)		酸性蓄尿 1.5	Y	冷蔵 (28日)				1.5~4.3 (mg/day)	所定量の専用蓄尿添加剤を入れた 蓄尿瓶に尿を24時間蓄尿し、よく混 和後必要量をご提出ください。酸性 蓄尿されていないものはデータに影 響がみられますので、必ず専用蓄尿 添加剤を入れてください。 & 1
	4017 8 (4E055)	HVA	血漿 1.5	A ↓ X	冷蔵 (21日)	4~6	69 ※5	HPLC	4.4~15.1 (ng/mL)	指定容器に採血し、よく混和させ、 血漿分離してください。血漿は冷蔵 保存してください。 & 1
	7603 4 (4E055)		髄液 1.5	X					(ng/mL)	& 1
	4514 6 (4E055)		酸性蓄尿 1.5	Y	冷蔵 (28日)				2.1~6.3 (mg/day)	所定量の専用蓄尿添加剤を入れた 蓄尿瓶に尿を24時間蓄尿し、よく混 和後必要量をご提出ください。酸性 蓄尿されていないものはデータに影 響がみられますので、必ず専用蓄尿 添加剤を入れてください。 & 1
	A299 0 (4E040)	メタネフリン・ ノルメタネフリン分画	酸性蓄尿 2	Y	冷蔵 (28日)	4~6	① 220 ※5	LC/MS/MS	メタネフリン 0.04~0.19 ノルメタネフリン 0.09~0.33 (mg/day)	& 1
	4506 5 (4E065)	4E065-0000-019-204	血液 1.0 (EDTA-2Na加)	C ↓ X		3~16		HPLC	57~230 (ng/mL)	(検体のご提出について) 血液はポリ スピッツに移し替え必ず凍結保存に てご提出ください。 & 1
	4010 5 (4E065)	セロトニン 4E065-0000-022-204	速やかに 冷却 血漿 1.5	A ↓ X	凍結				P(血漿) 0.04~0.35 PRP(多血小板血漿) 0.17~0.62 (μg/mL)	P: 低温(4℃)で1500rpm 10分間血漿分離 PRP: 低温(4℃)で900rpm 20分間血漿分離 指定の容器に採血し、よく混和させ、 速やかに低温(4℃)で900rpm20 分間 (PRP) または1500rpm10分 間 (P) で血漿分離してください。血 漿は必ず凍結保存してください。 & 1
	4015 0 (4E070)	5-HIAA	血漿 1.5	A ↓ X	冷蔵 (25日)	4~6	95 ※5	HPLC	1.8~6.1 (ng/mL)	指定容器に採血し、よく混和させ、 血漿分離してください。血漿は冷蔵 保存してください。 & 1
	7601 6 (4E070)		髄液 1.5	X					(ng/mL)	& 1
	4512 8 (4E070)		酸性蓄尿 0.5	Y	冷蔵 (28日)				1.0~6.0 (mg/day)	所定量の専用蓄尿添加剤を入れた 蓄尿瓶に尿を24時間蓄尿し、よく混 和後必要量をご提出ください。酸性 蓄尿されていないものはデータに影 響がみられますので、必ず専用蓄尿 添加剤を入れてください。 & 1

①「メタネフリン」、「メタネフリン・ノルメタネフリン分画」、「ノルメタネフリン」又は「遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画」のうちいずれかを併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。



内分泌学的検査

副腎髄質関連検査／副腎皮質関連検査

内分泌学的検査

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
4504 7 (4E010)	カテコールアミン総	酸性蓄尿 2	Y	冷蔵 (28日)	4~6	184 ※5	HPLC	52.0~195.3 ($\mu\text{g/day}$)	所定量の専用蓄尿添加剤を入れた蓄尿瓶に尿を24時間蓄尿し、よく混和後必要量をご提出ください。酸性蓄尿されていないものはデータに影響がみられますので、必ず専用蓄尿添加剤を入れてください。 & 1
4710 8 (4E016)	カテコールアミン3分画 (A:アドレナリン NA:ノルアドレナリン DA:ドーパミン)	速やかに冷却 血漿 1.5	A ↓ X	凍結 (1ヵ月)	4~6	161 ※5	HPLC	アドレナリン 100以下 ノルアドレナリン 100~450 ドーパミン 20以下 (pg/mL)	指定の容器に採血し、よく混和させ、速やかに低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。 & 1
4508 3 (4E016)		酸性蓄尿 2	Y	冷蔵 (28日)				アドレナリン 3.4~26.9 ノルアドレナリン 48.6~168.4 ドーパミン 365.0~961.5 ($\mu\text{g/day}$)	所定量の専用蓄尿添加剤を入れた蓄尿瓶に尿を24時間蓄尿し、よく混和後必要量をご提出ください。酸性蓄尿されていないものはデータに影響がみられますので、必ず専用蓄尿添加剤を入れてください。 & 1
4014 1 (4E050)	ドーパミン総	速やかに冷却 血漿 1.5	A ↓ X	凍結	5~18		HPLC	1.8~7.7 (ng/mL)	指定の容器に採血し、よく混和させ、速やかに低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。 & 1
7608 9 (4E050)		髄液 1.5	X					(ng/mL)	& 1
4018 7 (4E045)	L-ドーパ 4E045-0000-022-204	速やかに冷却 血漿 1.5	A ↓ X	凍結	5~18		HPLC	1.2~2.2 (ng/mL)	指定の容器に採血し、よく混和させ、速やかに低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。 & 1
3050 2 (4D035)	血中11-OHCS	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~8	60 ※5	蛍光法 (De Moor変法)	午前10時採血 7.0~23.0 ($\mu\text{g/dL}$)	& 1
4019 6 (4D040)	コルチゾール	血漿 0.5	C ↓ X	凍結 (21日)	2~4	121 ※4	ECLIA	午前6時~10時 7.07~19.6 ($\mu\text{g/dL}$)	血漿:早朝安静時に指定容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。血漿は凍結保存してください。 & I
3051 1 (4D040)		血清 0.5	01 ↓ X	凍結					
9073 1 (4D115)	アルドステロン [CLEIA]	血漿 0.5	C ↓ X	凍結 (21日)	2~4	122 ※5	CLEIA	4.0~82.1 (pg/mL)	血漿: 指定の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。血漿は凍結保存してください。 下記参照*1 & I
9039 9 (4D115)		血清 0.5	01 ↓ X						
A730 0 (4D115)		蓄尿 1.5	X		5~7			1.0~19.3 ($\mu\text{g/day}$)	蓄尿剤として塩酸およびC-ペプチド安定化剤を使用しないでください。 & I
3055 7 (4D090)	デヒドロエピアンドロ ステロンサルフェート (DHEA-S)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	164 ※5	CLEIA法	下記参照	性別、年齢を明記してください。 & I

*1 「アルドステロン(CLEIA)」, 「アルドステロン(CLEIA)/レニン濃度比」, 「アルドステロン(CLEIA)/レニン活性比」は同時依頼はできません。

アルドステロン(CLEIA)の留意事項

- 採血時間は午前が推奨されています。
- 採血は座位で15分間安静後をお勧めいたします。

[3055]デヒドロエピアンドロステロンサルフェート(DHEA-S)基準値

(単位: $\mu\text{g/dL}$)

年齢(歳)	男 性	女 性
18~20	24~537	51~321
21~30	85~690	18~391
31~40	106~464	23~266
41~50	70~495	19~231
51~60	38~313	8~188
61~70	24~244	12~133
71~	5~253	7~177

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
3079 1 (4F045)	プロゲステロン	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	139 ※5	ECLIA	下記参照	性別を明記してください。また妊婦の場合は妊娠週数を明記してください。 &3
4545 2 (4F055)	プレグナンジオール	蓄尿 12	Y	冷蔵 (28日)	5~7	213 ※5	Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MS)法 (酵素水解法)	下記参照	性別を明記してください。
4546 1 (4F060)	プレグナントリオール	蓄尿 12	Y	冷蔵 (28日)	5~7	232 ※5	Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MS)法 (酵素水解法)	下記参照	&1
3081 8 (4F065)	テストステロン	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4	119 ※5	ECLIA	M 1.31~8.71 F 0.11~0.47 (ng/mL)	性別を明記してください。 &3
A221 5 (4F070)	フリーテストステロン	血清 0.3	01 ↓ X	凍結	2~6	156 ※4	RIA固相法	下記参照	午前中に採血してください。 性別, 年齢を明記してください。 &1
G617 0 (4F025)	エストラジオール(E ₂)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	167 ※5	ECLIA	下記参照	性別を明記してください。また妊婦の場合は妊娠週数を明記してください。 &3

[3079]プロゲステロン基準値

(単位: ng/mL)

非妊婦	女性	卵 胞 期	0.28以下
		排 卵 期	5.69以下
		黄 体 期	2.05~24.2
		閉 経 後	0.33以下
	男 性	0.22以下	
妊婦	4~13週(妊娠前期)		13.0~51.8
	14~27週(妊娠中期)		24.3~82.0
	28~38週(妊娠後期)		63.5~174

プレグナンジオール基準値

(単位: mg/day)

非妊婦	卵 胞 期	0.28~1.42
	黄 体 期	0.79~6.83
	男 性	0.16~0.79
妊婦	前 期	1.29~6.08
	中 期	3.05~24.22
	後 期	9.10~60.51

[4546]プレグナントリオール基準値

(単位: mg/day)

女性	卵 胞 期	0.13~1.30
	分 泌 期	0.13~1.90
	閉 経 期	0.02~0.83
	男 性	0.13~1.60

[A221]フリーテストステロン年齢別・性別における基準値(メーカー参考値)

(単位: pg/mL)

年 齢	男 性	女 性
20~29	7.6~23.8	0.4~2.3
30~39	6.5~17.7	0.6~2.5
40~49	4.7~21.6	0.3~1.8
50~59	4.6~19.6	0.8~1.7
60~69	5.3~11.5	
70以上	4.6~16.9	

[G617]エストラジオール(E₂)基準値(血中)

(単位: pg/mL)

非妊婦	女性	卵胞期	28.8~196.8
		排卵期	36.4~525.9
		黄体期	44.1~491.9
		閉経後	47.0以下
	男 性	14.6~48.8	
妊婦	妊娠初期		208.5~4289
	妊娠中期		2808~28700
	妊娠後期		9875~31800



内分泌学的検査

性腺・胎盤関連検査

内分泌学的検査

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
性腺・胎盤関連検査	B889 4 (4F080)	絨毛性ゴナドトロピン (βHCG)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2～4	① 130 ※5	CLEIA	4.0以下 (mIU/mL)	トータルのHCGを測定しています。 抗体はHCG-βを認識しています。 絨毛性疾患の診断、予後管理に有用 です。絨毛性疾患取り扱い規約第3 版における推奨方法で、測定感度は 1.0mIU/mLです。 &3
	C908 1 (4F090)	遊離HCG-β (HCG-βサブユニット) 4F090-0000-023-051	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2～4	① 129 ※5	CLIA	1.00未満 (ng/mL)	本検査法 (CLIA 法) は、がん再燃 の診断及びモニタリングでの臨床使 用には適しておりません。 &3
	8775 3 (3B200)	子宮頸管粘液中 顆粒球エラスターゼ	子宮頸管 粘液	W6	凍結 (1ヵ月)	2～4	113 ※1	ラテックス 凝集免疫法	1.60以下 (μg/mL)	検体採取方法は168ページをご参照 ください。 &3
	L154 9 (5C111)	ヒト癌胎児性 フィブロネクチン	腔分泌物	W5	凍結 (1ヵ月)	2～4	② 204 ※6	ELISA	陰性	検体採取方法は167ページをご参照 ください。 &1

- ①「HCG-βサブユニット」、「HCG定性」、「HCG」、「HCG半定量」を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
②「ヒト癌胎児性フィブロネクチン」及び「IGFBP-1」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。



	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
膵・ 消化管 関連 検査	3070 0 (46010)	インスリン	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	1~2	100 ※5	CLEIA	負荷前 1.84~12.2 (μIU/mL)	溶
	L386 2 (46020)	C-ペプチド(CPR)	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵				負荷前 0.61~2.09 (ng/mL)	&I
	4503 8 (46020)		蓄尿 1	Y	凍結 (20日)	2~4	① 105 ※5	CLEIA	29.2~167 (μg/day)	重酸 蓄尿は冷蔵保存しながら行うかあらかじめ専用保存剤を蓄尿容器に一袋全量(10g/袋 最終濃度約0.5%)を入れて蓄尿を行ってください。他項目との重複依頼は避けてください。&I
	B949 7 (46030)	膵グルカゴン	速やかに 冷却 血清 0.5	D ↓ X	凍結 (28日)	5~11	150 ※5	ELISA	空腹時 8.8~45.2 (pg/mL)	重酸 指定の容器(PAP)に採血し、よく混和させ、1時間以内に低温(4℃)で血漿分離し、直ちに凍結保存してください。他項目との重複依頼は避けてください。&1
	A212 5 (5G340)	抗GAD抗体	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4	⑦ 134 ※5	ELISA	5.0未満 (U/mL)	&1
	A263 9 (5G342)	抗IA-2抗体	血清 0.6	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	3~9	213 ※5	ELISA	0.6未満 (U/mL)	
	K485 3 (5G360)	インスリン抗体	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	3~7	107 ※6	RIA	0.4未満 (U/mL)	&1
心 臓 関 連 検 査	4033 0 (42270)	ヒト心房性ナトリウム 利尿ペプチド(HANP)	速やかに 冷却 血清 0.5	D ↓ X	凍結 (21日)	2~4	② 221 ※5	CLEIA	43.0以下 (pg/mL)	安静時に指定の採取量を指定の容器に採血しよく混和させ低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。&1
	4263 5 (42271)	ヒト脳性ナトリウム 利尿ペプチド(BNP)	速やかに遠心 血清 0.5	C ↓ X	凍結	1~2	②③ 130 ※5	CLEIA	18.4以下 (pg/mL)	安静時に指定の容器に採血し、よく混和させ、冷蔵保存にて6時間以内に血漿分離してください。血漿は速やかに凍結保存してください。
	E682 0 (42272)	ヒト脳性ナトリウム 利尿ペプチド前駆体 N端フラグメント (NT-proBNP)	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	1~2	②③ 136 ※5	ECLIA	125以下 (pg/mL)	125pg/mLは心不全除外カットオフ値です。
	3649 8 (5C091)	ヒト心臓由来脂肪酸 結合蛋白(H-FABP)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	④ 131 ※4	ラテックス凝 集法	6.2未満 (ng/mL)	&3
	B836 2 (5C090)	ミオグロビン	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	④ 131 ※4	CLEIA	男性 15.8~105.9 女性 10.5~70.0 (ng/mL)	&I
	B801 0	尿中ミオグロビン [CLEIA]	部分尿 6	Y5	冷蔵 (22日)	2~4	④ 131 ※4	CLEIA	2.0未満 (ng/mL)	凍 採取した尿を速やかに専用容器のラベルに印刷してある線まで入れ、よく混和させ冷蔵保存にてご提出ください。凍結保存は避けてください。&I
	3173 6 (5C092)	心室筋ミオシン軽鎖 I	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~6	⑤ 184 ※4	EIA	2.5以下 (ng/mL)	&1
	9532 1 (5C093)	心筋トロポニンT	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (14日)	2~4	⑥ 109 ※4	ECLIA	0.014以下 急性心筋梗塞診断の カットオフ値 0.100 (ng/mL)	&I

- ① 同時に血液及び尿の両方の検体について測定した場合は、血液の場合の所定点数のみを算定する。
 ② 「NT-proBNP」、「HANP」及び「BNP」のうち2項目以上いずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
 ③ 心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月に1回に限り算定する。
 ④ 「H-FABP」、「ミオグロビン」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
 ⑤ 同一の患者につき同一日に当該検査を2回以上行った場合は、1回のみ算定する。
 ⑥ 「心筋トロポニンI」、「心筋トロポニンT」を同一月に併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
 ⑦ 抗GAD抗体は、すでに糖尿病の診断が確定した患者に対して、I型糖尿病の診断に用いる場合又は自己免疫介在性脳炎・脳症の診断に用いた場合に算定できる。

内分泌学的検査

その他

内分泌学的検査

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
A719 3 (42010)	レニン活性(PRA) (EIA)	冷却遠心 血漿 0.7	C ↓ X	凍結 (14日)	3~5	① 100 ※5	EIA	臥位 0.2~2.3 座位 0.2~3.9 立位 0.2~4.1 (ng/mL/hr)	指定の容器に採血し、よく混和させ、 低温(4℃)で血漿分離してください。 血漿は必ず凍結保存してください。 下記参照*3 &I
9040 7 (42020)	レニン濃度(ARC) [CLEIA]	血漿 0.5	C ↓ X	凍結 (21日)	2~4	① 102 ※5	CLEIA	2.21~39.5 (pg/mL)	指定の容器に採血し、よく混和させ、 血漿分離してください。血漿は必ず 凍結保存してください。 下記参照*2 &1
C975 7 (42020)		血清 0.5	O1 ↓ X						
B691 3 (40120)	アルドステロン [CLEIA] / レニン活性比	冷却遠心 血漿 1.2	C ↓ X	凍結 (14日)	3~5	122 + 100 ※5	アルドステロン: CLEIA レニン活性: EIA	下記参照	基準値は、日本内分泌学会の「原発性 アルドステロン症診療ガイドライン 2021」によるカットオフ値です。 指定の容器に採血し、よく混和させ、 低温(4℃)で血漿分離してください。 血漿は必ず凍結保存してください。 下記参照*1, 3 &I
B687 8 (40122)	アルドステロン [CLEIA] / レニン濃度比	血漿 1.0	C ↓ X	凍結 (21日)	2~4	122 + 102 ※5	CLEIA	下記参照	基準値は、日本内分泌学会の「原発性 アルドステロン症診療ガイドライン 2021」によるカットオフ値です。 指定の容器に採血し、よく混和させ、 血漿分離してください。血漿は必ず 凍結保存してください。 下記参照*1, 2 &I
D121 3 (40122)		血清 1.0	O1 ↓ X						
K157 7 (50072)	ペントラキシン3 (PTX3)	速やかに冷却 血漿 0.3	C ↓ X	凍結	3~16		ELISA	0.73~5.49 (ng/mL)	&1
4035 8 (42255)	サイクリックAMP	冷却遠心 血漿 0.3	C ↓ X	凍結 (1ヵ月)	事前に ご確認 ください。	161 ※5	RIA DCC法	11~21 (pmol/mL)	血漿：指定の容器に採血し、よく混 和させ、低温(4℃)で血漿分離し てください。血漿は必ず凍結保存し てください。
4558 8 (42255)		蓄尿 1	Y	凍結		161 ※5		1.8~6.3 (μmol/day)	蓄尿：トルエン1~2mLを入れて冷 暗所にて24時間蓄尿し、よく混和し 必要量をご提出ください。 &1
3795 6 (42315)	肝細胞増殖因子 (HGF)	血清 0.3	O1 ↓ X	凍結 (1ヵ月)	2~8	227 ※4	ELISA	0.39以下 (ng/mL)	&1
3171 8 (42275)	エリスロポエチン	血清 0.8	O1 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	209 ※5	CLEIA	4.2~23.7 (mIU/mL)	&I
K221 5 (42401)	アディポネクチン [LA]	血清 0.5	O1 ↓ X	冷蔵	2~4		ラテックス 免疫比濁法	4.0以上 (μg/mL)	&3

①「レニン活性」、「レニン濃度」を併せて行った場合は、一方の所定点数のみ算定する。

*1 「アルドステロン(CLEIA)」, 「アルドステロン(CLEIA)/レニン濃度比」, 「アルドステロン(CLEIA)/レニン活性比」は同時依頼はできません。

*2 「レニン濃度(ARC) (CLEIA)」, 「アルドステロン(CLEIA)/レニン濃度比」は同時依頼はできません。

*3 「レニン活性(PRA) (EIA)」, 「アルドステロン(CLEIA)/レニン活性比」は同時依頼はできません。

アルドステロン(CLEIA)/レニン活性比の留意事項

- 採血条件は早朝空腹時の安静臥位後が望ましいが、スクリーニングでは随時座位で行ってよい、とされています。

アルドステロン(CLEIA)/レニン濃度比の留意事項

- 採血条件は早朝空腹時の安静臥位後が望ましいが、スクリーニングでは随時座位で行ってよい、とされています。
- 冷蔵保存した場合、レニン濃度の上昇が認められます。

(B691 3)アルドステロン(CLEIA)/レニン活性比 基準値 (B687 8)アルドステロン(CLEIA)/レニン濃度比

アルドステロン(CLEIA) (pg/mL)	レニン活性(PRA) (EIA) (ng/mL/hr)	レニン濃度(ARC) (CLEIA) (pg/mL)
4.0~82.1	臥位 0.2~2.3	2.21~39.5
	座位 0.2~3.9	
	立位 0.2~4.1	

アルドステロン(CLEIA)/レニン活性比
100未満

アルドステロン(CLEIA)/レニン濃度比
20未満

Y5


保存剤入り
(容器容量10mL)
貯蔵方法 室温
有効期間 2年

D


EDTA-2Na +
アプロチニン入り
(真空採血量3mL)
内容
EDTA-2Na
3.75mg
アプロチニン
(1500単位)
貯蔵方法 室温
有効期間 1年

C


EDTA-2Na入り
(真空採血量
2mLまたは5mL)
内容
EDTA-2Na
3.0mgまたは
7.5mg
貯蔵方法 室温
有効期間 2年

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
腫瘍	0072 1 (5D010)	癌胎児性抗原 (CEA)	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	1~2	① 99 ※5 (腫2)	CLEIA	5.0以下 (ng/mL)	
	E821 5 (5D560)	血清抗p53抗体	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	163 ※5 (腫2)	CLEIA	1.30以下 (U/mL)	& 1
	0073 0 (5D015)	α-フェトプロテイン 定量	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	1~2	98 ※5 (腫2)	CLEIA	10.0以下 (ng/mL)	
	8608 8 (5D520)	PIVKA-II	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	131 ※5 (腫2)	CLEIA	40未満 (mAU/mL)	& I 指定の容器に採血し、よく混和させ、 血漿分離してください。血漿は冷蔵 保存してください。
	4043 9 (5D520)		血漿 0.5	C ↓ X	冷蔵					
	3108 8 (5D170)	DUPAN-2	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4	① 115 ※4 (腫2)	EIA	150以下 (U/mL)	& 1
	3037 7 (3B195)	エラスターゼ1	血清 0.5	01 ↓ X	凍結	2~4	120 ※4 (腫2)	ラテックス 免疫比濁法	300以下 (ng/dL)	& 3
	0074 9 (5D130)	CA19-9	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	1~2	121 ※4 (腫2)	CLEIA	37.0以下 (U/mL)	
	3113 2 (5D220)	SPan-1	血清 0.2	01 ↓ X	冷蔵	2~4	144 ※4 (腫2)	RIA固相法 (IRMA)	30以下 (U/mL)	
	3114 1 (5D200)	NCC-ST-439	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	112 ※4 (腫2)	EIA	女性 49歳以下 7.0未満 50歳以上 4.5未満 男性 4.5未満 (U/mL)	& 1
関連	L433 9 (5D120)	CA15-3	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4	② 112 ※4 (腫2)	CLEIA	25.0以下 (U/mL)	
	3116 9 (5D125)	BCA225	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	158 ※4 (腫2)	CLEIA	160未満 (U/mL)	& 1
	E871 0 (5D590)	血清 HER2タンパク	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	(腫2)	CLIA	15.2以下 (ng/mL)	& 3
	3065 6 (5D177)	シアリルLe ^x 抗原 (CSLEX) 5D177-0000-023-023	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~8	② 152 ※4 (腫2)	EIA	8.0未満 (U/mL)	& 1
	3117 8 (5D175)	シアリルLe ^x -i抗原 (SLX)	血清 0.2	01 ↓ X	冷蔵	2~4	140 ※4 (腫2)	RIA固相法 (IRMA)	38以下 (U/mL)	④ 溶血でのご依頼は避けてください。 & 1
	A061 3 (5D308)	PSA F/T比	血清 0.8	01 ↓ X	凍結 (21日)	2~4	150 ※4 (腫2)	CLEIA	25 (PSA4.00~ 10.0ng/mLにおけ るカットオフ値) (%)	本項目は、PSA とフリー PSA の測 定結果も併せてご報告いたします。 (基準値について) 25% は PSA4.00 ~10.0ng/mL における前立腺癌と 非癌 (前立腺肥大症等) との判別に 用いるカットオフ値です。(低値ほど 前立腺癌の確率が高くなります。)& 3
	A074 9 (5D305)	前立腺特異抗原 (PSA)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	1~2	③ 121 ※4 (腫2)	CLEIA	4.00以下 (ng/mL)	前立腺肥大症と前立腺癌の判別に用 いるカットオフ値は3.6ng/mL が推 奨されます。
	3121 3 (5D310)	γ-セミノプロテイン (γ-Sm)	血清 0.5	01 ↓ X	凍結 (21日)	2~4	187 ※4 (腫2)	CLEIA	4.0以下 (ng/mL)	(基準値について) 4.0ng/mL は良性 疾患との鑑別値です。 & 3

①「CEA」,「DUPAN-2」を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

②「CSLEX」,「CA15-3」を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

③診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像等の結果から、前立腺癌の患者であることを強く疑われる者に対して検査を行った場合に、前立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に原則として、1回を限度として算定する。ただし、前立腺特異抗原(PSA)の検査結果が4.0ng/mL以上であって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を上限として算定できる。

(腫2): 悪性腫瘍特異物質治療管理料 (35 ページ参照)

腫瘍関連検査

腫瘍関連検査

腫瘍関連検査

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
8768 1 (5C124)	I型コラーゲンC末端 テロペプチド (ICTP)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4	腫2	RIA2抗体法	4.5未満 (ng/mL)	&1
4716 2 (5C123)	I型コラーゲン架橋 N-テロペプチド (NTx)	部分尿 3	Y	冷蔵	2~4	12 153 ※5 腫2	CLEIA	下記参照	午前中の第二尿をご提出ください。 血尿での提出は避けてください。
4742 3 (5C146)	デオキシピリジノリン	部分尿 3	Y	冷蔵	2~4	12 191 ※5 腫2	EIA	クレアチニン 換算値 M 2.1~5.4 F 2.8~7.6 (nmol/mmol・CRE)	&1
L385 3 (5D100)	CA125	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4	3 136 ※5 腫2	CLEIA	35.0以下 (U/mL)	&I
3448 1 (5D155)	CA54/61	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	4~17	184 ※5 腫2	ELISA	12以下 (U/mL)	&1
3012 4 (5D150)	CA72-4	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	146 ※5 腫2	ECLIA	10.0以下 (U/mL)	&I
3126 8 (5D300)	SCC	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	101 ※5 腫2	CLEIA	2.5以下 (ng/mL)	唾液・フケ・皮膚(表皮)・毛髪・爪 などの混入により高値傾向を示す場 合がありますので検体の取り扱いに は十分にご注意ください。 &I
3797 4 (5D325)	シフラ(CYFRA) (サイトケラチン 19フラグメント)	血清 0.8	01 ↓ X	冷蔵	2~4	154 ※5 腫2	CLEIA	3.5以下 (ng/mL)	検体の混和・攪拌により低値傾向を 示す場合がありますので検体の取り 扱いにはご注意ください。 &I
3664 1 (5D550)	ガストリン放出 ペプチド前駆体 (ProGRP)	血漿 0.4	C ↓ X	凍結	2~4	4 175 ※5 腫2	CLEIA	81未満 (pg/mL)	指定の容器に採血し、よく混和させ、 血漿分離してください。血漿は必ず 凍結保存してください。 &I
3127 7 (5D410)	NSE (神経特異エノラーゼ)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	4 142 ※5 腫2	ECLIA	16.3以下 (ng/mL)	採血後、1時間以内に血清分離し冷 蔵保存してください。 溶血でのご依頼は避けてください。 (溶血の場合、赤血球からNSEが逸 脱して高値となります。) &I
3129 5 (5D025)	塩基性フェトプロテイン (BFP) 5D025-0000-023-023	速やかに遠心 血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	2~8	150 ※5 腫2	EIA	75未満 (ng/mL)	採血後、2時間以内に血清分離して ください。 溶血でのご依頼は避けてください。 冷蔵にてご提出ください。 &1
A274 7 (5J095)	可溶性IL-2レセプター (sIL-2R)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	438 ※5 腫2	CLEIA	157~474 (U/mL)	&I
7874 4 (5D350)	5-S-システニルドーパ (5-S-CD)	血清 1.0	01 ↓ X	凍結	3~7		HPLC	1.5~8.0 (nmol/L)	&1
K440 2 (5D600)	可溶性メソレリン 関連ペプチド	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	4~10	220 ※5 腫2	CLEIA	1.5未満 (nmol/L)	&3

腫2: 悪性腫瘍特異物質治療管理料 (35ページ参照)

- ①「NTx」、「オステオカルシン」、「尿中DPD」、「TRACP-5b」を併せて実施した場合は、いずれか1つのみ算定する。
- ②骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また、薬剤治療方針を変更した時は変更後6月以内に1回に限り算定できる。
- ③「CA125」、「CA602」を併せて測定した場合は、主たるもののみ限り算定する。
- ④「ProGRP」を「NSE」と併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

[4716] I型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)基準値、判定基準

(単位: nmolBCE/mmol・CRE)

基準値(参考値)	男性	13.0~66.2
	閉経前女性	9.3~54.3
	閉経後女性	14.3~89.0
判定基準	骨吸収亢進の指標	55以上
	副甲状腺摘出術適応	200以上
	悪性腫瘍(乳癌、肺癌、前立腺癌)の骨転移の指標	100以上

腫瘍マーカー

腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定できます。

悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できません。ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。

ア)急性及び慢性肝炎の診断及び経過観察のために「エラスターゼ1」を行った場合

イ)肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について「 α -フェトプロテイン(AFP)」、「PIVKA-II半定量」又は「PIVKA-II定量」を行った場合(月1回に限る)

ウ)子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的として「CA125」、「CA602」を行った場合(診断または治療前及び治療後の各1回に限る)

エ)家族性大腸腺腫症の患者に対して「癌胎児性抗原(CEA)」を行った場合

悪性腫瘍特異物質治療管理料

太文字は総合検査案内書掲載項目です。

測定方法	検査項目		悪性腫瘍特異物質 治療管理料 (同一患者月1回)	加算点 (初回月)
1. 測定方法が一般的なもの 〔(腫1)で表示〕	尿中BTA		220点	
2. 測定方法が精密なもの 〔(腫2)で表示〕	癌胎児性抗原(CEA) α-フェトプロテイン定量 SCC TPA NCC-ST-439 CA15-3 DUPAN-2 エラスターゼ1 前立腺特異抗原(PSA) CA19-9 PIVKA-Ⅱ半定量 PIVKA-Ⅱ CA125 NSE(神経特異エノラーゼ) SPan-1 シアリルLe ^x -i抗原(SLX) CA72-4 シアリルTn抗原(STN) 塩基性フェトプロテイン(BFP) PSA F/T比 BCA225	シフラ(CYFRA)(サイトケラチン19フラグメント) シアリルLe ^x 抗原(CSLEX) 血清抗p53抗体 Ⅰ型コラーゲンC末端テロペプチド(ⅠCTP) ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP) CA54/61 癌関連ガラクトース転移酵素(GAT) CA602 α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%) 組織因子経路インヒビター2(TFPI2) γ-セミノプロテイン(γ-Sm) ヒト精巣上体タンパク4(HE4) 可溶性メソテリン関連ペプチド プロステートヘルスインデックス(phi) 癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液) 癌胎児性抗原(CEA)半定量(乳頭分泌液) 血清 HER2タンパク 可溶性IL-2レセプター(sIL-2R) Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx) デオキシビリジノリン 骨型酒石酸抵抗性フォスファターゼ(TRACP-56)	1項目 360点 2項目以上 400点	150点

C

EDTA-2Na入り
(真空採血量
2mLまたは5mL)
内容
EDTA-2Na
3.0mgまたは
7.5mg
貯蔵方法 室温
有効期間 2年



ウイルス感染症検査

抗体検査

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
抗 体 検 査	2426 6 (5F150)	アデノウイルス	速やかに遠心 血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	6~7		CF (補体結合反応)	4未満 (倍)	下記参照 (* CF) & E
	6119 3 (5F151)	1型								
	6120 1 (5F152)	2型								
	6121 0 (5F153)	3型								
	6122 9 (5F154)	4型								
	6123 8 (5F155)	5型								
	6124 7 (5F156)	アデノウイルス 6型	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	7~20	① 79 ※6	NT (中和反応)	4未満 (倍)	下記参照 (* NT)
	6125 6 (5F157)	7型								
	6127 4 (5F161)	11型								
	6128 3 (5F169)	19型								
	6112 0 (5F171)	21型								
	6129 2 (5F177)	37型								& 1

①ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(51ページ)を参照ください。

* CF(補体結合反応):補体結合反応におきましては抗補体作用がみられ、測定不能になる場合がありますので、抗凝固剤を入れずに採血して速やかに血清分離し冷蔵保存してください。
出発希釈 4倍(髄液の測定も可能です 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)

* NT(中和反応):細菌繁殖などにより細胞が汚染され、測定不能になる場合がありますのでご注意ください。
出発希釈 4倍(髄液の測定も可能です 検体量 各0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)

依頼方法および結果解釈

測定値は病状との関連で変動しますので、必ず急性期(発病後早期)および回復期(発病後2~3週間)の血清をペアで依頼してください。
なお、急性期と回復期を同時に測定し抗体価が4倍(2管差)以上の上昇が見られる場合は血清学的に有意とみなします。

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
6056 3 (5F400)	インフルエンザ ウイルス	A型 (H1N1) (H3N2)	血清 0.2	01 ↓ X	冷蔵	①② 79 ※6	HI (赤血球凝集 抑制反応)	A型(H1N1) 10未満 A型(H3N2) 10未満 (倍)	検査結果はWHO方式の血清希釈倍 数で表示しています。 下記参照(*HI) & 1
0386 3 (5F400)		A型	速やかに遠心 血清 0.3				CF (補体結合反応)	4未満 (倍)	下記参照(*CF) & E
6057 2 (5F410)		B型	血清 0.2				HI (赤血球凝集 抑制反応)	B-1 10未満 B-2 10未満 (倍)	検査結果はWHO方式の血清希釈倍 数で表示しています。 下記参照(*HI) & 1
0406 0 (5F410)		B型	速やかに遠心 血清 0.3				CF (補体結合反応)	4未満 (倍)	下記参照(*CF) & E
6052 7 (5F421)	パラ インフルエンザ ウイルス	1型	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	① 79 ※6	HI (赤血球凝集 抑制反応)	10未満 (倍)	検査結果はWHO方式の血清希釈倍 数で表示しています。 下記参照(*HI) & 1
6053 6 (5F422)		2型							
6054 5 (5F423)		3型							
9290 0 (5F430)	RSウイルス	血清 各0.2	速やかに遠心 血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	① 79 ※6	CF (補体結合反応)	4未満 (倍)	下記参照(*CF) & E
6081 5 (5F430)			血清 0.2				NT (中和反応)		下記参照(*NT) & 1
6104 9 (5F311)	エコーウイルス	1型	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	① 79 ※6	NT (中和反応)	4未満 (倍)	下記参照(*NT) & 1
6105 8 (5F313)		3型							
6106 7 (5F314)		4型							
6130 0 (5F315)		5型							
6107 6 (5F316)		6型							
6108 5 (5F317)		7型							
6109 4 (5F319)		9型							
6131 9 (5F321)		11型							
6138 2 (5F322)		12型							

①ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(51ページ)を参照ください。

②「インフルエンザウイルスA型」若しくは「インフルエンザウイルスB型」又は「インフルエンザウイルス抗原定性」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

* CF(補体結合反応):補体結合反応におきましては抗補体作用がみられ、測定不能になる場合がありますので、抗凝固剤を入れずに採血して速やかに血清分離し冷蔵保存してください。
出発希釈 4倍(髄液の測定も可能です 検体量 各0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)

* NT(中和反応):細菌繁殖などにより細胞が汚染され、測定不能になる場合がありますのでご注意ください。
出発希釈 4倍(髄液の測定も可能です 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)

* HI(赤血球凝集抑制反応):出発希釈 10倍(髄液の測定も可能です 検体量 各0.4mL(冷蔵) 基準値 10倍未満 出発希釈 10倍)

依頼方法および結果解釈

測定値は病状との関連で変動しますので、必ず急性期(発病後早期)および回復期(発病後2~3週間)の血清をペアで依頼してください。
なお、急性期と回復期を同時に測定し抗体価が4倍(2管差)以上の上昇が見られる場合は血清学的に有意とみなします。

ウイルス感染症検査

抗体検査

ウイルス感染症検査

項目コード (統一コード)	検 査 項 目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考							
抗体	6110 2 (5F323)	13型	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	7~18	79 ※6	NT (中和反応)	4未満 (倍)	下記参照(*NT)						
	6139 1 (5F324)	14型									7~20					
	6111 1 (5F326)	16型									5~18					
	6113 9 (5F327)	エコーウイルス 17型									7~18					
	6114 8 (5F328)	18型									5~18					
	6132 8 (5F329)	19型									7~20					
	6140 9 (5F331)	21型														
	6133 7 (5F332)	エコーウイルス 22型 (パレコウイルス1型)														
	6134 6 (5F334)	24型									7~18					
	6115 7 (5F335)	エコーウイルス 25型														
6116 6 (5F340)	30型															
検査	6089 7 (5F282)	A群2型	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	7~20	79 ※6	NT (中和反応)	4未満 (倍)	下記参照(*NT)						
	6090 5 (5F283)	A群3型														
	6091 4 (5F284)	A群4型														
	6092 3 (5F285)	A群5型														
	6093 2 (5F286)	A群6型														
	6094 1 (5F287)	A群7型								6~7	CF (補体結合反応)	下記参照(*CF)				
	6095 0 (5F289)	A群9型														
	9265 8 (5F289)	A群9型											速やかに遠心 血清 0.3			
	6096 9 (5F290)	A群10型											血清 各0.2	7~20	NT (中和反応)	下記参照(*NT)
	6097 8 (5F296)	A群16型														

①ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(51ページ)を参照ください。

*CF(補体結合反応):補体結合反応におきましては抗補体作用がみられ、測定不能になる場合がありますので、抗凝固剤を入れずに採血して速やかに血清分離し冷蔵保存してください。
 出発希釈 4倍(髄液の測定も可能です) 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)

*NT(中和反応):細菌繁殖などにより細胞が汚染され、測定不能になる場合がありますのでご注意ください。
 出発希釈 4倍(髄液の測定も可能です) 検体量 各0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)

依頼方法および結果解釈

測定値は病状との関連で変動しますので、必ず急性期(発病後早期)および回復期(発病後2~3週間)の血清をペアで依頼してください。
 なお、急性期と回復期を同時に測定し抗体価が4倍(2管差)以上の上昇が見られる場合は血清学的に有意とみなします。

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
抗体検査	6098 7 (5F301)	B群1型	血清 0.2	01 ↓ X	冷蔵	7~20	① 79 ※6	NT (中和反応)	4未満 (倍)	下記参照(*NT) &1
	9267 6 (5F301)	B群1型	速やかに遠心 血清 0.3			6~7		CF (補体結合反応)		下記参照(*CF) &E
	6099 6 (5F302)	B群2型	血清 0.2			7~20		NT (中和反応)		下記参照(*NT) &1
	A326 9 (5F302)	B群2型	速やかに遠心 血清 0.3			6~7		CF (補体結合反応)		下記参照(*CF) &E
	6100 3 (5F303)	B群3型	血清 0.2			7~20		NT (中和反応)		下記参照(*NT) &1
	9270 2 (5F303)	B群3型	速やかに遠心 血清 0.3			6~7		CF (補体結合反応)		下記参照(*CF) &E
	6101 2 (5F304)	B群4型	血清 0.2			7~20		NT (中和反応)		下記参照(*NT) &1
	A329 6 (5F304)	B群4型	速やかに遠心 血清 0.3			6~7		CF (補体結合反応)		下記参照(*CF) &E
	6102 1 (5F305)	B群5型	血清 0.2			7~20		NT (中和反応)		下記参照(*NT) &1
	A332 2 (5F305)	B群5型	速やかに遠心 血清 0.3			6~7		CF (補体結合反応)		下記参照(*CF) &E
	6103 0 (5F306)	B群6型	血清 0.2			7~20		NT (中和反応)		下記参照(*NT) &1
	A335 9 (5F306)	B群6型	速やかに遠心 血清 0.3			6~7		CF (補体結合反応)		下記参照(*CF) &E
ウイルス感染症検査	6117 5 (5F270)	エンテロウイルス 70型	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	6~19		NT (中和反応)	4未満 (倍)	下記参照(*NT) &1
	6118 4 (5F271)	71型								
	6041 9 (5F385)	日本脳炎ウイルス (JaGAr株)	血清 0.5			4~7	① 79 ※6	HI (赤血球凝集抑制反応)	ジャガー 10未満 ジャガー2ME 10未満 (倍)	下記参照(*HI) &1
	9217 1 (5F385)	日本脳炎ウイルス	速やかに遠心 血清 0.3			6~7	① 79 ※6	CF (補体結合反応)	4未満 (倍)	下記参照(*CF) &E

①ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(51ページ)を参照ください。

* CF(補体結合反応):補体結合反応におきましては抗補体作用がみられ、測定不能になる場合がありますので、抗凝固剤を入れずに採血して速やかに血清分離し冷蔵保存してください。

出発希釈 4倍(髄液の測定も可能です) 検体量 各0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)

* NT(中和反応):細菌繁殖などにより細胞が汚染され、測定不能になる場合がありますのでご注意ください。

出発希釈 4倍(髄液の測定も可能です) 検体量 各0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)

* HI(赤血球凝集抑制反応):日本脳炎ウイルス(JoGAr株):出発希釈10倍(髄液の測定も可能です)

検体量1.0mL(冷蔵) 基準値 10倍未満 出発希釈 10倍)

依頼方法および結果解釈

測定値は病状との関連で変動しますので、必ず急性期(発病後早期)および回復期(発病後2~3週間)の血清をペアで依頼してください。
なお、急性期と回復期を同時に測定し抗体価が4倍(2管差)以上の上昇が見られる場合は血清学的に有意とみなします。

ウイルス感染症検査

抗体検査

ウイルス感染症検査

	項目コード (統一コード)	検 査 項 目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考			
抗 体 検 査	6193 1 (5F432)	ムンプス ウイルス	IgM IgG	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	2～4	① 200 ※6	EIA	0.80未満 陰性 判定基準:下記参照	下記参照(* 捕捉法)	& 1	
	6191 3 (5F432)									2.0未満 陰性 判定基準:下記参照	下記参照(* 固相法)	& 1	
	6083 3 (5F432)	ムンプスウイルス	血清 各0.2				7～20	② 79 ※6	NT (中和反応)	4未満 (倍)	下記参照(* NT)	& 1	
	0409 7 (5F432)		速やかに遠心 血清 0.3						6～7		CF (補体結合反応)	下記参照(* CF)	& E
	6185 0 (5F431)	麻疹ウイルス	IgM IgG				血清 各0.2	2～4	① 200 ※6	EIA	0.80未満 陰性 判定基準:下記参照	下記参照(* 捕捉法)	& 1
	6183 2 (5F431)										2.0未満 陰性 判定基準:下記参照	下記参照(* 固相法)	& 1
	6082 4 (5F431)	麻疹ウイルス	血清 各0.2				7～11	② 79 ※6	NT (中和反応)	4未満 (倍)	下記参照(* NT)	& 1	

- ①グロブリンクラス別ウイルス抗体価(51ページ)を参照ください。
②ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(51ページ)を参照ください。
*捕捉法:髄液の測定も可能です 検体量 各0.4mL(冷蔵) 基準値 0.80未満 陰性
*固相法:髄液は測定可能ですが、参考値となります 検体量 各0.4mL(冷蔵)
*CF(補体結合反応):補体結合反応におきましては抗補体作用がみられ、測定不能になる場合がありますので、抗凝固剤を入れずに採血して速やかに血清分離し冷蔵保存してください。
出発希釈 4倍(髄液の測定も可能です 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)
*NT(中和反応):細菌繁殖などにより細胞が汚染され、測定不能になる場合がありますのでご注意ください。
出発希釈 4倍(髄液の測定も可能です 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)

依頼方法および結果解釈

測定値は病状との関連で変動しますので、必ず急性期(発病後早期)および回復期(発病後2~3週間)の血清をペアで依頼してください。
なお、急性期と回復期を同時に測定し抗体価が4倍(2管差)以上の上昇が見られる場合は血清学的に有意とみなします。

[6193, 6191]ムンプスウイルス [6185, 6183]麻疹ウイルス の判定基準

判 定	IgM(抗体指数)	IgG(EIA価)
—	0.80未満	2.0未満
±	0.80~1.20	2.0~3.9
+	1.21以上	4.0以上

[6185]麻疹ウイルスIgMの結果における注意事項

伝染性紅斑(パルボウイルスB19感染)、テング熱、突発性発疹(HHV6感染)などでも麻疹ウイルスIgMが陽性となる症例があることが報告されています。診断においては臨床症状および他の検査法を加味し、総合的に判断してください。

	項目コード (統一コード)	検 査 項 目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
抗体検査	6189 6 (5F395)	風疹ウイルス	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	2～4	① 200 ※6	EIA	0.80未満 陰性 判定基準：下記参照	下記参照（＊ 捕捉法） & 1
	6187 8 (5F395)								2.0未満 陰性 判定基準：下記参照	下記参照（＊ 固相法） & 1
	6045 5 (5F395)	風疹ウイルス	血清 0.2			3～5	② 79 ※6	HI (赤血球凝集 抑制反応)	8未満 (倍)	下記参照（＊ HI） & 1
	3502 0 (5F011)	ヒトパルボ ウイルスB19	血清 各0.2			2～4	① 200 ※6	EIA	0.80未満 陰性 判定基準：下記参照	捕捉法 & 1
	3501 1 (5F011)									固相法 & 1
	6173 3 (5F193)	水痘・帯状 疱疹 ウイルス	血清 各0.2			2～4	① 200 ※6	EIA	0.80未満 陰性 判定基準：下記参照	下記参照（＊ 捕捉法） & 1
	6171 5 (5F193)								2.0未満 陰性 判定基準：下記参照	下記参照（＊ 固相法） & 1
	6000 4 (5F193)	水痘・帯状 疱疹ウイルス	速やかに遠心 血清 0.3			6～7	② 79 ※6	CF (補体結合反応)	4未満 (倍)	下記参照（＊ CF） & E

①グロブリンクラス別ウイルス抗体価(51ページ)を参照ください。

②ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(51ページ)を参照ください。

* 捕捉法: 髄液の測定も可能です 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 0.80未満 陰性

* 固相法: 髄液の測定も可能です 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 0.20未満 陰性

* CF(補体結合反応): 補体結合反応におきましては抗補体作用がみられ、測定不能になる場合がありますので、抗凝固剤を入れずに採血して速やかに血清分離し冷蔵保存してください。
出発希釈 4倍(髄液の測定も可能です 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)

* HI(赤血球凝集抑制反応): 風疹ウイルス: 出発希釈 8倍(髄液の測定も可能です 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)

依頼方法および結果解釈

測定値は病状との関連で変動しますので、必ず急性期(発病後早期)および回復期(発病後2~3週間)の血清をペアで依頼してください。
なお、急性期と回復期を同時に測定し抗体価が4倍(2管差)以上の上昇が見られる場合は血清学的に有意とみなします。

[6189, 6187]風疹ウイルス [6173, 6171]水痘・帯状ヘルペスウイルス の判定基準

判 定	IgM(抗体指数)	IgG(EIA価)
—	0.80未満	2.0未満
±	0.80~1.20	2.0~3.9
+	1.21以上	4.0以上

[3502, 3501]ヒトパルボウイルスB19(判定基準)

判 定	抗体指数
—	0.80未満
±	0.80~0.99
+	1.00以上

ウイルス感染症検査

抗体検査

ウイルス感染症検査

	項目コード (統一コード)	検 査 項 目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
抗 体 検 査	6181 4 (5F190)	単純ヘルペス ウイルスIgM	血清 0.2	01 ↓ X	冷蔵	2～4	① 200 ※6	EIA	0.80未満 陰性 判定基準: 下記参照	下記参照(* 捕捉法) &1
	6179 7 (5F190)	単純ヘルペス ウイルスIgG	血清 0.2	01 ↓ X	冷蔵	2～4		EIA	2.0未満 陰性 判定基準: 下記参照	固相法 同時期の髄液と血清の双方を同時測定することにより、髄液中の局所産生抗体の証明が可能です。 &1
	6679 2 (5F190)		髄液 0.4	X					0.20未満 陰性 判定基準: 下記参照	
	6084 2 (5F191)	単純ヘルペス ウイルス	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	6～12	② 79 ※6	NT (中和反応)	4未満 (倍)	下記参照(* NT) 1型,2型間には抗原交差性があります。 &1
	6085 1 (5F192)	2型								
	2429 3 (5F190)	単純ヘルペスウイルス	速やかに遠心 血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	6～7	①③ 200 ※6	CF (補体結合反応)	4未満 (倍)	下記参照(* CF) &E
	B113 4 (5F194)	5F194-1432-023-051 サイトメガロ ウイルス	血清 各0.5	01 ↓ X	冷蔵	2～4		CLIA	0.85未満 陰性 判定基準: 下記参照 (Index)	&I
	B128 8 (5F194)	5F194-1431-023-051 IgG							6.0未満 陰性 判定基準: 下記参照 (AU/mL)	
A002 8 (5F194)	サイトメガロウイルス	速やかに遠心 血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	6～7	②③ 79 ※6	CF (補体結合反応)	4未満 (倍)	下記参照(* CF) &E	

① グロブリンクラス別ウイルス抗体価(51ページ)を参照ください。
② ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(51ページ)を参照ください。
③ 先天性サイトメガロウイルス感染の診断を目的として「サイトメガロウイルス核酸検出(新生児尿)」「サイトメガロウイルスIgG」「サイトメガロウイルスIgM」「サイトメガロウイルス」を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
* CF(補体結合反応): 補体結合反応におきましては抗補体作用がみられ、測定不能になる場合がありますので、抗凝固剤を入れずに採血して速やかに血清分離し冷蔵保存してください。
出発希釈 4倍(髄液の測定も可能です) 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)

* NT(中和反応): 細菌繁殖などにより細胞が汚染され、測定不能になる場合がありますのでご注意ください。
出発希釈 4倍(髄液の測定も可能です) 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)

* 捕捉法: 髄液の測定も可能です 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 0.80未満 陰性

* 固相法: 髄液の測定も可能です 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 0.20未満 陰性

依頼方法および結果解釈

測定値は病状との関連で変動しますので、必ず急性期(発病後早期)および回復期(発病後2~3週間)の血清をペアで依頼してください。
なお、急性期と回復期を同時に測定し抗体価が4倍(2管差)以上の上昇が見られる場合は血清学的に有意とみなします。

[4917]単純ヘルペスウイルスIgM [4915]単純ヘルペスウイルスIgG の判定基準

判定	IgM (抗体指数)	IgG(EIA価)	
		血清	髄液
—	0.80未満	2.0未満	0.20未満
±	0.80~1.20	2.0~3.9	0.20~0.39
+	1.21以上	4.0以上	0.40以上

[B113 4, B128 8]サイトメガロウイルスの判定基準

判定	IgG(AU/mL)	IgM(Index)
陰性	6.0未満	0.85未満
判定保留		0.85 ~ 1.00未満※2
陽性	6.0以上※1	1.00以上

※1: 6.0~15.0AU/mLの結果値の際には、適切な期間(例:2週間)内に再採取し再検査をお勧めします。
※2: 判定保留の際には、適切な期間(例:2週間)内に再採取し再検査をお勧めします。

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
抗体検査	6751 1 (5F203)	抗EA IgG	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	2~4	① 200 ※6	EIA	0.5未満 陰性 判定基準: 下記参照	&1
	6158 0 (5F202)	抗VCA IgM								
	6159 9 (5F202)	抗VCA IgG								
	6160 7 (5F204)	抗EBNA IgG								
	6144 5 (5F203)	抗EA-DR IgG					② 79 ※6	FA (蛍光抗体法)	10未満 (倍)	出発希釈 10倍
	6142 7 (5F202)	抗VCA IgM								
	6141 8 (5F202)	抗VCA IgG								
	6146 3 (5F204)	抗EBNA								
	6143 6 (5F202)	抗VCA IgA								
	6145 4 (5F203)	抗EA-DR IgA								

- ①グロブリンクラス別ウイルス抗体価(51ページ)を参照ください。
②ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(51ページ)を参照ください。

[6751]EBウイルス 抗EA IgG
[6158]EBウイルス 抗VCA IgM
[6159]EBウイルス 抗VCA IgG の判定基準
[6160]EBウイルス 抗EBNA IgG

判 定	抗体指数
—	0.5未満
±	0.5~0.9
+	1.0以上

ウイルス感染症検査

抗原検査

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
抗原検査	6703 4 (68655)	ウイルス分離	下記参照	V	冷蔵	4~69		細胞変性効果, 血球吸着現象, 赤血球凝集反応		凍結保存は避けてください。 分離、同定検査は以下の細胞を使用 しています。 PHfb (ヒト繊維芽細胞), HEp-2 (ヒ ト喉頭癌細胞), Vero (ミドリザル 腎細胞), MA104 (アカ毛ザル腎細 胞), RD-18S (ヒト横紋筋腫細胞), MDCK (イヌ腎細胞), B95a (マー モセットB細胞), AGMK (アフリ カミドリザル腎細胞), A549 (ヒト 肺癌細胞), Caco-2 (ヒト結腸腺癌 細胞) & 1
	6704 3 (68705)	ウイルス同定	※1参照	V	冷蔵	13~77		標準抗血清に よる中和反応・ 免疫蛍光抗体 法・赤血球凝 集抑制反応		

検査材料

ウイルス分離・同定検査を実施するためには適切な分離用検査材料と、同時に発病後できるだけ早期に採取することが大切です。ウイルス分離材料の選択は、分離率向上のため、できる限り複数の材料をご提出ください。

臨床症状	分離可能ウイルス	主要検査材料
上気道感染症	ライノ、パラインフルエンザ	咽頭ぬぐい液、鼻分泌液
	アデノ、コクサッキー、エコー	咽頭ぬぐい液、糞便
下気道感染症	インフルエンザ、パラインフルエンザ、アデノ、RS、サイトメガロ	咽頭ぬぐい液、喀痰、気管支洗浄液
	麻疹、風疹	咽頭ぬぐい液
紅斑性発疹症	エコー、コクサッキー	咽頭ぬぐい液、糞便
	単純ヘルペス、水痘・带状疱疹	水疱内容
水疱性発疹症	コクサッキー、エンテロ71	水疱内容、咽頭ぬぐい液、糞便
	エコー、コクサッキー	咽頭ぬぐい液、髄液、糞便
中枢神経系疾患	水痘・带状疱疹、ムンプス	咽頭ぬぐい液、髄液
	サイトメガロ、風疹	咽頭ぬぐい液、尿、髄液
先天性異常	単純ヘルペス、水痘・带状疱疹	水疱内容
	エコー、コクサッキー、アデノ	咽頭ぬぐい液、糞便
嘔吐・下痢症	アデノ	尿
出血性膀胱炎	アデノ	尿
耳下腺炎	ムンプス	咽頭ぬぐい液
眼疾患	アデノ、単純ヘルペス、水痘・带状疱疹	結膜ぬぐい液


検体採取および保存方法

検査材料	ウイルス専用容器への採取方法
患部ぬぐい液・水疱内容・糞便 等	※2 滅菌綿棒でぬぐい、下図の採取方法でウイルス専用保存液に採取し、冷蔵保存してください。
尿・髄液・胸水・鼻汁 等	下図の採取方法でウイルス専用保存液と等量の検体を採取し、冷蔵保存してください。
組織	組織小片(5mm角程度)をウイルス専用保存液に入れて冷蔵保存してください。

※1 同定検査は当社の分離検査において分離された検体のみの受付となります。

※2 滅菌綿棒はプラスチック棒かアルミニウム棒付の綿棒で採取してください。

●ウイルス専用保存液は当社にて準備しておりますので、ご依頼前に営業担当員にお申し付けください。



	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
抗原検査	6635 0 (5F150)	アデノウイルスDNA 定性	結膜 ぬぐい液	r	凍結 (3ヵ月)	3~9		PCR (リアルタイム PCR)	陰性	重 他項目との重複依頼は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。
	A083 9 (5F150)		部分尿 0.5	r	凍結 (1ヵ月)					
	A287 3 (5F150)		糞便 500mg	U	凍結 (1ヵ月)					
	8522 3 (5F011)	ヒトパルボウイルス B19DNA定性	血清 0.7	01 ↓ r	凍結 (3ヵ月)	3~5		PCR	陰性	重 他項目との重複依頼は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。

ウイルス感染症検査

抗原検査

ウイルス感染症検査

	項目コード (統一コード)	検 査 項 目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
抗	6838 5 (5F193)	水痘・帯状疱疹 ウイルスDNA定性	患部 ぬぐい液	r	凍結 (3ヵ月)	3~5	PCR	陰性		重 血液：凍結保存は避けてください。 患部ぬぐい液：患部をぬぐった滅菌綿棒を1mLのPBSまたは生理食塩水が入った滅菌ポリスビッツ(r)に入れ、そのまま凍結保存してください。 他項目との重複依頼は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。 & 1
	6836 7 (5F193)		血液 2.0 (EDTA-2Na加)	C	冷蔵 (10日)					
	6837 6 (5F193)		髄液 0.7	r	凍結 (3ヵ月)					
	6824 0 (5F193)	水痘・帯状疱疹 ウイルス抗原	塗抹標本 2枚	W1	凍結	2~4	227 ※6	FA	陰性	塗抹標本の採取方法は163ページをご参照ください。 & 1
原	1419 5 (5F190)	単純ヘルペスウイルス DNA定量	血液 5.0 (EDTA-2Na加)	A	冷蔵 (10日)	2~4	① 450 ※7	PCR (リアルタイムPCR)	2.0×10 ¹ 未満 (コピー/10 ⁶ cells)	重 血液：凍結保存は避けてください。 患部ぬぐい液：患部をぬぐった滅菌綿棒を1mLのPBSまたは生理食塩水が入った滅菌ポリスビッツ(r)に入れ、そのまま凍結保存してください。 他項目との重複依頼は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。 & 1
	6828 6 (5F190)	単純ヘルペスウイルス DNA定性	血液 2.0 (EDTA-2Na加)	C	冷蔵 (10日)	3~5	PCR	陰性		
	6827 7 (5F190)		髄液 0.7	r	凍結 (3ヵ月)					
	6826 8 (5F190)		患部 ぬぐい液	r	凍結 (3ヵ月)					
	6839 4 (5F190)		組織 50mg	r	凍結 (3ヵ月)	3~5				
	6821 3 (5F190)	単純ヘルペスウイルス 特異抗原	塗抹標本 2枚	W1	凍結	2~4	180 ※6	FA	単純ヘルペスウイルス 1型抗原(FA)陰性 単純ヘルペスウイルス 2型抗原(FA)陰性	塗抹標本の採取方法は163ページをご参照ください。 & 1
	検	6060 8 (5F210)	ヒトヘルペスウイルス 6型DNA定性	血液 2.0 (EDTA-2Na加)	C	冷蔵 (10日)	3~9	PCR	陰性	
4996 2 (5F210)		血清 0.7		↓ r	凍結 (3ヵ月)					
K131 5 (5F210)		髄液 0.7		r						
6660 2 (5F210)		患部 ぬぐい液		r	凍結 (3ヵ月)					
6664 8 (5F210)		組織 50mg		r	凍結 (3ヵ月)	3~9				
6646 8 (5F211)		ヒトヘルペスウイルス 7型DNA定性	血液 2.0 (EDTA-2Na加)	C	冷蔵 (10日)	3~9	PCR	陰性		
(5F211)			血清 0.7	↓ r	凍結 (3ヵ月)					
K079 4 (5F211)	髄液 0.7		r							
(5F211)	患部 ぬぐい液		r	凍結 (3ヵ月)						
査	(5F211)		組織 5mg	r	凍結 (3ヵ月)	3~9				& 1

① 免疫不全状態であって、単純疱疹ウイルス感染症又は水痘疱疹ウイルス感染症が強く疑われる患者を対象としてリアルタイムPCR法により測定した場合に、一連として1回のみ算定できる。

A

 EDTA-2Na入り
(真空採血量7mL)
 内容
 EDTA-2Na
 10.5mg
 貯蔵方法 室温
 有効期間 2年

U

 糞便容器
 貯蔵方法 室温

W1

 貯蔵方法 室温
 有効期間 1年

r

 貯蔵方法 室温

C

 EDTA-2Na入り
(真空採血量
2mLまたは5mL)
 内容
 EDTA-2Na
 3.0mgまたは
 7.5mg
 貯蔵方法 室温
 有効期間 2年

	項目コード (統一コード)	検 査 項 目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考	
抗 原 検 査	6830 3 (5F194)	サイトメガロウイルス DNA定性	血液 2.0 (EDTA-2Na加)	C	冷蔵 (10日)	3~5	PCR	陰性		重 血液：凍結保存は避けてください。 患部ぬぐい液：患部をぬぐった滅菌綿棒を1mLのPBSまたは生理食塩水が入った滅菌ポリスπιッツ (r) に入れ、そのまま凍結保存してください。 他項目との重複依頼は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。	
	6832 1 (5F194)		髄液 0.7	r	凍結 (3ヵ月)						3~5
	6657 6 (5F194)		患部ぬぐい液	r	凍結 (3ヵ月)						
	6831 2 (5F194)		部分尿0.7	r	凍結 (3ヵ月)	3~5					
	6658 5 (5F194)		組織 50mg		凍結 (3ヵ月)						
	6745 8 (5F194)	曜日指定 サイトメガロウイルス pp65抗原 (C7-HRP)	血液 3.0 (EDTA-2Na加)	C	室温	2~4	356 ※6	直接酵素抗体法	陰性	受託可能日は月~金曜日です。 血液は採血後、速やかにご提出ください。 採血後24時間以内の血液を使用しない場合、検出率の低下が認められます。 &1	
	9212 6 (5F201)	EBウイルスDNA定量	血液 5.0 (EDTA-2Na加)	A	冷蔵 (28日)	2~4	12 34 5 310 ※7	PCR (リアルタイムPCR)	検出せず (Log IU/mL)	重 凍結保存は避けてください。 他項目との重複依頼は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。 &1	
	7749 3 (5F201)	EBウイルスDNA (クロナリティ)	血液 7.0 (EDTA-2Na加)	A	冷蔵 (10日)	17~23		サザンブロット ハイブリダイゼーション		血液：凍結保存は避けてください。 化学療法などにより細胞数が減少している場合は、必要量のDNAが抽出できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ホルマリンなどにより固定した組織は、高分子DNAが得られないため、サザンブロットハイブリダイゼーションによる解析は不可能です。 本法では、ウイルスDNA数が少ないと、EBV DNAが検出されない場合があります。 &1	
	(5F201)		組織 250mg	r	凍結 (3ヵ月)						

- 臓器移植後の患者については、移植後3月以内の場合は1週に1回、移植後1年以内の場合は1月に1回に限り算定する。ただし、移植後1年以内にEBウイルス核酸定量の測定を行い、核酸量の高値が認められた患者については、移植後1年以上経過した場合も、3月に1回に限り算定できる。
- 造血幹細胞移植後の患者であって、HLA型不一致の移植が行われた患者又は移植に伴い抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者については、抗胸腺細胞グロブリンの投与開始日から起算して2月以内の場合は1週に1回、6月以内の場合は1月に1回に限り算定する。
- 移植後リンパ増殖性疾患を疑う患者に対して、当該患者の診断の補助又は診断された後の経過観察を目的として実施する場合に算定する。ただし、経過観察を目的とする場合は、当該疾患と診断された日から起算して1月以内の場合は1週1回、6月以内の場合は1月に1回に限り算定する。
- 再生不良性貧血の患者であって、抗胸腺細胞グロブリン投与された患者については、抗胸腺細胞グロブリンの投与開始日から起算して2月以内の場合は1週に1回、6月以内の場合は1月に1回に限り算定する。
- 慢性活動性EBウイルス感染症を疑う患者に対して、当該患者の診断の補助又は診断された後の経過観察を目的に実施された場合は、1月に1回に限り算定する。



ウイルス感染症検査

抗原検査

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
A011 8 (5F101)	ヒトパピローマ ウイルスDNA (16型, 18型, その他 ハイリスクグループ)	子宮頸部 3.0	f6	室温	2~4	①② 347 ※6	PCR (リアルタイム PCR)	HPV16型 陰性 HPV18型 陰性 その他ハイリスク グループ 陰性	測定対象は16型, 18型, その他ハイ リスクグループ (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68型 およ び66型)です。「その他のハイリス クグループ」については, 型別の判定 ではありません。 検体に血液が混入しているとデー タに影響を及ぼす場合があります のでご注意ください。 & 1
B245 8	ヒトパピローマ ウイルス(HPV) ジェノタイプ判定	子宮頸部	f6	室温	4~6	③ 2000 ※7	PCR- rSSO法	検出せず	検出可能な型は, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68型 です。本検査は予め, 組織診断 によりCIN1またはCIN2と診断され た患者から採取された検体を専用 容器f6でご提出ください。本検査 方法では, コンタミネーションの 影響がより大きくなりますので, 検体採取にあたっては取扱いに十 分ご注意ください。他項目との重 複依頼は避けてください。 & 1

- ①「HPV核酸検出」を「HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)」と併せて実施した場合は, 主たるもの1つに限り算定する。
 ②予め行われた細胞診の結果がセスタ分類上ASC-US(意義不明異型扁平上皮)と判定された患者又は過去に子宮頸部円錐切除若しくはレーザー照射治療を行った患者に対して行った場合に限り算定する。なお, 細胞診と同時に実施した場合は算定できない。
 ③予め行われた組織診断の結果, CIN1又はCIN2と判定された患者に対し, 治療方針の決定を目的として, ハイリスク型HPVのそれぞれの有無を確認した場合に算定する。

f6



内容
メタノール55%含有
貯蔵方法 室温
有効期間 1年6カ月

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
H T L V - I 検査	A433 0 (5F450)	HTLV-I (ATLV) 抗体	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	159 ※6	CLEIA	陰性	検査結果が「陽性」であった場合、 ラインプロット法による確認検査を お勧めいたします。 測定対象は、 抗 HTLV-I 抗体および抗 HTLV-II 抗体です。型別の報告ではありません。 &I
	A095 6 (5F460)	HTLV-1抗体 5F460-1430-023-833	血清 0.2		冷蔵 (28日)	3~5	425 ※6	ラインプロット法 (LIA法)	陰性 判定基準: 下記参照	測定対象は、抗 HTLV-1 抗体および 抗 HTLV-2 抗体です。型別の報告で はありません。 &1
	6815 0 (5F455)	HTLV-I (ATLV) プロウイルスDNA (クロナリティ)	血液 7.0 (EDTA-2Na加)	A	冷蔵 (10日)	17~23		サザンブロット ハイブリダイ ゼーション		血液: 凍結保存は避けてください。 化学療法などにより細胞数が減少し ている場合は、必要量の DNA が抽 出できない場合がありますので、あ らかじめご了承ください。 ホルマリンなどにより固定した組織 は、高分子 DNA が得られないため、 サザンブロットハイブリダイゼー ションによる解析は不可能です。 &1
	6814 1 (5F455)		組織 250mg	r	凍結 (1ヵ月)					
	A237 2 (5F451)	HTLV-I 核酸検出 定性	血液 7.0 (EDTA-2Na加)	A	冷蔵 (14日)	10~16	① 450 ※7	PCR (リアル タイムPCR)	陰性 (プロウイルスを認 めませんでした)	重凍 血液: 凍結保存は避けてください。 他項目との重複依頼は避けてくだ さい。 化学療法などにより細胞数が減少し ている場合は、必要量の DNA が抽 出できない場合もあります。 本検査方法ではコンタミネーション の影響がより大きくなりますので、 検体採取にあたっては取り扱いに十 分ご注意ください。 &1
	A232 3 (5F454)	HTLV-I プロウイルス DNA 定性	血液 7.0 (EDTA-2Na加)	A	冷蔵 (14日)					
	A233 2 (5F454)		組織 50mg	r	凍結					

①「HTLV-I 核酸検出」は「HTLV-I (ATLV) 抗体(ウエスタンブロット法及びラインプロット法)」によって判定保留となった妊婦、移植者(生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合に限る。)又は臓器等提供者(生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合に限る。)を対象として測定した場合のみ算定できる。

[A095 6] HTLV-1抗体(ラインプロット法)(判定基準)

ラインが認められない		陰性
ラインが1本認められる(≧±)	gag p19かgag p24か env gp46のいずれかが認められる	陰性
ラインが2本認められる(≧±)	env gp21が認められる	保留
ラインが2本認められる(≧±)	env gp21が認められない	保留
ラインが3本以上認められる(≧±)	env gp21が認められる	陽性

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
H I V 検査	8512 4 (5F560)	HIV抗原・抗体	血清 0.6	01 ↓ X	冷蔵 (7日)	3~5	109 ※6	CLEIA	陰性	重不 不活化(非働化)した検体は、判定 に影響を及ぼす場合がありますので 避けてください。
	8538 3 (5F560)	HIV-1/2特異抗体 5F560-1430-023-190	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (7日)	3~5	660 ※6	イムノクロマ ト法	陰性	重 他項目との重複依頼は避けてくだ さい。 確認検査(イムノクロマト法)をご 依頼の際には、改めて採血しご提出 ください。 &1
	8279 1 (5F500)	HIV-1RNA定量	血漿 1.8	P3	冷蔵 (28日)	3~5	520 ※7	RT-PCR (リアルタイム PCR)	検出せず (コピー/mL)	重 他項目との重複依頼は避けてくだ さい。 本検査方法ではコンタミネーション の影響がより大きくなりますので、 検体採取にあたっては取り扱いに十 分ご注意ください。 &1



ウイルス感染症検査

ウイルス抗体検査の特徴

検査方法	原 理	特 徴
補体結合反応 (CF)	抗原抗体複合体と結合した補体感を作血球の不溶血を指標として間接的に証明します。	・ 群特異性が高い ・ 比較的早期に抗体消失 ・ 感染スクリーニング用
赤血球凝集抑制反応 (HI)	赤血球凝集能をもつウイルスの場合、その凝集を抑制する抗体を証明します。	・ 型特異性が高い ・ 早期に抗体が上昇、持続する
蛍光抗体法 (FA)	感染細胞中のウイルス抗原と抗体との反応を蛍光標識抗体で証明します。	・ 抗体分画が可能
中和反応 (NT)	活性ウイルスを抗体により中和させ、感染防御抗体を証明します。	・ 型特異性が高い
酵素免疫法 (EIA)	固相化したウイルス抗原と抗体を反応させ、酵素標識抗体との反応により証明します。	・ 抗体分画が可能 ・ 定量的データ ・ 他法に比して高感度
受身(粒子)凝集反応 (PA)	固相化ゼラチン粒子にウイルスを吸着させ、これに抗体を反応させ、凝集の有無により証明します。	・ 高感度
イムノクロマト法 (IC)	メンブレンフィルター上に固相化されたHIV-1またはHIV-2抗原に、特異的に反応する抗体を検出します。	・ 感度・特異性が高い ・ 確認試験

ウイルス感染症検査

検出抗体の性質

		性 質			
		動 態	抗ウイルス抗体活性	補体結合能	胎盤移行性
抗体	IgM	早期に産生されるが短期間で消失	+	+	-
	IgG	IgMに遅れて出現。漸減しながら長期間持続	+	+	+
	IgA	IgMより多少遅れて出現するがIgMより長期間検出可能	+	-	-


抗体価の解釈とペア血清検査の意義

ウイルス血清抗体価に正常値という概念はありません。ウイルス感染後に産生される抗体の検出は、過去にそのウイルスに感染したことを回顧的に示すだけで、現在の状態を必ずしも反映してはいません。

ウイルス抗体は感染の直後に高く、以後下降するパターンを示しますが、単一の血清の抗体価の高低だけで近い過去に感染があったかどうかの判定は出来ない場合が多いといえます。

ウイルス感染後の抗体応答パターン、各検査法の特徴、検査意義を理解し、目的に応じた検査法を選択する必要があります。

急性期(発病後早期)と回復期(発病後14~21日)のペア血清の抗体価が4倍以上上昇した場合有意と判断しそのウイルスの感染を推定します。ただし、治療にγグロブリンを投与した場合の抗体価の上昇は、必ずしも有意とは考えられません。



目的別検査法選択の目安

検査法の特徴により目的に合った検査の選択が必要です。自然感染では感染初期に反応するIgM抗体の検出やペア血清による抗体上昇をみるのが有用です。

また、既往の有無やワクチンの効果判定にはEIAによるIgG抗体の検査が有用です。

	自然感染	既往の有無	ワクチン効果判定
麻疹	NT, EIA (IgM) (IgG)	NT, EIA (IgG)	NT, EIA (IgG)
風疹	HI, EIA (IgM) (IgG)	HI, EIA (IgG)	HI, EIA (IgG)
ムンプス	CF, HI, NT, EIA (IgM) (IgG)	EIA (IgG)	NT, EIA (IgG)
水痘	CF, EIA (IgM) (IgG)	EIA (IgG)	EIA (IgG)
日本脳炎	HI, CF		HI
インフルエンザ	CF, HI		HI

ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)

同一検体についてウイルス抗体価(定性・半定量・定量)の測定を行った場合は、8項目を限度として算定する。
ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)は、治療上必要な場合に行うものとし、次に掲げるものを当該検査の対象とする。

①アデノウイルス ②コクサッキーウイルス ③サイトメガロウイルス ④EBウイルス ⑤エコーウイルス ⑥ヘルペスウイルス ⑦インフルエンザウイルスA型 ⑧インフルエンザウイルスB型 ⑨ムンプスウイルス ⑩パラインフルエンザウイルスⅠ型 ⑪パラインフルエンザウイルスⅡ型 ⑫パラインフルエンザウイルスⅢ型 ⑬ポリオウイルスⅠ型 ⑭ポリオウイルスⅡ型 ⑮ポリオウイルスⅢ型 ⑯RSウイルス ⑰風疹ウイルス ⑱麻疹ウイルス ⑲日本脳炎ウイルス ⑳オーム病クラミジア ㉑水痘・带状疱疹ウイルス

ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)にあたって、同一検体について同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても、所定点数のみを算定する。

グロブリンクラス別ウイルス抗体価

同一検体について、グロブリンクラス別ウイルス抗体価の測定を行った場合は、2項目を限度として算定する。
グロブリンクラス別ウイルス抗体価は、下記の項目のウイルスのIgG型ウイルス抗体価又はIgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。

ただし、⑦のヒトパルボウイルスB19は、紅斑が出現している妊婦について、このウイルスによる感染症が強く疑われ、IgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。

①ヘルペスウイルス ②風疹ウイルス ③サイトメガロウイルス ④EBウイルス ⑤麻疹ウイルス ⑥ムンプスウイルス ⑦ヒトパルボウイルスB19 ⑧水痘・带状疱疹ウイルス

同一ウイルスについてIgG型ウイルス抗体価及びIgM型ウイルス抗体価を測定した場合にあつては、いずれか一方の点数を算定する。
ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)と併せて測定した場合にあつては、いずれか一方の点数を算定する。

ウイルス抗原検査の特徴

検査方法	原 理	特 徴
酵素免疫法(EIA)	ウイルス抗原と特異抗体を反応させ、酵素反応により検出。特異抗体に直接酵素を標識して検出する直接法と二次抗体に酵素標識する間接法がある。	高感度
蛍光抗体法(FA)	ウイルス抗原と特異抗体を反応させ、蛍光色素により検出。特異抗体に直接蛍光物質を標識して検出する直接法と二次抗体に蛍光物質を標識する間接法がある。	特異性が高い
遺伝子増幅法(PCR)	熱変性1本鎖DNAに目的のプライマー（特異的に増幅させたい領域の各DNA末端と相補的20～30塩基のDNA断片）を結合させ、DNAポリメラーゼによりDNA合成反応を行い、これを繰り返すことにより目的とするDNA配列を指数関数的に増幅。	高感度・特異性が高い
サザンブロット ハイブリダイゼーション	制限酵素で消化した検体DNAをアガロース電気泳動で分画、変性させた1本鎖DNAをメンブランに転写後、標識プローブとハイブリダイゼーションさせ、目的遺伝子を検出。	DNAの量的、質的变化の異常を解析

ウイルス感染症検査

肝炎ウイルス検査

ウイルス感染症検査

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
肝炎ウイルス検査	E661 3 (5F350)	HA抗体	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4	① 146 ※6	CLIA	63ページ参照	不 IgG 型を測定しています。 &I
	E664 0 (5F350)	IgM-HA抗体	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4		CLIA	63ページ参照	&I
	A021 7 (5F016)	HBs抗原(HQ)	血清 0.6	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	88 ※6	CLEIA	0.005未満 (IU/mL)	不重 他項目との重複依頼は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーションの 撮影がより大きくなりますので、 検体採取にあたっては取り扱いに充 分ご注意ください。 溶血および不活性(非働化)した検 体でのご依頼は避けてください。
	A003 7 (5F016)	HBs抗体(CLEIA)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	1~2	88 ※6	CLEIA	10.0未満(-) (mIU/mL)	不 (基準値について) B型肝炎ウイル ス感染防御の最小 HBs 抗体価であ る 10.0mIU/mL を基準に設定して います。
	1416 8 (5F019)	HBe抗原	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	98 ※6	CLEIA	C.O.I 1.0未満	
	1227 8 (5F019)	HBe抗体	血清 0.7	01 ↓ X	冷蔵	2~4	98 ※6	CLEIA	INHIBITION 60未満 (%)	不 &I
	A059 6 (5F018)	HBc抗体(IgG)	血清 各0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4	② 130 ※6	CLEIA	C.O.I 1.0未満	
	1238 6 (5F018)	IgM-HBc抗体	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	② 146 ※6	CLIA	S/CO 1.00未満	不 &I
	K416 9 (5F015)	HBVゲノタイプ	血清 0.6	01 ↓ X	冷蔵	2~4	③ 340 ※6	EIA		HBs 抗原量の少ない検体は、判定保 留となる場合があります。 & 1

①「HA抗体」と「IgM-HA抗体」を同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを算定する。

②HBc抗体半定量・定量とHBc-IgM抗体を同時に測定した場合は、一方の所定点数を算定する。

③B型肝炎の診断が確定した患者に対して、B型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回限り算定できる。

HBs抗原について

【HBV感染の診断】

B型肝炎ウイルス(HBV) 感染の診断は、他の免疫測定法等と同じく、本製品による陽性または陰性の検査結果のみにより行わず、HBc抗体測定、HBV-DNA定量検査等、他の検査結果および臨床経過を考慮して総合的に判断してください。特に下記の場合は使用方法にご留意ください。

1.健康診断時のスクリーニング検査

できるだけ検出感度の高いEIA法／化学発光法などを用いた検出試薬を使用し、イムノクロマト法や凝集法で検出感度の低い検出試薬の使用にあたっては、十分にご留意ください。

2.緊急検査

緊急対応として実施される迅速・簡便な検出試薬において陰性と判定された場合でも、必要に応じてさらに検出感度の高い検出試薬で再検査をすることをお勧めします。

3.B型肝炎と診断された患者の経過観察検査

EIA法／化学発光法、凝集法、イムノクロマト法等いずれの方法を用いた検出試薬でも使用できますが、陰性化した場合はより検出感度の高い方法で確認することをお勧めします。

(注)HBV感染直後はウイルス量が極めて少なく、どのような高感度の検出試薬を用いてもウイルスを確認できません。この時期は「ウインドウ(空白)期間」と呼ばれており、ウインドウ時に採取された血液では、HBs抗原は必ず検出されるとは限りません。

【性能】

(A021)感度0.005IU/mL以上

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
肝炎ウイルス検査	C764 1 (5F020) B型肝炎ウイルス コア関連抗原 (HBcrAg)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~5	①② 246 ※6	CLEIA	2.1未満 (LogU/mL)	&3
	A238 7 (5F015) HBV DNA定量(IU)	血清 1.8	P1	冷蔵 (28日)	3~5	① 256 ※7	PCR (リアルタイム PCR)	検出せず (LogIU/mL)	④ 他項目との重複依頼は避けてください。本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。 &1
	0591 5 (5F360) HCV抗体(第3世代)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	1~2	102 ※6	CLEIA	1.0未満(-) (COI)	⑤ 不活化(非働化)検体は偽陽性を呈する場合がありますので避けてください。 &2
	3435 5 (5F360) HCV群別(グルーピング)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	③ 215 ※6	CLEIA	(グループ)	⑤ 不活化(非働化)検体は、判定に影響を及ぼす場合がありますので避けてください。 &1

- ①「HBcrAg」と「HBV DNA定量」を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
 ②HBV感染の診断の補助及び治療効果の判定の目的で測定した場合に1月に1回に限り算定する。
 ③C型肝炎の診断が確定した患者に対して、C型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。

HCV抗体(第3世代)について



本検査に用いている試薬の添付文書には重要な基本的注意点として、「C型肝炎ウイルス(HCV) 感染の診断は、本製品による検査結果のみで行わず、HCV-RNA測定等、他の検査結果および臨床経過を考慮して総合的に判断すること。」が記載されております。

肝炎ウイルス項目の判定基準

検査項目		陰 性	保 留	陽 性
HA 抗体 [CLIA]	S/CO	1.00未満		1.00以上
IgM-HA 抗体 [CLIA]	S/CO	0.80未満	0.80~1.20	1.21以上

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
HCV検診 5946 6	肝炎ウイルス 検診セット (HBs抗原)	血清 1.0 と 血清 1.8	X と P1	冷蔵 と 凍結	2~10		CLEIA RT-PCR (リアルタイム PCR)		必ず検体を2本ご提出ください。 HCV RNA定性検査は、HCV 抗体 検査が中力価の場合に自動追加し検 査を実施いたします。 下記参照 &1

C型肝炎ウイルス検査の指針(判定フロー)



ウイルス感染症検査

肝炎ウイルス検査

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
6234 5 (5F360)	HCV抗原(コア蛋白質)	血清 0.8	01 ↓ X	冷蔵	2~4	102 ※6	CLIA	3.0未満 (定量下限値) (fmol/L)	&I
E660 4 (5F360)	HCV RNA定量	血清 1.8	P1	冷蔵 (28日)	3~5	① 412 ※7	RT-PCR (リアルタイム PCR)	検出せず (LogIU/mL)	重 他項目との重複依頼は避けてください。 指定の採取量を指定の容器に採取後、 4~5回静かに転倒混和し、室温にて 30~60分間放置してください。 凝固完了を確認後、遠心分離しその まま凍結してご提出ください。 本検査方法ではコンタミネーション の影響がより大きくなりますので、 検体採取にあたっては取り扱いに十 分ご注意ください。 &1
6574 8 (5F360)	HCV RNA コアジェノタイプ	血清 0.5	P1	冷蔵 (14日)	5~7		RT-PCR	検出せず	重 他項目との重複依頼は避けてください。 指定の採取量を指定の容器に採取後、 4~5回静かに転倒混和し、室温にて 30~60分間放置してください。 凝固完了を確認後、遠心分離しその まま凍結してご提出ください。 本検査方法ではコンタミネーション の影響がより大きくなりますので、 検体採取にあたっては取り扱いに十 分ご注意ください。 &1
K568 1 (5F370)	IgA-HEV抗体 (定性)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~5	210 ※6	EIA	陰性	&1

①治療経過の観察の場合において、「HCV核酸検出」及び「HCV核酸定量」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。



	項目コード (統一コード)	検 査 項 目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
感 染 症 抗 体 検 査	A323 2 (5E106)	マイコプラズマ ニューモニエ	速やかに遠心 血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	6～7	32 ※6	CF	4未満 (倍)	下記参照 (*CF) & E
	3363 5 (5E106)		血清 0.2			2～4	PA	40未満 (倍)	下記参照 (*PA) & 1	
	3376 1 (5E128)	ツツガムシ ギリアム	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	3～7	203 ※6	FA	10未満 (倍)	感染の有無はペア血清で判断してください。
	3375 2 (5E129)	IgM								
	3378 9 (5E125)	ツツガムシ カトー	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	3～7	203 ※6	FA	10未満 (倍)	
	3377 0 (5E126)	IgM								
	3380 7 (5E122)	ツツガムシ カーブ	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	3～7	203 ※6	FA	10未満 (倍)	
	3379 8 (5E123)	IgM								
	7653 9 (5E018)	クラミジア	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	2～4	① 200 ※6	EIA	0.90未満 陰性 判定基準：下記参照	& 1
	7655 7 (5E017)	トラコマトリス								
	3373 4 (5E027)	クラミドフィラ (クラミジア)	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵	3～16		FA	10未満 (倍)	下記参照 (*FA) & 1
	3374 3 (5E028)	シッタシ								
A041 5 (5E026)	オーム病クラミドフィラ ((クラミジア)シッタシ)	速やかに遠心 血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	6～7	② 79 ※6	CF	4未満 (倍)	下記参照 (*CF) & E	
A023 5 (5E031)	IgG	血清 各0.2	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2～4	③ 70 ※6	ELISA	30未満 陰性 判定基準：下記参照	& 1	
A024 4 (5E032)	クラミドフィラ (クラミジア) ニューモニエ					③ 75 ※6		8未満 陰性 判定基準：下記参照		
K425 9 (5E033)	IgM					③ 152 ※6		0.5未満 陰性 判定基準：下記参照		

①「IgG抗体価」、「IgA抗体価」及び「IgM抗体価」のうち2項目以上を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

②ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(51ページ)を参照ください。

③「クラミドフィラ・ニューモニエIgM」を「クラミドフィラ・ニューモニエIgG」又は「クラミドフィラ・ニューモニエIgA」と併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

* CF(補体結合反応): 補体結合反応におきましては抗補体作用がみられ、測定不能になる場合がありますので、抗凝固剤を入れずに採血して速やかに血清分離し冷蔵保存してください。

(出発希釈 4倍(髄液の測定も可能です 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍))

* PA: 出発希釈 40倍(髄液の測定も可能です 検体量 0.4mL(冷蔵) 基準値 設定なし 出発希釈 2倍)

* FA: 出発希釈 10倍(髄液の測定も可能です 検体量 各0.4mL(冷蔵) 基準値 1倍未満 出発希釈 1倍)

[7653, 7655] クラミジアトラコマトリスIgG, IgA(判定基準)

Cut off index	判定
0.90未満	(-)
0.90~1.09	(±)*
1.10以上	(+)

* 10日以降に採取した血清による再検査をお勧めいたします。

[A024] クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgA(判定基準)

EIU値	判定
EIU < 8	陰 性(-)
8 ≤ EIU ≤ 12	判定保留(±)*1
EIU > 12	陽 性(+)

* 1: 28日以降に採取した血清による再検査をお勧めいたします。

[A023] クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgG(判定基準)

EIU値	判定
EIU < 30	陰 性(-)
30 ≤ EIU ≤ 45	判定保留(±)*1
EIU > 45	陽 性(+)

* 1: 28日以降に採取した血清による再検査をお勧めいたします。

[K425] クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgM(判定基準)

S/CO値	判定
S/CO < 0.5	陰 性(-)
0.5 ≤ S/CO ≤ 1.1	判定保留(±)*2
S/CO > 1.1	陽 性(+)

* 2: 10日以降に採取した血清による再検査をお勧めいたします。

免疫学的検査

感染症抗原検査

項目コード (統一コード)		検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
感 染 症	K600 4 (68616)	マイコプラズマ ニューモニエDNA	咽頭 ぬぐい液	r	凍結 (21日)	2～4	291 ※7	LAMP	陰性	重 咽頭ぬぐい液は、滅菌綿棒で拭い、 滅菌ポリスピッツ (r) に綿棒を入れて 凍結保存してください。 他項目との重複依頼は避けてくださ い。 本検査法ではコンタミネーションの 影響がより大きくなりますので検体 採取にあたっては取り扱いに十分ご 注意ください。 & 1
	K601 3 (68616)		喀痰 2.0	ℓ						
	A004 6 (68615)	淋菌および クラミジア トラコマチスDNA 同時測定	分泌物	F3	室温 (28日)	2～4	① 262 ※7	PCR (リアルタイム PCR)	陰性	重凍 凍結保存は避けてください。 他項目との重複依頼は避けてくださ い。 本検査方法ではコンタミネーション の影響がより大きくなりますので、 検体採取にあたっては取り扱いに十 分ご注意ください。 分泌物、部分尿：検体に大量の血液 が混入した場合は、正しい結果が得 られないことがあります。 男性の場合、PCR 反応阻害物質の 影響が稀に認められる場合があります ので、尿検体での検査をお勧めいた します。尿検体は最後の排尿から 1時間以上経過後に初尿を採取して ください。 うがい液：検体採取前の食事、うがい、 歯磨きなどは避けてください。 & 1
	A005 5 (68615)		部分尿 5	Y1						
	A006 4 (68615)		うがい液 5							
A009 1 (68615)	咽頭 ぬぐい液		F3							
抗 原	7700 6 (5E021)	クラミジア トラコマチスDNA	分泌物	F3	室温 (28日)	2～4	①② 188 ※7	PCR (リアルタイム PCR)	陰性	重凍 凍結保存は避けてください。 男性の場合、PCR 反応阻害物質の 影響が稀に認められる場合があります ので、尿検体での検査をお勧めいた します。尿検体は最後の排尿から 1時間以上経過後に初尿を採取して ください。他項目との重複依頼は避 けてください。 本検査方法ではコンタミネーション の影響がより大きくなりますので、 検体採取にあたっては取り扱いに十 分ご注意ください。 分泌物、部分尿：検体に大量の血液 が混入した場合は、正しい結果が得 られないことがあります。 うがい液：検体採取前の食事、うがい、 歯磨きなどは避けてください。 & 1
	7644 9 (5E021)		部分尿 5	Y1						
	K589 8 (5E021)		うがい液 5							
検 査	4759 5 (68610)	淋菌DNA	分泌物	F3	室温 (28日)	2～4	①③ 198 ※7	PCR (リアルタイム PCR)	陰性	重 凍結保存は避けてください。 男性の場合、PCR 反応阻害物質の 影響が稀に認められる場合があります ので、尿検体での検査をお勧めいた します。尿検体は最後の排尿から 1時間以上経過後に初尿を採取して ください。他項目との重複依頼は避 けてください。 本検査方法ではコンタミネーション の影響がより大きくなりますので、 検体採取にあたっては取り扱いに十 分ご注意ください。 分泌物、部分尿：検体に大量の血液 が混入した場合は、正しい結果が得 られないことがあります。 うがい液：検体採取前の食事、うがい、 歯磨きなどは避けてください。 & 1
	4719 9 (68610)		部分尿 5	Y1						
	K590 6 (68610)		うがい液 5							

- ①「淋菌およびクラミジアトラコマチスrRNA同時測定」、「淋菌およびクラミジアトラコマチスDNA同時測定」、「淋菌抗原定性」、「クラミジアトラコマチス抗原」、「細菌培養同定検査(淋菌およびクラミジアによる感染を疑って実施するもの)」、「淋菌DNA」、「クラミジアトラコマチスDNA」を併せて実施した場合は主たるもののみ算定する。
- ②「クラミジアトラコマチス核酸検出」、「クラミジアトラコマチス抗原定性」を併用した場合は、主なもののみ算定する。「クラミジアトラコマチス核酸検出」は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検出により実施した場合に限り算定できる。
- ③「淋菌DNA」、「淋菌抗原定性」又は「細菌培養同定検査」(淋菌およびクラミジアによる感染を疑って実施するもの)を併せて実施した場合は、主なもののみ算定する。

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
感染症抗原検査	K602 2 (5E301)	結核菌特異的IFN- γ	血液 5.0	G	室温 (54時間)	3~5	① 593 ※6	ELISPOT	陰性	⚠ 他項目との重複依頼は避けてください。検体は採取後、速やかにご提出ください。 指定の容器に採血し、よく混和させ、室温保存(18~25℃)してください。 & 1
	6853 8 (6B614)	ニューモシスチス・イロベチイ (P.jirovecii) DNA	喀痰 0.7	ℓ	凍結 (3ヵ月)	3~5		PCR	陰性	⚠ 他項目との重複依頼は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。 & 1
	K299 0 (6B614)		肺胞洗浄液 0.7	r						

①「結核菌特異的インターフェロノン γ 産性能」は診察又は画像診断等により結核感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。



免疫学的検査

感染症関連検査

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
4412 9 (5E105)	寒冷凝集反応	速やかに遠心 血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	3~5	11 ※6	HA	256未満 (倍)	採血後、速やかに血清分離してください。 (血清分離までは37℃保存) & 1
0502 3 (5E035)	抗ストレプトリジン-O 抗体(ASO)	血清 0.6	01 ↓ X	冷蔵	2~4	15 ※6	ラテックス 凝集免疫法	239以下 (IU/mL)	& 1
4657 8 (5E068)	便中ヘリコバクター ピロリ抗原	糞便 (専用スティック 1本)	d4	冷蔵	2~4	138 ※6	EIA	陰性	凍 必ず専用容器で採取してご提出ください。 & 1
A310 6 (5E064)	抗ヘリコバクター ピロリ抗体(LA)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	80 ※6	ラテックス 凝集比濁法	10未満 (U/mL)	& 3
K219 8 (5C215)	プロカルシトニン	血清 0.4	01 ↓ X	凍結 (28日)	2~4	① 276 ※4	CLEIA	0.05以下 (ng/mL)	敗血症(細菌性)鑑別診断の カットオフ値: 0.50ng/mL 未満 敗血症(細菌性)重症度判定の カットオフ値: 2.00ng/mL 以上 & I
6449 7 (5E046)	エンドトキシン定量	血液 2.0 (ノボヘパリン加)	T3	冷蔵	2~4	① 229 ※6	比濁時間分析法	1.0以下 (カットオフ値) (pg/mL)	凍 凍結保存は避けてください。 1.0pg/mL は、グラム陰性菌による 敗血症診断のカットオフ値です。 1.1pg/mL 以上は、グラム陰性菌に よる敗血症の疑いがあります。 β-D-グルカン以外との重複依頼は 避けてください。本検査においては、 血漿中のエンドトキシンを測定いた します。血液 2.0mL を専用容器 (T3) にて採血し、よく混和してください。 室温保存ではデータ影響が認められ るため、速やかに冷蔵保存にてご提 出ください。 & 1
3626 3 (5E151)	β-D-グルカン	血液 2.0 (ノボヘパリン加)	T3	冷蔵	2~4	② 190 ※6	発色合成基質法	20.0以下 (カットオフ値) (pg/mL)	凍 凍結保存は避けてください。 (基準値について) 20pg/mL は、深 在性真菌症のカットオフ値です。 エンドトキシン定量以外の項目との 重複依頼は避けてください。本検査 においては、血漿中の (1→3) - β -D-グルカン を測定いたします。血 液 2.0mL を専用容器 (T3) にて採 血し、よく混和させ、速やかに冷蔵 保存にてご提出ください。グルカン 製剤 (抗悪性腫瘍剤)、セルロース膜 で精製した血液製剤などの投与、セ ルロース膜での透析後の血液などは、 データが高値を示す可能性があります。 また、多発性骨髄腫・高γ-グ ロブリン血症では非特異反応を示す 可能性があります。溶血の度合いに よっては検査不能となる場合があり ます。 & 1
K141 4 (5E142)	カンジダマンナン抗原	血清 0.8	01 ↓ X	冷蔵	2~4	② 134 ※6	ELISA	0.05未満 (U/mL)	フィブリン除去時に竹串を使用する と、高値傾向を示す場合があります ので検体の取り扱いに十分ご注意く ださい。 & 1

- ①「プレセプシン定量」と「プロカルシトニン(PCT) 定量」,「プロカルシトニン(PCT) 半定量」又は「エンドトキシン」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- ②「β-D-グルカン」を「カンジダ抗原」,「カンジダマンナン抗原」,「D-アラビニトール」,「アスペルギルス抗原」又は「クリプトコックス・ネオフォルマンズ抗原」と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。



	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
感 染 症 関 連 検 査	3591 2 (5E140)	クリプトコックス・ ネオフォルマンズ抗原	血清 0.8	01 ↓ X	冷蔵	2~4	① 164 ※6	ラテックス 凝集反応	陰性	EDTA (抗凝固剤) は酵素処理に影響を与え、検査不能となる場合がありますので、EDTA の使用は避けてください。 & 1
	K285 5 (5E140)		髄液 0.8	X	冷蔵					
	3679 5 (5E148)	アスペルギルス抗原	血清 1.0	01 ↓ X	冷蔵	2~4	① 157 ※6	ELISA	0.5未満 陰性	フィブリン除去時に竹串を使用すると、高値傾向を示す場合がありますので検体の取り扱いに十分ご注意ください。また、ビペラシリン/タンバクタム合剤の投与で偽陽性となる場合があります。 & 1
	C771 3 (5E146)	アスペルギルス抗体IgG	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	①② 390 ※6	ELISA	5.0未満(AU/mL) 陰性 判定基準: 下記参照	& 1
	K478 1 (5E054)	百日咳抗体IgG	血清 0.2	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	250 ※6	EIA	PT-IgG 10未満 FHA-IgG 10未満 (EU/mL)	& 1
	A254 9 (5E102)	百日咳抗体IgM	血清 0.2	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	80 ※6	ELISA	8.5未満 判定基準: 下記参照	& 1
	A253 0 (5E101)	百日咳抗体IgA	血清 0.2	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	80 ※6	ELISA	8.5未満 判定基準: 下記参照	& 1
	A235 0 (6B636)	百日咳菌DNA	後鼻腔 ぬぐい液	VS4 r	凍結 (21日)	2~4	③ 360 ※7	LAMP	陰性	⚠ 後鼻腔ぬぐい液は、必ずフロックスワブ (VS4) で採取し、滅菌ポリスビッツ (r) にスワブを入れて凍結保存してください。他項目との重複依頼は避けてください。本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。 & 1
	3471 5 (5E156)	トキソプラズマ IgG抗体	血清 各0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4	93 ※6	ELISA	6未満 判定基準: 下記参照	IgM 抗体は長期間陽性が持続する場合がありますので、下記判定基準をご参照ください。 & 1
	3472 4 (5E157)								0.8未満 判定基準: 下記参照	

- ①「(1→3) -β-D-グルカン」を「カンジダ抗原定性」、「カンジダ抗原半定量」、「カンジダ抗原定量」、「アスペルギルス抗原」、「D-アラビニートール」、「クリプトコックス抗原半定量」又は「クリプトコックス抗原定性」、「アスペルギルスIgG抗体」(ただし、慢性進行性肺アスペルギルス症と優襲性肺アスペルギルス症の併存が疑われる患者に対して本検査を実施した場合を除く。)と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- ②「アスペルギルスIgG抗体」は、ELISA法により、慢性進行性肺アスペルギルス症又はアレルギー性気管支肺アスペルギルス症が疑われる患者に対して測定した場合に算定する。なお、本検査は、関連学会の定める指針に従って実施すること。
- ③関連学会が定めるガイドラインの百日咳診断基準における臨床診断例の定義を満たす患者に対して、LAMP法により測定した場合には算定できる。

[C771 3]アスペルギルス抗体IgG(判定基準)

AU/mL	判 定
5.0未満	陰 性
5.0~9.9	判定保留
10以上	陽 性

[3471]トキソプラズマIgG抗体(判定基準)

IU/mL	判 定	解 釈
6未満	陰 性	トキソプラズマの感染は認められません。
6~8	判定保留	低濃度の抗体が認められ、トキソプラズマ感染の疑いがあります。
9以上	陽 性	トキソプラズマ感染が考えられます。

[3472]トキソプラズマIgM抗体(判定基準)

Cut off index	判 定	解 釈
0.8未満	陰 性	最近のトキソプラズマ感染のことが考えられます。
0.8~0.9	判定保留	10~20日後に再検査およびトキソプラズマIgG抗体検査による確認をお勧めします。
1.0以上	陽 性	

[A254, A253]百日咳抗体IgM, IgA(判定基準)

NTU値	判 定
8.5未満	陰 性(-)
8.5~11.5	判定保留(±)※
11.5以上	陽 性(+)

免疫学的検査

感染症関連検査

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
感染症関連検査	MO12 5 (5E074)	梅毒定性	RPR [LA] 血清 各0.5	01 ↓ X	冷蔵	1~2	15 ※6	ラテックス 比濁法	(ー)	溶 乳び検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。 また、溶血検体では高値となる場合がありますので避けてください。
	MO10 7 (5E075)						32 ※6			
	MO13 4 (5E074)	梅毒定量	RPR [LA] 血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	1~2	34 ※6	ラテックス 比濁法	1.0未満 (R.U.)	溶 乳び検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。 また、溶血検体では高値となる場合がありますので避けてください。
	0728 3 (5E075)		TP抗体 [LA] 血清 0.5				53 ※6	ラテックス 比濁法	5未満 (U/mL) 判定基準:下記参照	

梅毒血清反応検査における抗体価の相互関係と結果の解釈

梅毒血清反応検査の結果の解釈

STS (RPR[LA])	TP抗体[LA]またはFTA-ABS	結果の解釈
(ー)	(ー)	非梅毒 まれに梅毒感染初期
(+)	(ー)	生物学的偽陽性(BFP) まれに梅毒感染初期
(+)	(+)	梅毒(早期から晩期) 梅毒治癒後の抗体保有者
(ー)	(+)	梅毒治癒後の抗体保有者 TP抗原系の偽陽性(ごくまれ)

梅毒感染初期が疑われる場合は3～4週間後に再検査する

[0728]梅毒定量 TP抗体[LA](判定基準)

U/mL	判定
5未満	陰 性
5～9	判定保留
10以上	陽 性

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
自己 免疫 関連 検査	M016 1 (56160)	リウマチ因子(RF)定量	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	1~2	① 30 ※6	ラテックス凝集 免疫比濁法	15以下 (IU/mL)	
	E872 9 (56167)	抗シトルリン化 ペプチド(CCP)抗体	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	②③ 193 ※6	CLEIA	4.5未満 (U/mL)	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。 & 1
	3674 0 (56166)	抗ガラクトース欠損 IgG抗体	血清 0.6	01 ↓ X	冷蔵	2~4	①② 4 111 ※6	CLEIA	6.0未満 (AU/mL)	& 1
	3310 3 (56161)	IgG型リウマチ因子	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4	①② 198 ※6	ELISA	2.00未満	& 1
	4646 0 (38503)	MMP-3 (マトリックスメタロプロ ロテイナーゼ-3)	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4	①② 116 ※6	LTIA	M 36.9~121 F 17.3~59.7 (ng/mL)	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。 & 1
	1258 4 (56010)	抗核抗体(ANA)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4	102 ※6	FA	40未満 (倍)	& 1
	3513 8 (58010)	血清補体価	血清 0.5	01 ↓ X	凍結 (-20℃ 以下) (1ヵ月)	2~4	38 ※6	Mayer法 相対比濁法	25.0~48.0 (CH50/mL)	血清分離後、直ちに-20℃以下で保存してください。 & 3
	3505 7 (56020)	抗DNA抗体(RIA)	血清 0.2	01 ↓ X	冷蔵	2~4	159 ※6	RIA硫酸塩析法	6.0以下 (IU/mL)	
	E667 7 (56026)	抗ss-DNA	血清 各0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4		ELISA	25以下 (AU/mL)	
	E668 6 (56028)					2~8			17未満 (U/mL)	
査	E669 5 (56036)	抗ds-DNA	血清 各0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4	159 ※6	ELISA	12以下 (IU/mL)	
	E670 3 (56038)					2~8			6未満 (U/mL)	& 1

- ①「リウマトイド因子(RF)定量」,「抗ガラクトース欠損IgG抗体定性」,「抗ガラクトース欠損IgG抗体定量」,「マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)」,「モノクローナルRF結合免疫複合体」及び「IgG型リウマトイド因子」のうち3項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定する。
- ②「抗シトルリン化ペプチド抗体定性」,「抗シトルリン化ペプチド抗体定量」,「抗ガラクトース欠損IgG抗体定性」,「抗ガラクトース欠損IgG抗体定量」,「マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)」,「モノクローナルRF結合免疫複合体」及び「IgG型リウマトイド因子」のうち2項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの1つに限り算定する。
- ③「抗シトルリン化ペプチド抗体定性」又は「抗シトルリン化ペプチド抗体定量」は、以下のいずれかの場合に算定できる。
(イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(ロ) 関節リウマチと確定診断できない者とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、患者1人につき原則として1回に限り算定する。ただし、当該検査結果は陰性であったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、再度治療薬を選択する必要がある場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
- ④「抗ガラクトース欠損IgG抗体定性」,「抗ガラクトース欠損IgG抗体定量」は、ECLIA法又はレクチン酵素免疫測定法による。なお、「リウマトイド因子(RF)定量」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

[1258]抗核抗体(ANA)の成人健常者における出現率

抗体価	出現率(%)
40倍未満	67~75
40倍	16~22
80倍	7~13
160倍	1~4
320倍	1

* 委託先検討結果(最小・最大値)より

免疫学的検査

自己免疫関連検査

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
4158 2 (5G500)	ループスアンチ コアグラント	速やかに遠心 血漿 各1.0	L ↓ X	凍結 (21日)	2~4	265 ※6	APTT 凝固時間法	46.5以下 (秒)	採血後、速やかに室温で1500G以上15分間遠心後、パフィーコートより5mm以上うえから血漿を採取して凍結保存にてご提出ください。血小板の混入は、測定結果に影響しますのでご注意ください。 ※遠心器回転数の計算式 $G = 1.118 \times 10^{-5} \times r \times n^2$ r: 遠心器のローター半径 (cm) n: 1分間あたりの回転数 (rpm) & 1
A049 7 (5G502)							リン脂質中和法	1.16以下 (秒)	
4167 2 (5G501)							希釈ラッセル 蛇毒時間法	1.3未満	
3142 0 (5G504)	抗カルジオリピン β ₂ グリコプロテイン I 複合体抗体 (抗CL・β ₂ GP I 抗体)	血清 0.3	01 ↓ X	凍結 (1ヵ月)	2~4	① 223 ※6	ELISA	3.5未満 (U/mL)	& 1
B603 0 (5G508)	抗カルジオリピン IgG抗体	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵 (7日)	2~4	①② 226 ※6	ELISA	12.3以下 (U/mL)	
B599 6 (5G510)	抗カルジオリピン IgM抗体	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵 (14日)	2~4	①②③ 226 ※6	ELISA	20.8以下 (U/mL)	
A213 4 (5G066)	抗RNP抗体(CLEIA)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	144 ※6	CLEIA	10.0未満 (U/mL)	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。 & 1
A214 3 (5G065)	抗Sm抗体(CLEIA)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	147 ※6	CLEIA	10.0未満 (U/mL)	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。 & 1
A215 2 (5G076)	抗SS-A/Ro抗体 [CLEIA]	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	161 ※6	CLEIA	10.0未満 (U/mL)	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。 & 1
A216 1 (5G077)	抗SS-B/La抗体 [CLEIA]	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	153 ※6	CLEIA	10.0未満 (U/mL)	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。 & 1
A217 0 (5G085)	抗Scl-70抗体 [CLEIA]	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	157 ※6	CLEIA	10.0未満 (U/mL)	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。 & 1
K034 3 (5G087)	抗RNAポリメラーゼⅢ抗体	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4	166 ※6	ELISA	28未満 判定基準: 下記参照	& 1

- ①「抗CLβ₂GPI抗体」と「抗カルジオリピンIgG抗体」、「抗カルジオリピンIgM抗体」、「抗β₂グリコプロテイン I IgG抗体」又は「抗β₂グリコプロテイン I IgM抗体」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- ②「抗カルジオリピンIgG抗体」、「抗カルジオリピンIgM抗体」、「抗β₂グリコプロテイン I IgG抗体」及び「抗β₂グリコプロテイン I IgM抗体」を併せて実施した場合は、主たるもの3つに限り算定する。
- ③抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として、一連の治療につき2回に限り算定する。

[K034]抗RNAポリメラーゼⅢ抗体(判定基準)

Index	判定
28未満	陰性(-)
28~50未満	(±)
50以上	陽性(+)

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
自己免疫関連検査	A218 9 (56120)	抗Jo-1抗体(CLEIA)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	① 140 ※6	CLEIA	10.0未満 (U/mL)	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。& 1
	A022 6 (56121)	抗ARS抗体	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	① 190 ※6	ELISA	25.0未満 陰性	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。& 1
	6203 9 (56090)	抗セントロメア抗体	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	173 ※6	CLEIA	10.0未満 (U/mL)	& 1
	3539 0 (56175)	抗ミトコンドリア抗体	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4	181 ※6	FA	陰性(20未満) (倍)	& 1
	A008 2 (56176)	抗ミトコンドリア M2抗体	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	189 ※6	CLEIA	7.0未満	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。& 1
	4162 7 (56555)	抗LKM-1抗体	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~5	215 ※6	ELISA	17未満 判定基準:下記参照	
	3537 2 (56180)	抗平滑筋抗体	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4		FA	陰性(40未満) (倍)	& 1
	3541 7 (56185)	抗胃壁細胞抗体	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4		FA	陰性(10未満) (倍)	& 1
	K301 6 (56190)	抗内因子抗体	血清 0.8	01 ↓ X	冷蔵	4~10		CLEIA	(-)	ビタミンB ₁₂ 摂取後1週間以内の検体は偽陽性を呈する可能性がありますので、ご依頼は避けてください。& I
	9201 8 (56245)	ロイシンリッチα ₂ グロ コプロテイン(LRG)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	②③ 276 ※4	ラテックス 凝集免疫法	16.0未満 (カットオフ値) (μg/mL)	& 1
検査	7710 5 (56551)	抗好中球細胞質抗体 (PR3-ANCA)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	250 ※6	CLEIA	3.5未満 (U/mL)	
	4184 3 (56552)	抗好中球細胞質抗体 (MPO-ANCA)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	250 ※6	CLEIA	3.5未満 (U/mL)	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。
	7685 4 (56420)	抗糸球体基底膜抗体 (抗GBM抗体)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	257 ※6	CLEIA	3.0未満 (U/mL)	& 1
	A064 0 (56821)	抗アクアポリン4抗体	血清 0.4	01 ↓ X	凍結 (28日)	2~6	④ 1000 ※6	ELISA	3.0未満 陰性 (U/mL)	& 1

- ①「抗ARS抗体」と「抗Jo-1抗体(オクタロニー法)」又は「抗Jo-1抗体(CLEIA)」を併せて実施した場合は主たるもののみに算定する。
 ②「ロイシンリッチα₂グロコプロテイン」は、潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定した場合に3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
 ③「ロイシンリッチα₂グロコプロテイン」と、「カルプロテクチン(糞便)」又は「大腸内視鏡検査」を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみに算定する。
 ④抗アクアポリン4抗体は、視神経脊髄炎の診断(治療効果判定を除く)を目的として測定した場合に算定できる。なお、検査の結果は陰性であったが臨床症状、検査所見等の変化を踏まえ視神経脊髄炎が強く疑われる患者に対して疾患の診断を行う必要があり、再度実施した場合も算定できる。

[4162]抗LKM-1抗体(判定基準)

Index	判定
17未満	陰性(-)
17~49	判定保留(±)
50以上	陽性(+)



免疫学的検査

自己免疫関連検査

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
6077 0 (5G396)	抗デスモグレイン1抗体	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	① 300 ※6	CLEIA	20.0未満 (U/mL)	
6079 8 (5G397)	抗デスモグレイン3抗体	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	① 270 ※6	CLEIA	20.0未満 (U/mL)	不活性(非動化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。
E884 6 (5G398)	抗BP180抗体 (血清中抗BP180NC16a抗体)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	270 ※6	CLEIA	9.0未満 (U/mL)	& 1
7688 1 (5G395)	抗表皮成分自己抗体 〔直接法〕	皮膚組織 5×5×3mm	u1	凍結	12~14	② 400 + 1200 ※8	蛍光抗体染色法		実施抗原は、「IgG, IgA, IgM, C3」の4抗原です。 & 1
3580 4 (5G520)	抗血小板抗体	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	3~6	261 ※6	MPHA (混合受身凝集法)	陰性	採血後室温で静置し完全に血餅凝固後、血清分離してください。(不活性化しないでください。) 年齢・輸血歴・疾患名を明記してください。 & 1
3315 8 (5G525)	曜日指定 PAIgG (血小板関連IgG)	血液 7.5 (ACD-A液加)	B	冷蔵	2~4	190 ※6	ELISA	46以下 (ng/10 ⁷ cells)	凍結保存は避けてください。 受託可能日は月~金曜日です。 末梢血の血小板が3×10 ¹¹ /μL以下 の場合は、専用容器(B)2本を使用 し必ず10mL以上採血して下さい。 & 1
K593 3 (5G530)	HIT抗体 (血小板第4因子・ヘパ リン複合体抗体)	速やかに遠心 血漿 0.5	K1 ↓ X	凍結	2~4	390 ※6	ラテックス比 濁法	1.0未満 陰性 (U/mL)	血小板第4因子・ヘパリン複合体に 対するHIT抗体(IgG・IgM・IgA) を測定しております。なお、検査結 果はグロブリンクラス別での報告で はありません。 3.2%クエン酸ナトリウム0.2mLに 血液1.8mLの割合で採血し、転倒 混和を5~6回繰り返した後、速や かに血漿分離してください。血漿は 必ず凍結保存してください。 & 1
4497 6 (5G385)	抗アセチルコリン レセプター抗体 (抗AChR抗体)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	3~7	③ 752 ※6	RIA	0.2以下 (nmol/L)	& 1
A148 7 (5G386)	抗筋特異的チロシンキ ナーゼ抗体(抗MuSK 抗体)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	3~9	③ 1000 ※6	RIA	0.02未満 (nmol/L)	& 1
3550 7 (5G440)	精子不動化抗体	血清 0.3	01 ↓ X	凍結 (9ヵ月)	事前にこ 確認くだ さい		不動化法 (Isojima法)	(-) 判定基準: 下記参照	溶血・乳び検体などでは、精子を観 察できず検査できない場合があります のでご注意ください。
K091 0 (5G440)	精子不動化抗体 (SI50)	血清 0.3	01 ↓ X	凍結 (9ヵ月)	事前にこ 確認くだ さい		不動化法 (Isojima法)	1.0未満	& 1

- ①「抗デスモグレイン1抗体」と「抗デスモグレイン3抗体」を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
- ②確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標準作製を実施した場合には、1,200点を所定点数に加算する。「確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者」とは、原発不明癌、原発性脳腫瘍、悪性リンパ腫、悪性中皮腫、肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)、消化管間質腫瘍(GIST)、慢性腎炎、内分泌腫瘍、軟部腫瘍、皮膚の血管炎、水疱症(天疱瘡、類天疱瘡等)悪性黒色腫、筋ジストロフィー又は筋炎が疑われる患者を指す。これらの疾患が疑われる患者であっても3種類以下の抗体で免疫染色を行った場合は、当該加算は算定できない。肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)が疑われる患者に対して加算を算定する場合には、腫瘍が未分化であった場合等HE染色では腺癌または扁平上皮癌の診断が困難な患者に限り算定することとし、その医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、次に掲げるいずれかの項目を既に算定している場合には、当該加算は算定できない。
- ア 肺癌におけるEGFR遺伝子検査、ROS1融合遺伝子検査、ALK融合遺伝子検査、BRAF遺伝子検査(次世代シーケンシングを除く。)及びMETex14遺伝子検査(次世代シーケンシングを除く。)に限る。
- イ 肺癌におけるBRAF遺伝子検査(次世代シーケンシング)、METex14遺伝子検査(次世代シーケンシング)及びRET融合遺伝子検査に限る。
- ウ 肺癌関連遺伝子多項目同時検査
- エ ALK融合遺伝子標準作製
- ③「抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体」と「抗アセチルコリンレセプター抗体」を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

[3550]精子不動化抗体(判定基準)

SIV値	判 定
1.40以下	(-)
1.41~1.99	判定保留
2.00~20.00	(+)
20.01以上	STRONG POSITIVE



抗核抗体(ANA)染色型と主な関連検査および疾患

染色型	主な関連検査	主な関連疾患
Homogeneous型 (均質型)	抗DNA抗体(DNAテスト) ⁴⁾	全身性エリテマトーデス
	抗DNA抗体(RIA)	
	抗ss-DNA IgG抗体	
	抗ss-DNA IgM抗体	
	抗ds-DNA IgG抗体	
	抗ds-DNA IgM抗体	
	抗ヒストン抗体	全身性エリテマトーデス、薬剤性ループス
Peripheral型 ¹⁾ (辺縁型)	抗核抗体(LEテスト) ⁴⁾	全身性エリテマトーデス
	抗DNA抗体(RIA)	全身性エリテマトーデス
	抗ds-DNA IgG抗体	
Speckled型 (斑紋型)	抗ds-DNA IgM抗体	全身性エリテマトーデス
	抗RNP抗体(オクタロニー法) ⁴⁾	
	抗RNP抗体(CLEIA)	混合性結合組織病、強皮症、 全身性エリテマトーデス
	抗Sm抗体(オクタロニー法) ⁴⁾	全身性エリテマトーデス
	抗Sm抗体(CLEIA)	
	抗SS-A/Ro抗体(オクタロニー法) ⁴⁾	シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデス、 関節リウマチ
	抗SS-A/Ro抗体(CLEIA)	
	抗SS-B/La抗体(オクタロニー法) ⁴⁾	シェーグレン症候群
	抗SS-B/La抗体(CLEIA)	
	抗Ki抗体(オクタロニー法) ⁴⁾	全身性エリテマトーデス
Nucleolar型 (核小体型)	抗Ku抗体(オクタロニー法) ⁴⁾	筋炎・強皮症重複症候群
	抗Scl-70抗体(オクタロニー法) ⁴⁾	強皮症
	抗Scl-70抗体(CLEIA) ³⁾	
	抗U3RNP抗体 ⁴⁾	強皮症
	抗7-2RNP抗体 ⁴⁾	
Discrete-Speckled型 (セントロメア型)	抗RNPポリメラーゼⅢ抗体	筋炎・強皮症重複症候群
	抗PM-Scl抗体 ⁴⁾	全身性エリテマトーデス(CNSループス)
	抗リボソームP抗体(ELISA) ⁴⁾	
Cytoplasmic型 ⁵⁾ (細胞質型)	抗セントロメア抗体(CLEIA)	強皮症(CREST症候群)、原発性胆汁性肝硬変
	抗ミトコンドリア抗体(FA)	原発性胆汁性肝硬変
	抗ミトコンドリアM2抗体(CLEIA)	
	抗Jo-1抗体(オクタロニー法) ⁴⁾	多発性筋炎、皮膚筋炎
	抗Jo-1抗体(CLEIA)	
	抗SS-A/Ro抗体(オクタロニー法) ⁴⁾	シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデス、 関節リウマチ
	抗SS-A/Ro抗体(CLEIA)	
PCNA型	抗リボソームP抗体(ELISA) ²⁾	全身性エリテマトーデス(CNSループス)
	抗平滑筋抗体	自己免疫性肝炎
PCNA様型	抗PCNA抗体(オクタロニー法) ⁴⁾	全身性エリテマトーデス
核膜型	抗Na抗体 ⁴⁾ など	全身性エリテマトーデスなど
	抗核膜ラミン抗体 ⁴⁾	原発性胆汁性肝硬変、自己免疫性肝炎など
Granular型	抗gp210抗体 ⁴⁾	
	抗p80 coilin抗体 ⁴⁾	原発性胆汁性肝硬変、シェーグレン症候群など
紡錘体型 ⁵⁾ NuMa-1 NuMa-2	抗sp-100抗体 ⁴⁾	
	抗NuMa-1抗体 ⁴⁾	シェーグレン症候群など 全身性エリテマトーデスなど
中心体型 ⁵⁾	抗NuMa-2抗体 ⁴⁾	
	抗中心体抗体 ⁴⁾	レイノー病、強皮症など
ゴルジ体型 ⁵⁾	抗golgin-97抗体 ⁴⁾ など	シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデス、 関節リウマチなど

1) Homogeneous型との鑑別は難しく、多くのPeripheral型陽性血清は希釈していくとHomogeneous型に変化します。

2) 項目の詳細につきましては営業員へお問い合わせください。

3) 染色型はSpeckled型とHomogeneous型の中間的な染色像であり、またNucleolar型が陽性となることがあります。

4) 未実施項目です。

5) 対応抗原の局在が核ではないため、狭義の抗核抗体には含まれません。

[参考文献]

竹内 健, 他: 医学検査51(9):1256~1264, 2002.

三森 経世: リウマチ32(4):366~378, 1992.

免疫学的検査

免疫血液学的検査

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
M008 0 (5H010)	ABO式血液型	血液 2.0 (EDTA2K加)	C	冷蔵	1~2	39 ※6	マイクロ プレート法 試験管法		凍結保存は避けてください。 年齢・輸血歴・疾患名を明記してください。
M009 9 (5H020)	Rh(D因子)式血液型					39 ※6			
3582 2 (5H025)	Rh-Hr式血液型	血液 2.0 (EDTA-2Na加)	C	冷蔵	2~4	163 ※6	カラム凝集法		凍結保存は避けてください。 年齢・輸血歴・疾患名を明記してください。 &3
0518 6 (5H121)	緊急 直接クームス試験	血液 1.0 (EDTA2K加)	C	室温	1~2	34 ※6	試験管法	(-)	他項目との重複依頼は避けてください。 *) 血液は採血後、速やかにご提出ください。 依頼項目ごとに単独の検体をご提出ください。 年齢・輸血歴・疾患名を明記してください。
0519 5 (5H122)	間接クームス試験	速やかに遠心 血清 2.0	01 ↓ X	冷蔵	2~4	47 ※6	カラム凝集法	陰性	抗凝固剤を入れずに採血してください。 *) 血液は採血後、速やかに分離し、血清をご提出ください。 依頼項目ごとに単独の検体をご提出ください。 年齢・輸血歴・疾患名を明記してください。 &3
2635 4 (5H180)	不規則性抗体 (抗体同定・抗体価測定)	速やかに遠心 血清 5.0 と 血液 2.0 (EDTA-2Na加)	(血清) 01 ↓ X と (血液) C	(血清) 冷蔵 と (血液) 室温	3~5	174 ※6 ①	カラム凝集法 (クームス法、 酵素法 (フィシン法))		*) 血清と血液 (EDTA-2Na 加) をペアでご提出ください。 血清につきましては、血液を採血後、速やかに分離してください。 依頼項目ごとに単独の検体をご提出ください。 年齢・輸血歴・疾患名を明記してください。 &3
3579 6 (5H030)	血液型不適合妊娠	速やかに遠心 血清 4.0 と 血液 2.0 (EDTA-2Na加)	(血清) 01 ↓ X と (血液) C	(血清) 冷蔵 と (血液) 室温	3~5		2-メルカプト エタノール法		*) 血清と血液 (EDTA-2Na 加) をペアでご提出ください。 血清につきましては、血液を採血後、速やかに分離してください。 依頼項目ごとに単独の検体をご提出ください。 年齢・輸血歴・疾患名を明記してください。 &3

①手術に際して輸血が行なわれた場合は、免疫血液学的検査、あるいは、輸血の「注6」に定める不規則抗体検査加算のいずれかを算定する。
*検査結果に影響を及ぼすことがありますので検体(血液や血清)は、採血当日中にご提出ください。
なお、検査時において採血後48時間を越えた検体での検査は、参考値としてご報告させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

[M008, M009] ABO・Rh(D因子)式血液型について

ABO式血液型

生後1歳未満の乳幼児の場合は、抗A、抗B抗体の産生が不十分のため、表試験のみのご報告となります。成長後の再検査をお勧めいたします。

Rh(D因子)式血液型

陰性の場合は、D陰性確認試験を試験管法で実施いたします。

[0519 5] 間接クームス試験, [2635 4] 不規則性抗体 [3579 6] 血液型不適合妊娠(不規則性抗体)について

血漿検体では補体の活性化により検出される抗体を見逃す場合がありますので、血清をご提出ください。

[2635 4] 不規則性抗体について

スクリーニング	クームス法	(-)	(+)	(-)	(+)
	フィシン法	(-)	(-)	(+)	(+)
同定検査					
抗体価測定※					
陰性報告			陽性報告		

1. 不規則性抗体検査は、カラム凝集法にて、クームス法・酵素法(フィシン法)を実施しております。これらの方法は37℃にて加温するため、低温反応性抗体(冷抗体および寒冷凝集素)は検出できない場合があります。
2. 自己対照陽性時の解離同定試験は実施しておりません。

※一部を除き、不規則性抗体が同定された場合に抗体価測定を実施します。

血球を使用する検査について

血球を使用する検査におきましては、凝固促進剤、分離剤入り容器の使用の際、偽陽性または異常反応を示す場合がありますので、必ず指定容器での提出をお願いいたします。

血液2.0mLを指定容器に採血し、よく混和させ、室温保存で速やかにご提出ください。

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
免疫グロブリン	A260 2 (5A136)	免疫電気泳動 〔特異抗血清による同定〕	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	4~6	①② ③ 218 ※6	免疫固定法		特異抗血清の検索は異常蛋白を中心に行いますので、ご了承ください。 年齢、病歴を明記してください。 ※1
	A261 1 (5A145)	尿中免疫電気泳動 〔尿中ベンスジョーンズ蛋白の同定〕	部分尿0.4	Y	冷蔵	4~6	201 ※6	免疫固定法		特異抗血清の検索は異常蛋白を中心に行いますので、ご了承ください。 年齢、病歴を明記してください。 使用する抗血清はIgG・IgA・IgM κλの5つになります。 ※1
	A295 4 (5A141)	免疫グロブリン遊離 L鎖κ/λ比 (フリーライトチェーン)	血清 0.8	01 ↓ X	冷蔵	2~4	388 ※6	ラテックス比濁法	κ型3.3~19.4 (mg/L) λ型5.7~26.3 (mg/L) κ/λ比0.26~1.65	※3
	A259 4 (5A150)	オリゴクローナルバンド	血清 1.0 と 髄液 1.0	01 ↓ X と X	冷蔵	10~14	④ 507 ※1	等電点電気泳動法	検出せず	⚠他項目との重複依頼を避けてください。 ※1
	3311 2 (5A010)	IgG	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4	38 ※6	免疫比濁法	870~1700 (mg/dL)	※3
	A065 9 (5A050)	IgGサブクラス分画 (TIA)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~6		免疫比濁法およびラテックス免疫比濁法	IgG1 351~962 IgG2 239~838 IgG3 8.5~140 IgG4 4.5~117 (mg/dL)	※3
	3312 1 (5A015)	IgA	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4	38 ※6	免疫比濁法	110~410 (mg/dL)	
	3313 0 (5A020)	IgM	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4	38 ※6	免疫比濁法	M 33~190 F 46~260 (mg/dL)	※3
補体	3336 5 (5A160)	クリオグロブリン定性	血清 1.0	01 ↓ X	冷蔵	4~6	42 ※6	寒冷沈澱法	陰性	採血時より血清分離までの間は37℃の状態で行い、血清分離後は冷蔵保存してください。 必ず血清でご依頼ください。 ※1
	3513 8 (5B010)	血清補体価	血清 0.5	01 ↓ X	凍結 (-20℃以下 (1ヵ月))	2~4	38 ※6	Mayer法 相対比濁法	25.0~48.0 (CH50/mL)	血清分離後、直ちに-20℃以下で保存してください。 ※3
	3324 8 (5B040)	C1q	血清 0.4	01 ↓ X	凍結	2~14		ネフェロメトリー	8.8~15.3 (mg/dL)	※3
	4123 0 (5B045)	C1インアクチベーター活性 (C1エステラーゼ インヒビター活性)	速やかに遠心 血漿 0.2	K1 ↓ X	凍結 (16日)	2~4	253 ※6	発色性合成 基質法	70~130 (%)	凝固検体取り扱いについては、P169 をご参照ください。 3.2%クエン酸ナトリウム0.2mLに 血液1.8mLの割合で採血し、転倒 混和を5~6回繰り返した後、速や かに血漿分離してください。血漿は 必ず凍結保存してください。 ※1
	3325 7 (5B023)	C3	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4	70 ※6	免疫比濁法	86~160 (mg/dL)	
体	3326 6 (5B024)	C4	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4	70 ※6	免疫比濁法	17~45 (mg/dL)	※3

- ①「免疫グロブリンL鎖κ/λ比」と「抗ヒト全血清による同定」又は「特異抗血清による同定」を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
 ②「抗ヒト全血清による同定」及び「特異抗血清による同定」については、同一検体につき一回に限り算定する。
 ③「抗ヒト全血清による同定」及び「特異抗血清による同定」を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
 ④多発性硬化症の診断目的で行った場合に算定する。

[A295]免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比(フリーライトチェーン)検査結果について(試薬メーカー資料より引用)

- 本測定結果は、補助診断としてご利用ください。
- 診断・治療を決定する場合、また、臨床経過と測定値が一致しない場合は、病歴や他の検査所見も参考にして、総合的判断で行ってください。
- 遊離L鎖の増加のため、抗原過剰により、予想外に低い測定値を示すこともあります。
- 遊離L鎖の構造変化により、前回測定値と結果が大きく乖離する場合があります。



免疫学的検査

血漿蛋白

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
0014 5 (3A015)	アルブミン(Alb)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	1~2	① 11 ※4	BCP改良法	3.8~5.2 (g/dL)	
L113 4 (3A015)	尿中アルブミン	蓄尿 1	X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	② 99 ※1	免疫比濁法	2~20 (mg/day)	酸
L114 3 (3A015)	尿中アルブミン (クレアチニン換算値)	部分尿 2	X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2		免疫比濁法	尿中アルブミン換算値 10.0以下 (mg/g・CRE)	酸
3335 6 (5C010)	プレアルブミン	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	101 ※6	免疫比濁法	22.0~40.0 (mg/dL)	
3745 1 (5C030)	レチノール結合蛋白 (RBP)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	129 ※6	ラテックス 凝集比濁法	M 2.7~6.0 F 1.9~4.6 (mg/dL)	
3319 4 (5C015)	α ₁ -ミクログロブリン	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	129 ※6	ラテックス 凝集免疫法	M 12.5~25.5 F 11.0~19.0 (mg/L)	
4608 2 (5C015)		部分尿 0.5	X			129 ※6		M 1.0~15.5 F 0.5~9.5 (mg/L)	&3
3317 6 (5C020)	α ₁ アンチトリプシン	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~5	80 ※3	ネフェロメトリー	94~150 (mg/dL)	
3318 5 (5C025)	α ₁ アシドグリコプロテイン	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4		ネフェロメトリー	M 45~98 F 39~86 (mg/dL)	
3320 2 (5C035)	α ₂ -マクログロブリン	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~5	138 ※3	ネフェロメトリー	M 100~200 F 130~250 (mg/dL)	
A682 4 (5C040)	ハプトグロビン	血清 0.6	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	129 ※6	ITA	1-1型 83~209 2-1型 66~218 2-2型 25~176 (mg/dL)	
3321 1 (5C045)	セルロプラスミン	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4	90 ※6	ネフェロメトリー	21~37 (mg/dL)	&3
M018 9 (5C095)	フェリチン	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	1~2	102 ※4	CLEIA	M 39.4~340.0 F 3.6~114.0 (ng/mL)	鉄欠乏性貧血および貧血のない鉄欠乏の診断基準は12ng/mL未満です [鉄剤の適正使用による貧血治療指針 (日本鉄バリオサイエンス学会)]
3322 0 (5C060)	トランスフェリン	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	60 ※6	免疫比濁法	M 190~300 F 200~340 (mg/dL)	&3
4609 1 (5C060)	尿中トランスフェリン	蓄尿 0.5	X	冷蔵 (1ヵ月)	2~4	② 98 ※1	ラテックス 凝集比濁法	0.80以下 (mg/day)	酸凍
4606 4 (5C060)	尿中トランスフェリン (クレアチニン換算値)	部分尿 1	X	冷蔵 (1ヵ月)	2~4		ラテックス 凝集比濁法	尿中トランスフェリン 換算値 1.00以下 (mg/g・CRE)	凍結保存は避けてください。 採尿後、速やかにご提出ください。 &3

①「蛋白分画」、「総蛋白」及び「アルブミン」を併せて測定した場合は、主たるもの2つの所定点数を算定する。

②「尿中アルブミン」、「尿中トランスフェリン」及び「尿中IV型コラーゲン」は、糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る。)に対して行った場合に3か月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるもののみ算定する。

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
血漿	M017 0 (50065)	β ₂ -ミクログロブリン	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4	98 ※6	ラテックス凝集免疫法	1.0~1.9 (mg/L)	& 1
	4730 6 (50065)		蓄尿 1	X	冷蔵	2~4	98 ※6	ラテックス凝集免疫法	230以下 (μg/L)	尿は pH5.5~7.5にし、必要量をご提出ください。 & 3
	4551 5 (50065)		部分尿 1							
	0112 6 (30016)	シスタチンC	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	109 ※4	金コロイド凝集法	M 0.63~0.95 F 0.56~0.87 (mg/L)	推算GFRcys (項目コードNo.K5915)を同時に依頼いただきますと推算GFRcys値をご報告いたします。 (下記参照) & 3
	B052 2 (50070)	C反応性蛋白(CRP)定量	血清 0.6	01 ↓ X	冷蔵	1~2	16 ※6	ラテックス凝集比濁法	0.140以下 (mg/dL)	
	B517 6 (50080)	血清アミロイドA蛋白(SAA)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	47 ※6	ラテックス凝集免疫法	3.0以下 (mg/dL)	
	3649 8 (50091)	ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	131 ※4	ラテックス凝集法	6.2未満 (ng/mL)	& 3
	B836 2 (50090)	ミオグロビン	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	131 ※4	CLEIA	男性 15.8~105.9 女性 10.5~70.0 (ng/mL)	& I
	B801 0 (50090)	尿中ミオグロビン [CLEIA] 5C090-0000-001-052	部分尿 6	Y5	冷蔵 (22日)	2~4	131 ※4	CLEIA	2.0未満 (ng/mL)	凍尿後、速やかに専用容器に入れ、冷蔵してください。凍結は避けてください。採取した尿を速やかに専用容器のラベルに印刷してある線まで入れ、よく混和させ冷蔵保存にてご提出ください。 & I
	3173 6 (50092)	心室筋ミオシン軽鎖 I	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~6	184 ※4	EIA	2.5以下 (ng/mL)	& 1
蛋白	9532 1 (50093)	心筋トロポニンT	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (14日)	2~4	109 ※4	ECLIA	0.014以下 急性心筋梗塞診断のカットオフ値 0.100 (ng/mL)	& I
	A234 1 (50130)	プロコラーゲンⅢペプチド(P-Ⅲ-P) [CLIA]	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	136 ※4	CLIA	3.62~9.52 (ng/mL)	凍カットオフ値 (肝に線維化のみられる疾患) 6.95ng/mL & 3
	6785 4 (50134)	Ⅳ型コラーゲン	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4	131 ※4	ラテックス凝集比濁法	150以下 (ng/mL)	& 3
	9246 9 (50135)	Ⅳ型コラーゲン・7S [CLEIA]	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (23日)	2~4	148 ※4	CLEIA	4.4以下 (ng/mL)	& I
	4582 1 (50134)	尿中Ⅳ型コラーゲン	部分尿 5	Y7	冷蔵 (1ヵ月)	3~9	179 ※1	EIA	30~39歳 4.0以下 40歳以上 4.9以下 (μg/g・CRE)	凍結保存は避けてください。早朝一番尿をご提出ください。凍結保存および他項目との重複依頼は避けてください。なお、随時尿による参考基準値 (健康人) は7.3μg/g・CRE以下と報告されています。 & 1

- ①「尿素窒素(BUN)」又は「クレアチニン」により腎機能低下が疑われた場合に、3月に1回に限り算定できる。「シスタチンC」、「ペントシジン」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- ②「SAA」、「CRP定性」、「CRP定量」と併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
- ③「H-FABP」と「ミオグロビン」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- ④同一の患者につき同一日に当該検査を2回以上行った場合は、1回のみ算定する。
- ⑤「心筋トロポニンI」と「心筋トロポニンT」を同一月に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
- ⑥「サイトケラチン18フラグメント(CK-18F)」と「P-Ⅲ-P」、「Ⅳ型コラーゲン」、「Ⅳ型コラーゲン・7S」、「ヒアルロン酸」、「Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体」又は「オートタキシン」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- ⑦「Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体」と「P-Ⅲ-P」、「Ⅳ型コラーゲン」、「Ⅳ型コラーゲン・7S」又は「ヒアルロン酸」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- ⑧「Ⅳ型コラーゲン」又は「Ⅳ型コラーゲン・7S(CLEIA)」は、「P-Ⅲ-P」又は「Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体」と併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
- ⑨「尿中トランスフェリン」、「尿中アルブミン」及び「尿中Ⅳ型コラーゲン」は、糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る。)に対して行った場合に3月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるもののみ算定する。

推算GFRcysについて

日本人のGFRcys推算式

$$\text{男性: 推算GFRcys値(mL/min/1.73m}^2\text{)} = (104 \times \text{Cys-C}^{-1.019} \times 0.996^{\text{Age}}) - 8$$

$$\text{女性: 推算GFRcys値(mL/min/1.73m}^2\text{)} = (104 \times \text{Cys-C}^{-1.019} \times 0.996^{\text{Age}} \times 0.929) - 8$$

報告条件

- ①シスタチンC(項目コードNo.0112)と同時依頼された場合のみ、ご報告いたします。
- ②下記に該当する場合は、ご報告できません。
- ・「シスタチンC」あるいは「推算GFRcys」のいずれか1項目のみご依頼された場合。
 - ・年齢及び性別が依頼書に記載されていない場合。
 - ・年齢が18歳未満の場合。
- ※正式な単位は「mL/min/1.73m²」ですが、報告単位は「mL/min」と略して報告させていただきます。



免疫学的検査

血漿蛋白

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
血漿蛋白	3067 4 (5C210)	KL-6	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	① 108 ※4	CLEIA	500未満 (U/mL)	&I
	A671 6 (3F253)	肺サーファクタント プロテインD (SP-D) 3F253-0000-023-062	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	① 136 ※4	ラテックス 免疫凝集法	110未満 (ng/mL)	& 1
	3343 7 (3F250)	肺サーファクタント プロテインA (SP-A)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	4~6	① 130 ※4	CLEIA	43.8未満 (ng/mL)	&I
	4716 2 (5C123)	I 型コラーゲン架橋 N-テロペプチド (NTx)	部分尿 3	X	冷蔵	2~4	②③ 153 ※5 (腫2)	CLEIA	下記参照	午前中の第二尿をご提出ください。 血尿での提出は避けてください。
	4742 3 (5C146)	デオキシピリジノリン	部分尿 3	X	冷蔵	2~4	②③ 191 ※5 (腫2)	EIA	クレアチニン換算値 M 2.1~5.4 F 2.8~7.6 (nmol/mmol・CRE)	
	8768 1 (5C124)	I 型コラーゲンC末端 テロペプチド (ICTP)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4	(腫2)	RIA2抗体法	4.5未満 (ng/mL)	& 1
	B857 0 (5C141)	Mac-2結合蛋白糖鎖修 飾異性体 (M2BPGi) 定量	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	⑤ 194 ※4	CLEIA	0.84未満 (AU/mL)	& 1
	C963 0 (5D326)	サイトケラチン18フラ グメント (CK-18F)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵 (5日)	3~9	④⑤ 194 ※6	EIA	260未満 (カットオフ値) (U/L)	非アルコール性脂肪肝炎 (NASH) の診断補助のためのカットオフ値は 260U/L です。 & 1

(腫2): 悪性腫瘍特異物質治療管理料 (35ページ参照)

- ①「KL-6」, 「SP-A」, 「SP-D」のうちいずれが複数を実施した場合は、主たるもののみ算定する。
 ②「NTx」, 「オステオカルシン」, 「尿中DPD」, 「TRACP-5b」を併せて実施した場合は、いずれか1つのみ算定する。
 ③骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また薬剤治療方針を変更した時は変更後6月以内に1回に限り算定できる。
 ④「サイトケラチン18フラグメント (CK-18F)」は、1ステップのサンドイッチ法を用いた酵素免疫測定法により、非アルコール性脂肪肝疾患の患者 (疑われる患者を含む) に対して、非アルコール性脂肪性肝炎の診断補助を目的に実施した場合は、「オートタキシン」を準用して算定する。
 ⑤「サイトケラチン18フラグメント (CK-18F)」と「プロコラーゲン-Ⅲペプチド (P-Ⅲ-P)」, 「Ⅳ型コラーゲン」, 「Ⅳ型コラーゲン・7S」, 「ヒアルロン酸」, 「Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体」又は「オートタキシン」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

[4716] I 型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx) 基準値, 判定基準

(単位: nmolBCE/mmol・CRE)

基準値 (参考値)	男 性	13.0~66.2
	閉経前女性	9.3~54.3
	閉経後女性	14.3~89.0
判定基準	骨吸収亢進の指標	55以上
	副甲状腺摘出術の適応	200以上
	悪性腫瘍 (乳癌, 肺癌, 前立腺癌) の骨転移の指標	100以上

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
アレルギー検査	7001 2 (5A090)	IgE(非特異的IgE)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~3	100 ※6	FEIA	173以下 (IU/mL)	& 1
	7003 0 (5A100)	アトピー鑑別試験 (12種吸入性アレルギー)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4	194 ※6	FEIA	陰性	対象アレルギーは72ページをご参照ください。 & 1
	A050 5 (5A100)	特異的IgE (MAST36アレルギー)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	3~5	1430 ※6	CLEIA	MASTクラス 0 1.39以下 (LC)	判定基準、アレルギー一覧表は72 ページをご参照ください。 & 1
	A294 5 (5A100)	特異的IgE (Viewアレルギー39)	血清 1.0	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	1430 ※6	FEIA	MASTクラス 0 0.27未満 (Index)	判定基準、アレルギー一覧表は72 ページをご参照ください。 検査結果をクラスと Index 値で表示 する半定量検査です。 & 1
		特異的IgE (マルチアレルギー)	血清 各0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4	各 110 ※6	FEIA	クラス 0 0.35未満 (U _A /mL)	判定基準、アレルギー一覧表は72, 73ページをご参照ください。 & I
		特異的IgE (シングルアレルギー)	1アレルギー 血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵		1アレ ルゲン 110 ※6			
	E287 9 (5J228)	TARC (Th2ケモカイン)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵	2~4	① 179 ※6	CLEIA	6か月以上~12か月未満:1367未満 1歳以上~2歳未満:998未満 2歳以上~16歳未満:743未満 16歳以上:450未満 (pg/mL)	血漿はデータ低下が見られますので 避けてください。 トロンビン入り採血管は測定値に影 響を与える恐れがあるため使用を避 けてください。 & 1

①アトピー性皮膚炎の重症度評価の補助として測定する場合は、月1回を限度として算定できる。

アレルギー検査

アレルギー検査

[7003]アトピー鑑別試験(12種吸入性アレルギー)

混合アレルギーの内容(個々のアレルギーのご報告はありません)
ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ、ネコのフケ、イヌのフケ、ギョウギシバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、シラカンバ(属)、スギ、カンジダ、アルテルナリア

[A050]特異的IgE(MAST36アレルギー)

含まれるアレルギー
コナヒョウヒダニ、ハウスダスト1、ネコ皮膚、イヌ皮膚、オオアワガエリ、カモガヤ、ブタクサ混合物1、ヨモギ、スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ、カンジダ、アルテルナリア、アスペルギルス、ラテックス、トマト、モモ、キウイ、バナナ、ゴマ、ソバ、小麦、ピーナッツ、大豆、米、マクロ、サケ、エビ、カニ、ミルク、豚肉、牛肉、鶏肉、オボムコイド、卵白
厚生労働省により、食品の原材料表記を定められた特定原材料7品目(エビ、カニ、卵、小麦、そば、落花生、乳)全てが含まれております。

特異的IgE(MAST36アレルギー)(判定基準)

MASTクラス	ルミカウント(LC)	判 定
0	0~1.39	陰 性
1	1.40~2.77	疑陽性
2	2.78~13.4	陽 性
3	13.5~58.0	
4	58.1~119	
5	120~159	
6	160~200	

[A294]特異的IgE(Viewアレルギー39)

含まれるアレルギー
ヤケヒョウヒダニ、ネコ皮膚、イヌ皮膚、卵白*、ミルク*、小麦*、米、ゴマ*、ソバ*、ピーナッツ*、大豆*、カニ*、エビ*、豚肉*、牛肉*、マクロ、サケ*、リンゴ*、サバ*、鶏肉*、キウイ*、バナナ*、オボムコイド*、カモガヤ、オオアワガエリ、ハウスダスト1、ゴキブリ、ガ、ラテックス、アスペルギルス、カンジダ、アルテルナリア、マラセチア(属)、ハンノキ(属)、シラカンバ(属)、スギ、ヒノキ、ブタクサ、ヨモギ
*:食品表示義務のある「特定原材料」に関するアレルギー *:表示を推奨されている「特定原材料に準ずるもの」に関するアレルギー

特異的IgE(Viewアレルギー39)(判定基準)

クラス	Index値	判 定
0	0.27未満	陰 性
1	0.27~0.50未満	疑陽性
2	0.50~1.80未満	陽 性
3	1.80~7.05未満	
4	7.05~17.35未満	
5	17.35~29.31未満	
6	29.31以上	

特異的IgE(マルチアレルギー)

項目コード	分 野	混合アレルギーの内容(個々のアレルギーのご報告はありません)
7461 2	イネ科 5A100-2821-023-023	ハルガヤ、ギョウギシバ、カモガヤ、オオアワガエリ、アシ
7463 0	雑草 5A100-2822-023-023	ブタクサ、ヨモギ、フランスギク、タンポポ(属)、アキノキリンソウ
7465 8	食物 5A100-2823-023-023	卵白、牛乳、小麦、ピーナッツ、大豆
7467 6	穀物 5A100-2824-023-023	小麦、トウモロコシ、米、ゴマ、ソバ
7469 4	動物上皮 5A100-2825-023-023	ネコのフケ、イヌのフケ、モルモット上皮、ラット、マウス
7471 1	カビ 5A100-2826-023-023	ペニシリウム、クラドスポリウム、アスペルギルス、カンジダ、アルテルナリア、ヘルミントスポリウム

(判定基準) 特異的IgE(シングルアレルギー, マルチアレルギー)(U_A/mL) FEIA法

クラス	特異的IgE抗体価(U _A /mL)	判 定
0	0.35未満	陰 性
1	0.35~0.70未満	陽 性
2	0.70~3.50未満	
3	3.50~17.5未満	
4	17.5~50.0未満	
5	50.0~100未満	
6	100以上	

特異的IgE(シングルアレルゲン)FEIA法

実施料:1アレルゲンにつき110点算定できます。ただし、1回につき1430点を限度とします。判断料区分:※6

項目コード	名称
イ ネ 科 植 物 花 粉	
7011 1	ハルガヤ
7013 9	ギョウギシバ
7015 7	カモガヤ
7017 5	ヒロハウシノケグサ
7019 3	ホソムギ
7021 0	オオアワガエリ
7023 8	アシ
7025 6	ナガハグサ
7027 4	コヌカグサ (属)
7031 9	セイパンモロコシ
7035 5	スズメノヒエ (属)
7041 8	小麦 (花粉)
7043 6	オオスズメノテッポウ
雑 草 花 粉	
7061 6	ブタクサ
7063 4	ブタクサモドキ
7065 2	オオブタクサ
7069 8	ニガヨモギ
7071 5	ヨモギ
7073 3	フランスギク
7075 1	タンポポ (属)
7077 9	ヘラオオバコ
7079 7	シロザ
7083 2	アキノキリンソウ
7089 6	イラクサ (属)
7095 9	ヒメスイバ
8861 7	カナムグラ
樹 木 花 粉	
7111 0	カエデ (属)
7113 8	ハンノキ (属)
7115 6	シラカンバ (属)
7119 2	ブナ (属)
7121 9	ビャクシン (属)
7123 7	コナラ (属)
7125 5	ニレ (属)
7127 3	オリーブ
7129 1	クルミ (属)
7133 6	ヤナギ (属)
7135 4	スギ
7151 6	ヒノキ
7143 5	アカシア (属)
7147 1	クワ (属)
7149 9	マツ (属)
真 菌	
7171 4	ペニシリウム
7173 2	クラドスポリウム
7175 0	アスペルギルス

項目コード	名称
B483 4	Asp f 1(アスペルギルス由来)
7177 8	ムコール
7179 6	アルテルナリア
7181 3	カンジダ
7183 1	ヘルミントスポリウム
K371 9	マラセチア (属)
7239 9	トリコフィトン
動 物 表 皮	
7201 0	ネコのフケ
7205 6	ウマのフケ
7207 4	ウシのフケ
7209 2	イヌのフケ
7211 9	モルモット上皮
7215 5	ガチョウ羽毛
7217 3	セキセイインコのフン
7219 1	セキセイインコ羽毛
8837 4	ヤギ上皮
7221 8	羊上皮
7223 6	家兎上皮
7225 4	豚上皮
7227 2	ハムスター上皮
7229 0	ニワトリ羽毛
7231 7	アヒル羽毛
7233 5	ラット
7235 3	マウス
寄 生 虫	
7251 5	回虫
7255 1	アニサキス
昆 虫	
7261 4	ミツバチ
7263 2	スズメバチ
7265 0	アシナガバチ
7267 8	ゴキブリ
7273 1	ユスリカ (成虫)
7273 1	ユスリカ (成虫)
7269 6	ヤブカ (属)
7237 1	ガ
ダ ニ	
7281 2	ヤケヒョウヒダニ (ダニ1)
7283 0	コナヒョウヒダニ (ダニ2)
7285 8	アシフトコナダニ
7287 6	サヤアシニクダニ
7289 4	ケナガコナダニ
室 内 塵	
7301 9	ハウスダスト1
7303 7	ハウスダスト2
食 餌 性 ア レ ル ゲ ン	
7311 8	牛乳

項目コード	名称
7313 6	卵白
7315 4	タラ
7317 2	ピーナッツ
7319 0	アーモンド
K375 5	カシューナッツ
A272 9	Ana o 3 (カシューナッツ由来)
7321 7	ハシバミ
7323 5	大豆
A054 1	Gly m 4 (大豆由来)
7325 3	カニ
7327 1	エビ
7329 9	小麦
K373 7	ω-5 グリアジン
7331 6	ライ麦
7333 4	大麦
7335 2	オート麦
7337 0	トウモロコシ
7339 8	エンドウ
7341 5	ブラジルナッツ
7343 3	米
7345 1	トマト
7347 9	ニンジン
7349 7	オレンジ
7351 4	マグロ
7353 2	豚肉
7355 0	ジャガイモ
7357 8	ココナッツ
7359 6	ムラサキイガイ
7361 3	イチゴ
7363 1	サケ
7365 9	ゴマ
7367 7	ソバ
7369 5	ニンニク
7371 2	タマネギ
7373 0	牛肉
7375 8	ビール酵母
7377 6	リンゴ
7379 4	卵黄
7381 1	α-ラクトアルブミン
7383 9	β-ラクトグロブリン
7385 7	カゼイン
7387 5	ロブスター
7389 3	チーズ
7391 0	鶏肉
7393 8	キウイ
7395 6	セロリ
7397 4	パセリ
7399 2	メロン
7401 8	羊肉

項目コード	名称
7403 6	マスタード
7405 4	インゲン
8853 6	タケノコ
7433 3	サツマイモ
7435 1	キビ
7437 9	アワ
8855 4	イカ
8857 2	タコ
8845 5	サバ
7407 2	アジ
8859 0	イワシ
7452 2	グルテン
8863 5	モールドチーズ
8849 1	麦芽
8803 1	マンゴ
7450 4	バナナ
7448 7	カカオ
7441 4	洋ナシ
7487 4	モモ
8865 3	アボカド
0956 0	ヤマイモ
8867 1	グレープフルーツ
7489 2	ハウレンソウ
7456 8	カボチャ
7275 9	オボムコイド
0958 8	クルミ
A271 0	Jug r 1 (クルミ由来)
0997 5	スイカ
7454 0	カレイ
6534 2	イクラ
6536 0	タラコ
6484 8	ホタテ
6486 6	アサリ
6488 4	カキ (貝)
職 業 性 ア レ ル ゲ ン	
7497 3	オオバコ種子
7491 9	イソシアネート TDI
7477 5	イソシアネート MDI
7473 9	イソシアネート HDI
7495 5	無水フタル酸
7185 9	ホルマリン
7475 7	ラテックス
A055 0	Hev b 6.02 (ラテックス由来)
そ の 他	
7529 7	ヒトインシュリン
7309 1	ゼラチン
7305 5	黄色ブドウ球菌エンテロトキシン A
7307 3	黄色ブドウ球菌エンテロトキシン B

アレルゲンは一時的に入手不可能なものがありますので、あらかじめご了承ください。

生化学的検査

蛋白・膠質反応

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
蛋白・ 膠質 反応	0013 6 (3A010)	総蛋白(TP)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	① 11 ※4	Biuret法	6.7~8.3 (g/dL)	
	M014 3 (1C010)		髄液 0.5	X	冷蔵	2~4	① 11 ※4	ピロガロール レッド法	10.0~40.0 (mg/dL)	
	L138 7 (1A015)		蓄尿 1	X	冷蔵	1~2	7 ※1		31.2~120.0 (mg/day)	
	0014 5 (3A015)	アルブミン(Alb)	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	1~2	① 11 ※4	BCP改良法	3.8~5.2 (g/dL)	
	L113 4 (3A015)	尿中アルブミン	蓄尿 1	X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	② 99 ※1	免疫比濁法	2~20 (mg/day)	
	L114 3 (3A015)	尿中アルブミン (クレアチニン換算値)	部分尿 2	X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2		免疫比濁法	尿中アルブミン換算値 10.0以下 (mg/g・CRE)	酸
	0040 6 (3A016)	A/G比	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2		BCP改良法/ Biuret法	1.1~2.1	
	A051 4 (3A020)	蛋白分画	血清 0.3	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	2~4	① 18 ※4	キャピラリー 電気泳動法	ALB 55.8~66.1(%) α1-G 2.9~4.9(%) α2-G 7.1~11.8(%) β1-G 4.7~7.2(%) β2-G 3.2~6.5(%) γ-G 11.1~18.8(%) A/G 1.3~1.9(%)	溶 溶血でのご依頼は避けてください。

- ①「蛋白分画」、「総蛋白」及び「アルブミン」を併せて測定した場合は、主たるもの2つの所定点数を算定する。
 ②「尿中トランスフェリン」、「尿中アルブミン」及び「尿中IV型コラーゲン」は、糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る。)に対して行った場合に、3月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるものののみ算定する。

& 1

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
酵 素 関 連 物 質	3681 2 (38180)	リパーゼ	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	24 ※4	合成基質 比色法	13~55 (U/L)	&3
	4681 1 (38180)		部分尿 0.5	X	冷蔵				(U/L)	
	0010 9 (38160)	緊急 アミラーゼ(AMY)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	1~2	11 ※4	JSCC標準化 対比法	44~132 (U/L)	
	0110 8 (38160)		部分尿 5	X	冷蔵 (21日)	1~2			65~700 (U/L)	
	3274 4 (38165)	アミラーゼ アイソザイム	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (7日)	2~4	48 ※4	アガロース 電気泳動法	TOTAL-S 36.0~84.3 TOTAL-P 15.7~64.0 (%)	&1
	4591 1 (38165)		部分尿 0.5	X	冷蔵				TOTAL-S 17.7~61.3 TOTAL-P 38.7~82.3 (%)	
	A346 7 (38175)	P型アミラーゼ定量	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (14日)	2~4	48 ※4	JSCC 標準化対応法	16~52 (U/L)	&3
	B049 6 (38185)	トリプシン	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	189 ※4	ラテックス 凝集比濁法	210~570 (ng/mL)	&3
	3788 4 (38192)	膵ホスホリパーゼA ₂ (膵PLA ₂)	冷却遠心 血清 0.3	01 ↓ X	凍結 (21日)	2~5	204 ※4	RIA固相法	130~400 (ng/dL)	&1 採血後、よく混和させ、低温(4℃) で血漿分離してください。血漿は必 ず凍結保存してください。
	4067 3 (38192)		冷却遠心 血漿 0.3	C ↓ X	凍結					
	3037 7 (38195)	エラスターゼ1	血清 0.5	01 ↓ X	凍結	2~4	120 ※5 腫2	ラテックス 免疫比濁法	300以下 (ng/dL)	&3
	3683 0 (38255)	リゾチーム	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2~4		比濁法	5.0~10.2 (μg/mL)	&1
	4682 0 (38255)		部分尿 0.4	X	冷蔵				0.1未満 (μg/mL)	

(腫2):悪性腫瘍特異物質治療管理料(35ページ参照)



生化学的検査

酵素関連物質


	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
酵 素 関 連 物 質	0018 1 (3B010)	CK(CPK)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (10日)	1~2	11 ※4	JSCC 標準化対応法	M 62~287 F 45~163 (U/L)	
	3684 9 (3B015)	CK-MB(CPK-MB)	血清 各0.5	01 ↓ X	冷蔵 (6日)	2~4		免疫阻止-UV法	MB 25以下 TOTAL M 62~287 F 45~163 (U/L)	& 1
	A672 5 (3B015)				冷蔵 (14日)		90 ※4	CLEIA	男性:5.7以下 女性:3.1以下 (ng/mL)	& 3
	3686 7 (3B100)	アルドラーゼ	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	11 ※4	UV-酵素法	2.1~6.1 (U/L)	溶 & 1
	0021 7 (3B035)	緊急 AST(GOT)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (14日)	1~2	17 ※4	JSCC 標準化対応法	10~40 (U/L)	溶 溶血でのご依頼は避けてください。
	0022 6 (3B045)	緊急 ALT(GPT)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (14日)	1~2	17 ※4	JSCC 標準化対応法	5~40 (U/L)	
	L774 1 (3B050)	緊急 LD(LDH) (IFCC)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (3日)	1~2	11 ※4	IFCC 標準化対応法	124~222 (U/L)	溶 溶血でのご依頼は避けてください。
	3261 8 (3B055)	LD(LDH) アイソザイム	血清 0.5	01 ↓ X	室温	2~4	48 ※4	アガロース 電気泳動法	LDH1 21~31 LDH2 28~35 LDH3 21~26 LDH4 7~14 LDH5 5~13 (%)	溶 溶血でのご依頼は避けてください。 (溶血の場合LDH1, 2, 3の上昇が 考えられます。) LDH5が多く含まれる検体では、 IFCC法に基づく分画値と乖離する 場合があります。 & 1
	L773 2 (3B070)	アルカリフォスファターゼ (ALP) (IFCC)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	11 ※4	IFCC 標準化対応法	38~113 (U/L)	
	3345 5 (3B072)	骨型アルカリ フォスファターゼ(BAP)	血清 0.8	01 ↓ X	冷蔵	2~4	157 ※5	CLEIA	男性 3.7~20.9 閉経前女性 2.9~14.5 閉経後女性 3.8~22.6 (μg/L)	& I
質	3267 2 (3B080)	ALPアイソザイム (IFCC)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	48 ※4	アガロース 電気泳動法	ALP1 0.0~5.3 ALP2 36.6~69.2 ALP3 25.2~54.2 ALP5 0.0~18.1 (%)	血液型 B または O 型で Lewis 分泌 型の人では、ALP 総活性値および ALP5 の出現率が高くなることがあ ります。 & 1
	0019 0 (3B135)	ロイシンアミノペプチターゼ (LAP)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	11 ※4	酵素法 (L-ロイシル- Pニトロアリド基質)	35~73 (U/L)	

①「骨型アルカリフォスファターゼ(BAP)」,「インタクト I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド(Intact P I NP)」,「I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド(P I NP)」
及び「ALP・アイソザイム(PAG電気泳動法)」のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるものに算定する。

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
酵 素 関 連 物 質	0020 8 (38090)	γ-GT(γ-GTP)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	11 ※4	JSCC 標準化対応法	M 70以下 F 30以下 (U/L)	基準値には飲酒群が含まれておりま す。
	M003 5 (38110)	コリンエステラーゼ (ChE)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	11 ※4	JSCC 標準化対応法	M 242~495 F 200~459 (U/L)	
	3698 4 (38325)	アンギオテンシン I 転換酵素(ACE)	血清 0.7	01 ↓ X	冷蔵	2~4	136 ※4	笠原法	8.3~21.4 (U/L)	EDTA 血漿は測定不能となります。 &3
	4683 9 (38330)	N-アセチル グルコサミニダーゼ (NAG)	部分尿 0.5	X	冷蔵	2~4	41 ※1	比色法	0.7~11.2 (IU/L)	
	3700 0 (38125)	グアナーゼ	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	35 ※4	酵素法	1.0以下 (U/L)	&3
	3702 8 (38130)	アデノシンデアミナーゼ (ADA)	血清 0.6	01 ↓ X	冷蔵	2~4	32 ※4	酵素法	5.0~20.0 (U/L)	&3
	6762 9 (38339)	ペプシノゲン	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4		CLEIA	下記参照	&I
	5506 4 (38347)	胃がんリスク層別化 検査(ABC分類) [LA] 3B347-0000-023-920	血清 各1.0	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	ラテックス 凝集比濁法 CLEIA	下記参照		<ピロリ菌の除菌治療前> ペプシノゲンとヘリコバクターピロ リ抗体を実施し、それぞれの検査結 果とABC分類をご報告いたします。 &I
	5507 3 (38347)	胃がんリスク層別化 検査(ABC分類) 除菌あり[LA] 3B347-0000-023-920								<ピロリ菌の除菌治療後> ピロリ菌の除菌治療を受けた方は、 ABC分類の判定対象にはなりません。 除菌判定結果に関わらず、E群(除 菌群)としてご報告いたします。 &I

[6762]ペプシノゲン(判定基準)

		ペプシノゲン1	ペプシノゲン1/2比
強陽性	3+	30ng/mL以下	かつ 2.0以下
中程度陽性	2+	50ng/mL以下	かつ 3.0以下
陽性	1+	70ng/mL以下	かつ 3.0以下
陰性	—	上記条件以外	



胃がんリスク層別化検査(ABC分類)[LA](判定基準)

ABC分類		ヘリコバクターピロリ抗体	
		10U/mL未満 (-)	10U/mL以上 (+)
ペプシノゲン	(-)	A群	B群
	(+)	D群	C群
ピロリ菌除菌後		E群	

胃がんリスク層別化検査(ABC分類)の注意事項

- 以下の場合には、正しい結果が得られない可能性があります。
1. 明らかな上部消化器症状のある方
 2. 上部消化管疾患で治療中の方
 3. プロトンポンプ阻害剤服用中の方
 4. 胃切除をされた方
 5. 腎不全の方
 6. ピロリ菌の除菌治療を受けた方

A群	おおむね健康的な胃粘膜で、胃の病気になる危険性は低いと考えられます。逆流性食道炎などピロリ菌に関連しない病気に注意しましょう。未感染の可能性が高いですが、一部にはピロリ菌の感染や感染の既往がある方が含まれます。一度は内視鏡検査などの画像検査を受けることが理想的です。
B群	少し弱った胃粘膜です。胃潰瘍・十二指腸潰瘍などに注意しましょう。胃がんのリスクもあります。内視鏡検査を受けましょう。ピロリ菌の除菌治療をお勧めします。
C群	萎縮の進んだ胃粘膜と考えられます。胃がんになりやすいタイプと考えられます。定期的な内視鏡検査をお勧めします。ピロリ菌の除菌治療をお勧めします。
D群	萎縮が非常に進んだ胃粘膜と考えられます。胃がんなどの病気になるリスクがあります。ピロリ菌感染診断をお勧めします。かならず専門医療機関で内視鏡検査などの診断を受けてご相談ください。
E群	ピロリ菌の除菌治療を受けた方は、除菌判定の結果に関わらず、E群(除菌群)として定期的な内視鏡検査を受けましょう。E群は除菌により胃がんになるリスクは低くなりますが、決してゼロになるわけではありませんので、除菌後も内視鏡検査による経過観察が必要です。

低分子窒素化合物

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
低分子窒素化合物	0399 9 (3C040)	アンモニア	速やかに遠心 除蛋白液 3.0	r4 ↓ X	凍結	1~2	50 ※4	藤井・奥田法 変法	30~80 (μg/dL)	採血後、直ちに正確に血液1.0mLを専用容器(r4)に加え、十分攪拌後3000rpm5分間遠心分離し、その上清液をご提出ください。
	0004 6 (3C025)	緊急 尿素窒素(UN)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	1~2	11 ※4	ウレアーゼ LED・UV法 (回避)	8.0~22.0 (mg/dL)	
	L117 0 (3C025)		蓄尿 0.5	X	冷蔵		11 ※4		6.5~13.0 (g/day)	
	M001 7 (3C015)	クレアチニン	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	11 ※4	酵素法	M 0.61~1.04 F 0.47~0.79 (mg/dL)	推 参 GFRcreat (項目コード No. K833 6) を同時に依頼いただきますと推参 GFRcreat 値をご報告いたします。(下記参照)
	L115 2 (3C015)		蓄尿 0.5	X	冷蔵		11 ※4		M 0.70~2.20 F 0.40~1.50 (g/day)	
	0027 1 (3C020)	尿酸(UA)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	1~2	11 ※4	酵素法 (ウリカーゼ POD法)	M 3.7~7.0 F 2.5~7.0 (mg/dL)	重 蓄尿：凍結保存は避けてください。 高尿酸血症：7.0mg/dL 超（高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン（日本痛風・核酸代謝学会）2002年） 蓄尿は依頼項目ごとに単独の検体をご提出ください。
	L116 1 (3C020)		蓄尿 0.5	X	冷蔵		11 ※4		0.4~1.2 (g/day)	
	A042 4 (5C100)	L型脂肪酸結合蛋白 (L-FABP)	部分尿 2.0	X	冷蔵 (14日)	2~4	210 ※1	CLEIA	L-FABPクレアチニン 換算値8.4以下 (μg/gCr)	酸凍 凍結保存は避けてください。 酸性蓄尿は検査値に影響を及ぼす場合がありますので、避けてください。 室温保存ではデータ影響が認められるため、速やかに冷蔵保存にてご提出ください。 &I

①「イヌリン」と「クレアチニン(腎クリアランス測定のために行い、血清及び尿を同時に測定する場合に限る。)」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
②「L型脂肪酸結合蛋白」は、原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要性からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
③「L-FABP(尿)」と「NGAL(尿)」を併せて実施した場合は、主たるもののみに算定する。

推算GFRcreatについて

日本人の GFR 推算式
男性：推算 GFRcreat 値 (mL/min/1.73m²) = 194 × Cr^{-1.094} × Age^{-0.287}
女性：推算 GFRcreat 値 (mL/min/1.73m²) = 194 × Cr^{-1.094} × Age^{-0.287} × 0.739

報告条件
①クレアチニン（項目コード No.M001 7）と同時依頼された場合のみ、ご報告いたします。
②下記に該当する場合は、ご報告できません。
・「クレアチニン」あるいは「推算 GFRcreat」のいずれか1項目のみご依頼された場合。
・年齢及び性別が依頼書に記載されていない場合。
・年齢が18歳未満の場合。
※正式な単位は「mL/min/1.73m²」ですが、報告単位は「mL/min」と略して報告させていただきます。

r4

除蛋白液入り
(内容量4mL)
内容
タングステン酸Na,
硫酸
貯蔵方法 冷蔵
有効期間 1年



C

EDTA-2Na入り
(真空採血器
2mLまたは5mL)
内容
EDTA-2Na
3.0mgまたは
7.5mg
貯蔵方法 室温
有効期間 2年



	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
低分子窒素化合物	K347 6 (3C045)	アミノ酸分析(39種類) [LC/MS]	速やかに冷却 血漿 0.5	C ↓ X	凍結 (21日)	4~6	1074 ※5	LC/MS	下記参照	採血後、速やかによく混和させ、低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。& 1
	4693 8 (3C045)	アミノ酸分析(41種類)	酸性蓄尿 2	X	凍結 (21日)	7~10	1074 ※5	HPLC	下記参照	6N 塩酸約20mLを入れた蓄尿瓶へ24時間蓄尿し、よく混和後必要量を必ず凍結保存して提出ください。尿量が少ない場合には尿100mLに対して6N 塩酸1mLの割合で入れてください。必ず酸性蓄尿に(pH1.0~3.0)してください。& 1
	K348 5 (3C046)	アミノ酸分析(9種類) [LC/MS]	速やかに冷却 血漿 0.5	C ↓ X	凍結 (21日)	4~6	1074 ※5	LC/MS	下記参照	採血後、速やかによく混和させ、低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。& 1
	K349 4 (3C046)	アミノ酸分析2種類 (チロシン・フェニルアラニン) [LC/MS]	速やかに冷却 血漿 0.5	C ↓ X	凍結 (21日)	4~6	279 + 279 ※5	LC/MS	チロシン 40.4~90.3 (nmol/mL) フェニルアラニン 42.6~75.7 (nmol/mL) フィッシャー比 2.43~4.40	採血後、速やかによく混和させ、低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。& 1
	0165 8 (3C047)	総分岐鎖アミノ酸/ チロシンモル比 (BTR) 3C047-0000-023-271	血清 0.5	01 ↓ X	凍結	2~4	283 ※5	酵素法	BCAA/TYR RATIO 4.41~10.05 BCAA 344~713 (μmol/L) TYR 51~98 (μmol/L)	溶血血でのご依頼は避けてください。& 3

アミノ酸分析(39種類(血漿), 41種類(尿), 9種類(血漿))基準値

アミノ酸名	略 号	基準値	
		血 漿	尿
Taurine	Tau	39.5~93.2	322.2~5214.5
Phosphoethanolamine★	PEA		31.0~110.0
Urea	★ Urea		◎130.3~493.2
Aspartic acid	Asp	2.4以下	12.7以下
Hydroxyproline	Hypro	21.6以下	ND
Threonine	Thr	66.5~188.9	79.9~528.3
Serine	Ser	72.4~164.5	208.8~1020.0
Asparagine	Asn	44.7~96.8	60.7~372.3
Glutamic acid	Glu	12.6~62.5	11.3~42.7
Glutamine	Gln	422.1~703.8	207.0~1357.3
Sarcosine	Sarco	TR	99.0以下
α-Aminoadipic acid	α-AAA	ND	16.7~118.6
Proline	Pro	77.8~272.7	ND
Glycine	Gly	151.0~351.0	652.1~3670.6
Alanine	Ala	208.7~522.7	141.2~833.9
Citrulline	Cit	17.1~42.6	13.5~55.6
α-Aminobutyric acid	α-ABA	7.9~26.6	27.1以下
※Valine	Val	147.8~307.0	24.8~82.2
Cystine	Cys	13.7~28.3	23.7~170.9
Cystathionine	Cysthio	TR	TR~44.7
※Methionine	Met	18.9~40.5	TR~20.2
※Isoleucine	Ileu	43.0~112.8	7.5~23.5
※Leucine	Leu	76.6~171.3	24.6~89.3
※Tyrosine	Tyr	40.4~90.3	50.6~308.4
※Phenylalanine	Phe	42.6~75.7	27.2~110.2

※印はアミノ酸分析(9種類)の実施アミノ酸名
ND: 測定感度以下 TR: 痕跡
★印は「アミノ酸」ではありませんが、本項目に含めて測定いたします。

単位 血漿: nmol/mL, 尿: μmol/day (ただし○印(Urea)はmmol/day)

アミノ酸名	略 号	基準値	
		血 漿	尿
γ-Amino β-hydroxy butyric acid	γ-A β-HBA	ND	ND
β-Alanine	β-Ala	TR	TR~153.0
β-Amino-iso-butyric acid	β-AIBA	TR	TR~1623.9
γ-Aminobutyric acid	γ-ABA	ND	ND
Monoethanolamine★	MEA	10.4以下	195.3~606.2
Homocystine	Homocys	ND	ND
※Histidine	His	59.0~92.0	436.4~2786.5
3-Methylhistidine	3-Me His	5.0以下	113.4~480.9
1-Methylhistidine	1-Me His	18.5以下	59.3~2816.2
Carnosine	★ Carno	ND	87.6以下
Anserine	★ Ans	ND	231.4以下
Tryptophan	Trp	37.0~74.9	20.7~150.7
Hydroxylysine	Hylys	ND	22.9以下
Ornithine	Orni	31.3~104.7	6.9~43.9
※Lysine	Lys	108.7~242.2	51.6~1639.6
※Arginine	Arg	53.6~133.6	11.6~54.8
Total AA(総アミノ酸: 非必須アミノ酸の和+必須アミノ酸の和)		2068.2~3510.3	
NEAA(非必須アミノ酸の和)		1381.6~2879.4	
EAA(必須アミノ酸の和)		660.0~1222.3	
BCAA(分岐鎖アミノ酸の和)		265.8~579.1	
EAA/NEAA(必須アミノ酸の和/非必須アミノ酸の和)		0.40~0.63	
BCAA/Total AA(分岐鎖アミノ酸の和/総アミノ酸)		0.11~0.18	
フィッシャー比		2.43~4.40	

EAA/NEAA, BCAA/Total AA, フィッシャー比においては単位なし

生化学的検査

低分子窒素化合物／糖質関連物質

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
低分子窒素化合物	9047 0 (3C070)	血中総ホモシステイン	速やかに遠心 血漿 0.3	C ↓ X	冷蔵 (21日)	3～5	279 ※5	LC/HS/MS	M 7.0～17.8 F 5.3～15.2 (nmol/mL)	採血後、速やかに血漿分離してください。 指定容器に採血後、よく混和させ、 直ちに血漿分離してください。 血漿は冷蔵保存してください。 &1
	4694 7 (3C055)	ハイドロキシプロリン-総	蓄尿 1	X	冷蔵 (28日)	4～17	279 ※5	HPLC	83～330 (μmol/day)	&1
糖質関連物質	0300 7 (3D010)	緊急 グルコース	血漿 0.5	E ↓ X	冷蔵 (21日)	1～2	11 ※4	ヘキソチ ナーゼUV法	70～109 (mg/dL)	
	0547 4 (3D046)	ヘモグロビンA1c (HbA1c) (NGSP)	血液 2.0	E	冷蔵 (7日)	1～2	① 49 ※3	酵素法	4.6～6.2 (%)	凍結保存は避けてください。 データの影響を及ぼす場合がありますので、 必ず専用容器Eに採血し、 ご提出ください。
	3342 8 (3D055)	グリコアルブミン	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2～4	① 55 ※4	酵素法	12.4～16.3 (%)	溶 &3
	L686 9 (3D055)		血漿 0.5	E ↓ X						
	3874 8 (3D085)	1,5-アンヒドロ-D- グルシトール(1,5AG)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	2～4	① 80 ※4	酵素法	M 14.9～44.7 F 12.4～28.8 (μg/mL)	溶 &3
	3617 3 (3D080)	ヒアルロン酸	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵	2～4	②③ 179 ※4	ラテックス 凝集免疫比濁法	50以下 (ng/mL)	
	3627 2 (3D080)		胸水 0.4	X					(ng/mL)	
	4948 5 (3D105)	シアル酸	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	2～5		酵素法	44～71 (mg/dL)	

- ①「HbA1c」、「グリコアルブミン」又は「1,5AG」のうちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定する。ただし、妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与を開始して6月以内の患者、インスリン治療を開始して6月以内の患者等については、いずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。また、クロザピンを投与中の患者については、「HbA1c」を月1回に限り算定できる。
- ②「オートタキシン」と「P-Ⅲ-P」、「Ⅳ型コラーゲン」、「Ⅳ型コラーゲン・7S」、「ヒアルロン酸」、「Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- ③「Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体」と「P-Ⅲ-P」、「Ⅳ型コラーゲン」、「Ⅳ型コラーゲン・7S」又は「ヒアルロン酸」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
7706 0 (3E010)	乳酸	速やかに遠心 除蛋白液 0.4	r3 ↓ X	冷蔵	2~4	47 ※4	乳酸オキシ ダーゼによる 酵素法	3.0~17.0 (全血中) (mg/dL)	採血後、直ちに正確に血液 1.0mL を専用容器 (r3) に加え、十分攪拌 後3000rpm5分間遠心分離し、そ の上清液をご提出ください。 &3
7707 9 (3E015)	ピルビン酸	速やかに遠心 除蛋白液 0.4	r3 ↓ X	冷蔵	2~4	47 ※4	ピルビン酸 オキシダーゼ による酵素法	0.30~0.94 (全血中) (mg/dL)	
4641 5 (3E025)	尿中シュウ酸	酸性蓄尿 3	X	冷蔵 (21日)	3~9	200 ※1	キャピラリー 電気泳動法	M 10.3~41.5 F 9.0~37.7 (mg/day)	凍結保存は避けてください。 6N 塩酸10mLを入れた蓄尿ビンへ 24時間蓄尿し、よく混和後必要量を ご提出ください。 なお、尿量があらかじめ少ないと予 想される場合には、尿200mLに対 して6N 塩酸1mLの割合で添加して ください。酸性蓄尿されていない場 合は、シュウ酸カルシウムが析出す る可能性がありますので、必ず酸性 蓄尿 (pH1.0~2.0) してください。 &1
3774 9 (3E045)	血中ケトン体分画	速やかに冷却 血清 0.5 (静脈血)	01 ↓ X	凍結 (7日)	2~4	59 ※4	酵素法	アセト酢酸 55以下 3-ヒドロキシ酪酸 85以下 総ケトン体 130以下 (μmol/L)	早朝空腹時採血 (静脈) してください。 採血後は速やかに冷却遠心にて分離 し、凍結保存してください。 &3
3778 5 (3E045)		速やかに冷却 血清 0.5 (動脈血)						ケトン体比 アセト酢酸/ 3-ヒドロキシ酪酸比 0.7以上	ブドウ糖投与下または食後 (血糖 120mg/dL 以上) に動脈採血して ください。酸性蓄尿されていない場 合は、シュウ酸カルシウムが析出す る可能性がありますので、必ず酸性 蓄尿 (pH1.0~2.0) してください。 &3
3605 6 (3E060)	アセトン定量	血清 0.7	02 ↓ X	凍結 (15日)	7~10		Gas- chromatograph法	5未満 (μg/mL)	分離剤入り容器は使用しないでくだ さい。 &M
K153 1 (3E060)	尿中アセトン定量	部分尿 1.2	X	凍結					&M
8248 8 (3E105)	有機酸 スクリーニング検査	部分尿 5	X	凍結	7~14	1141 ※5	Gas- chromatograph法 (GC-MS)		酸性蓄尿は避けてください。専用依 頼書に臨床所見を必ずご記入くだ さい。本検査は疑われる先天性有機酸 代謝異常症を専門医が判定する検査 です。判定医による判定に時間を要 する場合は所要日数より遅れる場合 があります。 &1

①「ケトン体」及び「ケトン体分画」の検査を併せて実施した場合は、「ケトン体分画」の所定点数のみ算定する。

C EDTA-2Na入り (真空採血量 2mLまたは5mL) 内容 EDTA-2Na 3.0mgまたは 7.5mg 貯蔵方法 室温 有効期間 2年	G ヘパリン入り (真空採血量5mL) 内容 ヘパリンNa 65IU 貯蔵方法 室温 有効期間 2年	E フッ化Na入り (真空採血量2mL) 内容 フッ化Na 2.5mg ヘパリンNa 25uspu EDTA-2Na 7.4mg 貯蔵方法 室温 有効期間 2年	r3 除蛋白液入り (内容量1mL) 内容 0.8N 過塩素酸 貯蔵方法 冷蔵 有効期間 1年
---	--	--	--

生化学的検査

脂質関連物質

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
脂 質 関 連 物 質	0001 9 (3F015)	中性脂肪(TG)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	11 ※4	酵素法 (GK-GPO・ 遊離グリセロール 消去)	50~149 (mg/dL)	
	0422 2 (3F025)	リン脂質	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	15 ※4	酵素法	160~260 (mg/dL)	& 1
	0003 7 (3F050)	総コレステロール (T-Cho)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	17 ※4	コレステロール 酸化酵素 (COD・ POD)法, 酵素法	150~219 (mg/dL)	
	0426 8 (3F055)	エステル型 コレステロール(Echo)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4		コレステロール 酸化酵素 (COD・ POD)法, 酵素法	90~200 (mg/dL)	
	0421 3 (3F065)	遊離コレステロール (F-Cho)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	11 ※4	酵素法	30~60 (mg/dL)	
	0427 7 (3F055)	コレステロール エステル比	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4		コレステロール 酸化酵素 (COD・ POD)法, 酵素法	73~77 (%)	& 3
	MO06 2 (3F070)	HDL-コレステロール	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	17 ※4	直接法	M 40~86 F 40~96 (mg/dL)	
	MO05 3 (3F077)	LDL-コレステロール	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	18 ※4	直接法	70~139 (mg/dL)	
質	3230 2 (3F075)	HDL _{2,3} コレステロール	血清 1.0	01 ↓ X	冷蔵 (20日)	2~6		超遠心法	HDL2 コレステロール M 16.0~61.0 F 23.0~73.0 HDL3 コレステロール M 13.0~25.0 F 13.0~24.0 (mg/dL)	凍結保存は避けてください。 & 1
	3341 9 (3F078)	レムナント様リポ蛋白 コレステロール(RLP-C)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	174 ※4	酵素法	7.5以下 (mg/dL)	凍結保存は避けてください。 糖尿病, 冠動脈疾患などの既往歴の ある場合は, 5.2mg/dL 以上がハイ リスク域といわれています。 & 3

①「HDL-コレステロール」, 「総コレステロール」及び「LDL-コレステロール」を併せて測定した場合は, 主たるもの2つの所定点数を算定する。

②3月に1回を限度として算定できる。

LDL-C/HDL-C比

- ・ LDL- コレステロールと HDL- コレステロールと本項目の3項目を同時に依頼いただいた場合, LDL- コレステロールと HDL- コレステロールの測定結果とともに LDL-C/HDL-C 比を算出し, ご報告いたします。
- ・ LDL-C/HDL-C 比のみのご依頼はできません。


動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版抜粋

脂質異常症診断基準

LDLコレステロール	140mg/dL以上	高LDLコレステロール血症
	120~139mg/dL	境界域高LDLコレステロール血症**
HDLコレステロール	40mg/dL未満	低HDLコレステロール血症
トリグリセライド	150mg/dL以上 (空腹時採血*)	高トリグリセライド血症
	175mg/dL以上 (随時採血*)	
Non-HDL コレステロール	170mg/dL以上	高non-HDLコレステロール血症
	150~169mg/dL	境界域高non-HDLコレステロール血症**

- * 基本的に10時間以上の絶食を「空腹時」とする。ただし水やお茶などカロリーのない水分の摂取は可とする。空腹時であることが確認できない場合を「随時」とする。
- * スクリーニングで境界域高LDL-C血症, 境界域高non-HDL-C血症を示した場合は, 高リスク病態がないか検討し, 治療の必要性を考慮する。
- ・ LDL-CはFriedewald式(TC-HDL-C-TG/5) で計算する(ただし空腹時採血の場合のみ)。または直接法で求める。
- ・ TGが400mg/dL以上や随時採血の場合はnon-HDL-C (= TC-HDL-C) かLDL-C直接法を使用する。ただしスクリーニングでnon-HDL-Cを用いる時は, 高TG血症を伴わない場合はLDL-Cとの差が+30mg/dLより小さくなる可能性を念頭においてリスクを評価する。
- ・ TGの基準値は空腹時採血と随時採血により異なる。HDL-Cは単独では薬物介入の対象とはならない。

・動脈硬化性疾患予防から見た脂質管理目標値設定のためのフローチャート



久山町研究によるスコア				予測される10年間の動脈硬化性疾患発症リスク	分類
40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳		
0～12	0～7	0～1	—	2%未満	低リスク
13以上	8～18	2～12	0～7	2%～10%未満	中リスク
—	19以上	13以上	8以上	10%以上	高リスク

久山町研究のスコア（図3-2）に基づいて計算する。

* 頭蓋内外動脈に50%以上の狭窄，または弓部大動脈粥腫（最大肥厚4mm以上）
注：家族性高コレステロール血症および家族性Ⅲ型高脂血症と診断された場合はこのチャートを用いずに第4章「家族性高コレステロール血症」，第5章「原発性脂質異常症」の章をそれぞれ参照すること。

久山町スコアによる動脈硬化性疾患発症予測モデル

①性別	ポイント	④血清LDL-C	ポイント	ポイント合計	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳
女性	0	<120mmHg	0	0	<1.0%	<1.0%	1.7%	3.4%
男性	7	120～139mmHg	1	1	<1.0%	<1.0%	1.9%	3.9%
		140～159mmHg	2	2	<1.0%	<1.0%	2.2%	4.5%
		160mmHg～	3	3	<1.0%	1.1%	2.6%	5.2%
				4	<1.0%	1.3%	3.0%	6.0%
				5	<1.0%	1.4%	3.4%	6.9%
				6	<1.0%	1.7%	3.9%	7.9%
				7	<1.0%	1.9%	4.5%	9.1%
				8	1.1%	2.2%	5.2%	10.4%
				9	1.3%	2.6%	6.0%	11.9%
				10	1.4%	3.0%	6.9%	13.6%
				11	1.7%	3.4%	7.9%	15.5%
				12	1.9%	3.9%	9.1%	17.7%
				13	2.2%	4.5%	10.4%	20.2%
				14	2.6%	5.2%	11.9%	22.9%
				15	3.0%	6.0%	13.6%	25.9%
				16	3.4%	6.9%	15.5%	29.3%
				17	3.9%	7.9%	17.7%	33.0%
				18	4.5%	9.1%	20.2%	37.0%
				19	5.2%	10.4%	22.9%	41.1%

②収縮期血圧	ポイント
<120mmHg	0
120～129mmHg	1
130～139mmHg	2
140～159mmHg	3
160mmHg～	4

⑤血清LDL-C	ポイント
60mg/dL～	0
40～59mg/dL	1
<40mg/dL	2

③糖代謝異常（糖尿病は含まない）	ポイント	⑥喫煙	ポイント
なし	0	なし	0
あり	1	あり	2

注1：過去喫煙者は⑥喫煙はなしとする。

①～⑥のポイント合計	点
------------	---

右表のポイント合計より年齢階級別の絶対リスクを推計する。

リスク区分別脂質管理目標値

治療方針の原則	管理区分	脂質管理目標値(mg/dL)			
		LDL-C	Non-HDL-C	TG	HDL-C
一次予防 まず生活習慣の改善を行った後薬物療法の適用を考慮する	低リスク	<160	<190	<150(空腹時)*** <175(随時)	≥40
	中リスク	<140	<170		
	高リスク	<120 <100*	<150 <130		
二次予防 生活習慣の是正とともに薬物療法を考慮する	冠動脈疾患またはアテローム血栓性脳梗塞（明らかなアテローム***を伴うその他の脳梗塞を含む）の既往	<100 <70**	<130 <100**		

- ・糖尿病において，PAD，細小血管症（網膜症，腎症，神経障害）合併時，または喫煙ありの場合に考慮する。（第3章5.2参照）
- ・**「急性冠症候群」，「家族性高コレステロール血症」，「糖尿病」，「冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞（明らかなアテロームを伴うその他の脳梗塞を含む）」の4病態のいずれかを合併する場合に考慮する。
- ・一次予防における管理目標達成の手段は非薬物療法が基本であるが，いずれの管理区分においてもLDL-Cが180mg/dL以上の場合は薬物治療を考慮する。家族性高コレステロール血症の可能性も念頭に置いておく。（第4章参照）
- ・まずLDL-Cの管理目標値を達成し，次にnon-HDL-Cの達成を目指す。LDL-Cの管理目標を達成してもnon-HDL-Cが高い場合は高TG血症を伴うことが多く，その管理が重要となる。低HDL-Cについては基本的には生活習慣の改善で対処すべきである。
- ・これらの値はあくまでも到達努力目標であり，一次予防（低・中リスク）においてはLDL-C低下率20～30%も目標値としてなり得る。
- ・*** 10時間以上の絶食を「空腹時」とする。ただし水やお茶などカロリーのない水分の摂取は可とする。それ以外の条件を「随時」とする。
- ・**** 頭蓋内外動脈の50%以上の狭窄，または弓部大動脈粥腫（最大肥厚4mm以上）
- ・高齢者については第7章を参照。

出典 日本動脈硬化学会（編）：動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版。日本動脈硬化学会，2022（改変）

生化学的検査

脂質関連物質

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
脂 質 関 連 物 質	A084 8 (3F095)	脂肪酸分画(24成分) 3F095-0000-022-202 3F095-0000-023-202	血漿 0.5	G ↓ X	冷蔵 (45日)	10~14	389 ※5	Gas- chromatograph法	下記参照	血漿：早朝空腹時に指定の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。血漿は冷蔵保存してください。 & 1
	L349 3 (3F095)		血清 0.5	01 ↓ X						
	A066 8 (3F095)	脂肪酸分画(4成分) 3F095-0000-022-202 3F095-0000-023-202	血漿 0.5	G ↓ X	冷蔵 (45日)	4~6	389 ※5	Gas- chromatograph法	ジホモ-γ-リノレン酸 22.6~72.5 アラキドン酸 135.7~335.3 エイコサペンタエン酸 10.2~142.3 ドコサヘキサエン酸 54.8~240.3 (μg/mL) EPA/AA比 0.05~0.61 DHA/AA比 0.27~1.07 (EPA+DHA)/AA比 0.32~1.66	DHHA (ジホモ-γ-リノレン酸)・AA (アラキドン酸)・EPA (エイコサペンタエン酸)・DHA (ドコサヘキサエン酸) 血漿：早朝空腹時に指定の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。血漿は冷蔵保存してください。 & 1
	G058 1 (3F095)		血清 0.5	01 ↓ X						
質	7847 4 (3F096)	極長鎖脂肪酸	血漿 2.0	G ↓ X	凍結 (1ヵ月)	6~19	1141 ※5	Gas- chromatograph法 (GC-MS)	C24:0/C22:0 0.628~0.977 C25:0/C22:0 0.012~0.023 C26:0/C22:0 0.003~0.006	指定の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。血漿は凍結保存してください。 & 1

[A084] 脂肪酸分画(24成分) 基準値

No.	脂肪酸名	略号 (炭素数)	基準値	
			μg/mL	重量%
1	ラウリン酸	C12:0	10.2以下	0.31以下
2	ミリスチン酸	C14:0	10.8~61.1	0.36~1.43
3	ミリストレイン酸	C14:1ω5	3.2以下	0.09以下
4	パルミチン酸	C16:0	495.1~918.3	19.18~23.84
5	パルミトレイン酸	C16:1ω7	23.8~117.3	0.87~3.18
6	ステアリン酸	C18:0	167.6~312.7	6.13~8.49
7	オレイン酸	C18:1ω9	433.9~910.1	16.19~23.66
8	リノール酸	C18:2ω6	708.1~1286.0	23.24~36.89
9	γ-リノレン酸	C18:3ω6	2.5~25.6	0.09~0.72
10	リノレン酸	C18:3ω3	11.5~45.8	0.40~1.30
11	アラキジン酸	C20:0	6.9~14.4	0.24~0.46
12	エイコセン酸	C20:1ω9	2.6~9.5	0.09~0.30
13	エイコサジエン酸	C20:2ω6	4.3~9.3	0.15~0.26
14	5-8-11エイコサトリエン酸	C20:3ω9	6.0以下	0.17以下

15	ジホモ-γ-リノレン酸	C20:3ω6	22.6~72.5	0.79~2.05
16	アラキドン酸	C20:4ω6	135.7~335.3	4.21~9.30
17	エイコサペンタエン酸	C20:5ω3	10.2~142.3	0.36~3.99
18	ベヘニン酸	C22:0	14.6~30.3	0.43~0.91
19	エルシン酸	C22:1ω9	1.4以下	0.04以下
20	ドコサテトラエン酸	C22:4ω6	2.9~10.4	0.10~0.30
21	ドコサペンタエン酸	C22:5ω3	9.5~31.8	0.34~0.89
22	リグノセリン酸	C24:0	15.5~31.2	0.49~0.90
23	ドコサヘキサエン酸	C22:6ω3	54.8~240.3	1.88~6.86
24	ネルボン酸	C24:1ω9	27.1~53.0	0.78~1.64
T/T比(C20:3ω9/C20:4ω6)			0.02以下	
EPA/AA比(C20:5ω3/C20:4ω6)			0.05~0.61	
DHA/AA比(C22:6ω3/C20:4ω6)			0.27~1.07	
(EPA+DHA)/AA比			0.32~1.66	
ω3/ω6比			0.09~0.36	

G



ヘパリン入り
(真空採血量5mL)
内容
ヘパリン Na
65IU
貯蔵方法 室温
有効期間 2年

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
脂 質 関 連 物 質	2601 1 (3F110)	総胆汁酸	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	① 47 ※4	酵素法	10.0以下 (μ mol/L)	& 1
	0006 4 (3F130)	β -リボ蛋白	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4		免疫比濁法	220~650 (mg/dL)	& 1
	3211 3 (3F135)	リボ蛋白分画	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (7日)	2~4	49 ※4	アガロース 電気泳動法	α M 26.9~50.5 F 32.6~52.5 PRE β M 7.9~23.8 F 6.6~20.8 β M 35.3~55.5 F 33.6~52.0 (%)	凍結保存は避けてください。 & 1
	3226 7 (3F150)	コレステロール分画	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (7日)	2~4	57 ※4	アガロース 電気泳動法	HDLコレステロール 23~48 LDLコレステロール 47~69 VLDLコレステロール 2~15 (%)	凍結保存は避けてください。 & 1
	K222 4 (3F087)	酸化LDL (MDA-LDL)	血清 0.3	01 ↓ X	凍結 (21日)	3~14	② 194 ※4	ELISA	男性 45才未満:46~82 45才以上:61~105 女性 55才未満:46~82 55才以上:61~105 (U/L)	採血後、冷蔵保存にて6時間以内に 血清分離し、速やかに凍結保存して ください。 & 1
	3233 9 (3F156)	リボ蛋白(a)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	2~4	③ 107 ※4	LA(ラテックス 凝集比濁法)	40以下(参考値) (mg/dL)	& 3
	4480 4 (3F160)	リボ蛋白リパーゼ (LPL)	速やかに 冷却 血漿 0.3	G ↓ X	凍結 (1ヵ月)	2~8	219 ※4	ELISA	164~284 (ng/mL)	早朝空腹時にヘパリンを体重1kg あ たり 30 単位静注し 15 分後に指定の 容器 (G) に採取し、4℃で遠心分離後、 上清の血漿を凍結保存にてご提出く ださい。EDTA 血漿は避けてくださ い。 基準値につきましては上記採取条件 に基づき設定しております。 & 1
	3234 8 (3F180)	アポリポ蛋白	血清 各0.3	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	2~4	④ 各31 ※4 3項目 以上測 定した 場合 94 ※4	免疫比濁法	M 119~155 F 126~165 (mg/dL)	アポリポ蛋白 B と重複依頼する場合は凍結保存を避けてください。 & 3
	3235 7 (3F185)								M 25.9~35.7 F 24.6~33.3 (mg/dL)	
	3236 6 (3F190)								M 73~109 F 66~101 (mg/dL)	凍結保存は避けてください。 & 3
	3237 5 (3F195)								M 1.8~4.6 F 1.5~3.8 (mg/dL)	アポリポ蛋白 B と重複依頼する場合は凍結保存を避けてください。 & 3
	3238 4 (3F200)								M 5.8~10.0 F 5.4~9.0 (mg/dL)	
	3239 3 (3F205)								M 2.7~4.3 F 2.8~4.6 (mg/dL)	

- ①「尿中硫酸抱合型胆汁酸測定」,「胆汁酸」を同時に測定した場合には、いずれか一方の所定点数のみを算定する。
 ②冠動脈疾患既往歴のある糖尿病患者で、冠動脈疾患発症に関する予後予測の補助の目的で測定する場合3月に1回に限り算定できる。糖尿病患者の経皮的冠動脈形成術治療時に治療後の再狭窄に関する予後予測の目的で測定する場合、上記とは別に術前1回に限り算定できる。
 ③3月に1回を限度として算定できる。
 ④アポリポ蛋白は、AⅠ、AⅡ、B、CⅡ、CⅢ及びEのうち、測定した項目数に応じて所定点数を算定する。

生化学的検査

ビタミン

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
ビ タ ミ ン	3721 7 (3G015)	ビタミンA	血清 0.4	01 ↓ i	冷蔵 (遮光)	4~6		HPLC	97~316 (IU/dL)	遮光してください。 & 1
	3619 1 (3G011)	β-カロチン	血清 0.6	01 ↓ i	凍結 (1ヵ月) (遮光)	5~11		HPLC	M 6.6~47.6 F 20.4~105.2 (μg/dL)	
	3745 1 (5G030)	レチノール結合蛋白 (RBP)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	129 ※6	ラテックス 凝集比濁法	M 2.7~6.0 F 1.9~4.6 (mg/dL)	& 3
	3725 3 (3G025)	ビタミンB ₁	血液 0.5 (EDTA-2Na加)	g4	凍結 (6ヵ月) (遮光)	3~5	239 ※4	LC/MS/MS	24~66 (ng/mL)	遮光容器に採血し、よく混和させ、 凍結保存してください。血液は必ず 遮光容器にてご提出ください。
	4329 2 (3G030)	ビタミンB ₂	血液 0.5 (EDTA-2Na加)	g4	凍結 (1ヵ月) (遮光)	3~5	231 ※4	HPLC	66.1~111.4 (ng/mL)	
	3731 6 (3G036)	ビタミンB ₆	血清 0.5	01 ↓ i	冷蔵 (遮光)	3~5		HPLC	ピリドキサミン M 0.6以下 F 0.6以下 ピリドキサル M 6.0~40.0 F 4.0~19.0 ピリドキシン M 3.0以下 F 3.0以下 (ng/mL)	遮光してください。 & 1
	3737 0 (3G040)	ビタミンB ₁₂	血清 0.6	01 ↓ X	冷蔵	2~4	136 ※4	CLEIA	180~914 (pg/mL)	血清材料以外でのご依頼は避けてく ださい。(特に、EDTA血漿はデー タ上昇傾向がみられます。) & I
	3735 2 (3G060)	ビタミンC (アスコルビン酸)	(血清中) 除蛋白上清 0.5	r5 ↓ i	凍結 (7日) (遮光)	3~5	296 ※4	HPLC	5.5~16.8(血清中) (μg/mL)	正確に血清 0.5mL を専用容器 (r5) に加え、混和後遠心分離し、その上 清を遮光ポリスビッツ (i) に移し替 え、凍結してご提出ください。 & 1

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
3794 7 (36070)	1,25-(OH) ₂ ビタミンD	血清 0.6	01 ↓ X	冷蔵	3~7	① 388 ※4	RIA2抗体法	成人 20.0~60.0 小児 20.0~70.0 (pg/mL)	& 1
A099 2 (36065)	25OHビタミンD (骨粗鬆症) 3G065-0000-023-052	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	② 117 ※4	CLEIA	ビタミンD欠乏 20.0未満 ビタミンD不足20.0 ~29.9(ng/mL)	& 3
A087 5 (36065)	25ヒドロキシビタミンD (くる病・骨軟化症) 3G065-0000-023-052	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~4	③ 117 ※4	CLEIA	ビタミンD欠乏 20以下 (ng/mL)	& 3
3743 3 (36080)	ビタミンE	血清 0.5	01 ↓ i	凍結 遮光	7~13		蛍光灯	0.75~1.41 (mg/dL)	遮光してください。 & M
3738 9 (36105)	葉酸	血清 0.6	01 ↓ X	冷蔵	2~4	146 ※4	CLEIA	4.0以上 (ng/mL)	溶血および血清材料以外での依頼 は避けてください。(溶血の場合、赤 血球中葉酸の影響で高値となります。 特に、EDTA 血漿はデータ上昇傾向 がみられます。)& I
4147 4 (36090)	ビタミンK分画	速やかに遠心 血漿 2.0	L ↓ i	凍結 (17日) 遮光	3~9		HPLC	ビタミンK1 0.15~1.25 ビタミン K2(MK-4) 0.10以下 (ng/mL)	採血後、速やかに血漿分離してくだ さい。血漿は必ず遮光ポリスビッツ (i) で凍結してご提出ください。 3.2%クエン酸ナトリウム0.5mLに 血液4.5mLの割合で採血し、転倒 混和を5~6回繰り返した後、速や かに血漿分離してください。血漿は 必ず遮光スビッツ (i) にてご提出く ださい。血漿は必ず凍結保存してく ださい。 & 1
3744 2 (36110)	ニコチン酸 (ナイアシン)	血液 1.5 (ヘパリン加)	G	冷蔵	7~13		Bioassay	4.7~7.9 (μg/mL)	指定の容器に採血し、よく混和した 後、冷蔵保存してください。 & 1
8712 2 (36055)	カルニチン分画	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵	2~4	④ ⑤ ⑥ 95 + 95 ※4	酵素サイクリ ング法	総カルニチン 45~91 遊離カルニチン 36~74 アシルカルニチン 6~23 (μmol/L)	& 3

- ① 活性型ビタミンD₃剤による治療開始後1月内においては2回を限度とし、その後は3月に1回を限度として算定する。
 ② 骨粗鬆症の薬剤治療方針時に1回に限り算定する。
 ③ ビタミンD欠乏症くる病若しくはビタミンD欠乏性骨軟化症の診断時又はそれらの疾患に対する治療中のみ算定できる。ただし、診断時においては1回を限度とし、その後は3月に1回を限度として算定する。
 ④ 先天性代謝異常症の診断補助又は経過観察のために実施する場合は、月に1回を限度として算定する。
 ⑤ 静脈栄養管理若しくは経腸栄養管理を長期に受けている筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化症若しくは小児の患者、人工乳若しくは特殊治療用ミルクを使用している小児患者、バルプロ酸ナトリウム製剤投与中の患者、Fanconi症候群の患者又は慢性維持透析の患者におけるカルニチン欠乏症の診断補助若しくは経過観察のために、本検査を実施する場合は、6月に1回を限度として算定する。
 ⑥ 「カルニチン分画」と「先天性代謝異常症検査」を併せて行った場合は、主たるもののみに算定する。



生化学的検査

電解質

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
0033 4 (3H010)	緊急 Na(ナトリウム)	速やかに遠心 血清0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	① 11 ※4	電極法	136~147 (mEq/L)	採血後は、血液凝固を確認後、速やかに血清分離してください。血液のまま放置、冷却保存はナトリウムが低値を示しますので避けてください。
L118 9 (3H010)		蓄尿 0.5	X	冷蔵		① 11 ※4		1.60~5.80 (g/day)	
0035 2 (3H020)	Cl(クロール)	血清0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	① 11 ※4	電極法	98~109 (mEq/L)	
L120 6 (3H020)		蓄尿 0.5	X	冷蔵		① 11 ※4		2.50~8.90 (g/day)	
0034 3 (3H015)	緊急 K(カリウム)	速やかに遠心 血清0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	11 ※4	電極法	3.60~5.00 (mEq/L)	溶 採血後は、血液凝固を確認後、速やかに血清分離してください。血液のまま放置、冷却保存又は溶血は、カリウムが高値を示しますので避けてください。
L119 8 (3H015)		蓄尿 0.5	X	冷蔵		11 ※4		1.00~3.90 (g/day)	
0008 2 (3H030)	緊急 Ca(カルシウム)	血清0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	1~2	② 11 ※4	アルセナゾⅢ法	8.5~10.2 (mg/dL)	重 (蓄尿) 依頼項目ごとに単独の検体をご提出ください。凍結保存は避けてください。
L122 4 (3H030)		蓄尿 0.5	X	冷蔵		② 11 ※4		0.1~0.3 (g/day)	
0005 5 (3H040)	P(無機リン)	血清0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	③ 17 ※4	モリブデン酸 直接法	2.4~4.3 (mg/dL)	
L123 3 (3H040)		蓄尿 0.5	X	冷蔵		③ 17 ※4		0.5~1.0 (g/day)	
0030 7 (3H025)	Mg(マグネシウム)	血清0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	2~4	11 ※4	キシリジルフール法	1.8~2.6 (mg/dL)	重 (蓄尿) 依頼項目ごとに単独の検体をご提出ください。凍結保存は避けてください。
L490 6 (3H025)		蓄尿 0.5	X	冷蔵		11 ※4		0.02~0.13 (g/day)	
3771 2 (3H045)	浸透圧	血清0.7	01 ↓ X		2~4	15 ※3	氷点降下法	276~292 (mOsm/Kg・H ₂ O)	凍 凍結保存は避けてください。
4692 9 (3H045)		部分尿 1	X	冷蔵		16 ※1		濃縮時 850以上 希釈時 40~85 (Fishberg試験時) (mOsm/Kg・H ₂ O)	

①「ナトリウム」及び「クロール」については、両方を測定した場合も、いずれか一方のみを測定した場合も、同一の所定点数により算定する。
 ②「カルシウム」及び「イオン化カルシウム」を同時に測定した場合には、いずれか一方についてのみ所定点数を算定する。
 ③「無機リン」及び「リン酸」については、両方を測定した場合も、いずれか一方のみを測定した場合も、同一の所定点数により算定する。

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
生 体 微 量 金 属	0028 0 (31010)	鉄(Fe)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	1~2	11 ※4	ニトロソ- PSAP法	M 54~200 F 48~154 (μg/dL)	溶血でのご依頼は避けてください。
	3625 4 (31010)		蓄尿 10	X	冷蔵	6~11	11 ※4	原子吸光法	0.10~0.20 (mg/day)	
	0038 9 (31015)	総鉄結合能 (TIBC)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	1~2	11 ※4	ニトロソ- PSAP法 (計算法)	M 253~365 F 246~410 (μg/dL)	
	0031 6 (31020)	不飽和鉄結合能 (UIBC)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	1~2	11 ※4	ニトロソ- PSAP法	M 104~259 F 108~325 (μg/dL)	
	3653 3 (31025)	Cu(銅)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	23 ※4	比色法	68~128 (μg/dL)	& 3
	4671 2 (31025)		蓄尿 5	X	冷蔵	2~6	23 ※4	原子吸光分析法	M 4.2~33.0 F 2.5~20.0 (μg/day)	
	3654 2 (31030)	Zn(亜鉛)	速やかに遠心 血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	2~4	132 ※4	比色法	80~130 (μg/dL)	採血後は速やかに血清分離をしてください。 & 3
	4672 1 (31030)		蓄尿 5	X	冷蔵	2~8	132 ※4	原子吸光分析法	M 260~1000 F 160~620 (μg/day)	
	3807 2 (31320)	緊急 リチウム	血清 0.5	02 ↓ X	冷蔵	2~4	① 特	比色法	治療濃度範囲 0.3~1.2 (mEq/L)	リーマス, リチオマール 血清分離剤入り容器の使用は避けて ください。薬物検査において, 測定 値に影響を及ぼす場合があります。 & 3
生 体 色 素	0011 8 (31010)	緊急 総ビリルビン(T-Bil)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	11 ※4	化学酸化法	0.3~1.2 (mg/dL)	
	0012 7 (31015)	直接ビリルビン (D-Bil)	血清 0.5	01 ↓ X	冷蔵 (1ヵ月)	1~2	11 ※4	化学酸化法	0.4以下 (mg/dL)	

①: 特定薬剤治療管理料 (126 ページ参照)

① 投与薬剤の血中濃度を測定し, その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合, 月1回に限り算定する。

[3807] リチウム採血時刻についての注意事項

1. TDM(血中薬物濃度モニター)における採血時間です。
2. 連続投与においては定常状態到達後, 採血を行ってください。
3. 中毒時はPeak濃度も測定する必要があります。
4. 標準的な時間であり, 患者状況にあわせて採血することが望ましいと思われます。

生化学的検査

ポルフィリン

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
ポ ル フ ィ リ ン	2624 6 (3J040)	コプロポルフィリン 定性	部分尿 2	Y	冷蔵 遮光	4~10		HPLC	(一)	遮光してください。
	2625 5 (3J040)		蓄尿 2							
	2626 4 (3J040)	コプロポルフィリン	部分尿 2	Y	冷蔵 遮光	4~10	131 ※1	HPLC	170以下 ($\mu\text{g/g} \cdot \text{CRE}$)	& 1
	2627 3 (3J040)		蓄尿 2							
	2609 3 (3J075)	δ -アミノレブリン酸 (δALA)	部分尿 0.7	Y	冷蔵 遮光	3~5	106 ※1	HPLC	(mg/L)	遮光してください。 下図をご参照ください。 & 1
	2610 1 (3J075)		蓄尿 0.7							
	3601 0 (3J040)	コプロポルフィリン	血液 1.5 (ヘパリン加)	G3	冷蔵 遮光	7~11	210 ※4	HPLC	1以下 ($\mu\text{g/dL RBC}$)	凍結保存は避けてください。 遮光してください。 指定の遮光容器に採血し、よく混和 させ、冷蔵保存してください。血液 は必ず遮光容器にてご提出くださ い。 &N
	3602 9 (3J050)	ウロポルフィリン	血液 1.5 (ヘパリン加)	G3	冷蔵 遮光	7~11		HPLC	1以下 ($\mu\text{g/dL RBC}$)	
	3603 8 (3J055)	プロトポルフィリン	血液 1.5 (ヘパリン加)	G3	冷蔵 遮光	7~11	272 ※4	HPLC	30~86 ($\mu\text{g/dL RBC}$)	

産業医学(有機溶剤、鉛)関連検査

産業医学関連検査は、有機溶剤作業者、鉛作業者を対象として、体内に有機溶剤や鉛がどの程度取り込まれているかを定期的にチェックすることを主な目的としているため、結果の評価については、正常・異常の鑑別を目的としたものではなく、作業環境を含めた総合的な判断が必要とされています。

また、労働安全衛生法に基づく各中毒予防規則では、各健康診断結果報告書を、所轄の労働基準監督署長に提出することが定められています。

有機溶剤、鉛関連検査結果分布表

対 象 物 質	測 定 項 目	単 位	分 布			
			1	2	3	
トルエン	尿中馬尿酸	g/L	1以下	1超 2.5以下	2.5超	
キシレン	尿中メチル馬尿酸	g/L	0.5以下	0.5超 1.5以下	1.5超	
1,1,1-トリクロルエタン	尿中総三塩化物	mg/L	10以下	10超 40以下	40超	
	尿中トリクロル酢酸	mg/L	3以下	3超 10以下	10超	
N,N-ジメチルホルムアミド	尿中N-メチルホルムアミド	mg/L	10以下	10超 40以下	40超	
ノルマルヘキサン	尿中 2,5-ヘキサジジオン	mg/L	2以下	2超 5以下	5超	
スチレン※1	尿中スチレン代謝物※2	g/L	分布報告はいたしません。			
トリクロルエチレン※1	尿中総三塩化物	mg/L	100以下	100超 300以下	300超	
	尿中トリクロル酢酸	mg/L	30以下	30超 100以下	100超	
テトラクロルエチレン※1	尿中総三塩化物	mg/L	3以下	3超 10以下	10超	
	尿中トリクロル酢酸	mg/L	3以下	3超 10以下	10超	

※1:2014年11月より、スチレン、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレンは、有機溶剤中毒予防規則から特定化学物質障害予防規則の対象に位置づけられました。
特定化学物質健康診断においては、労働基準監督署への分布区分報告は不要となっておりますが、検査結果の経過を見る上での指標として記載いたします。

※2:測定値はマンデル酸とフェニルグリオキシル酸の合算値です。

検体取り扱い方法

連続した作業日の初日を除いた作業終了時に採尿してください。ただし、採尿2時間前に一度排尿してください。

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
毒 物 ・ 産 業 医 学	4697 4 (3K025)	尿中馬尿酸	部分尿 1.3	X	冷蔵	4~10		HPLC	(g/L)	連続した作業日の初日を除いた作業終了時に採尿してください。ただし、採尿2時間前に一度排尿してください。 90ページをご参照ください。 & 1
	4698 3 (3K030)	尿中メチル馬尿酸	部分尿 1.3	X	冷蔵	4~10		HPLC	(g/L)	
	9179 4 (3K042)	尿中スチレン代謝物 3K042-0000-001-204	部分尿 1.8	X	冷蔵 (14日)	4~14		HPLC	(g/L)	週末の作業日の作業終了時に採尿してください。ただし、採尿2時間前に一度排尿してください。 測定値は、マンデル酸(MA)、フェニルグリオキシル酸(PGA)および合算値(MA+PGA)です。 生物学的許容値:0.43(g/L)以下です。 (生物学的許容値とは、ほとんどのすべての労働者に健康上の悪い影響がみられないと判断される濃度です。)依頼件数によって、所要日数が変動いたします。 90ページをご参照ください。 &1
	4721 6 (3K011)	尿中総三塩化物	部分尿 各0.8	X	冷蔵	4~10		Gas-chromatograph法	(mg/L)	週末の作業日の作業終了時に採尿してください。ただし、採尿2時間前に一度排尿してください。 90ページをご参照ください。 & 1
	4722 5 (3K012)									
	4723 4 (3K013)									
	4724 3 (3K016)	尿中トリクロル酢酸	部分尿 各0.8	X	冷蔵	4~10		Gas-chromatograph法	(mg/L)	週末の作業日の作業終了時に採尿してください。ただし、採尿2時間前に一度排尿してください。 90ページをご参照ください。 & 1
	4725 2 (3K017)									
	4726 1 (3K018)									
	4703 6 (3K045)	尿中N-メチルホルムアミド	部分尿 1.7	X	冷蔵	4~10		Gas-chromatograph法 (GC-MSD)	(mg/L)	連続した作業日の初日を除いた作業終了時に採尿してください。ただし、採尿2時間前に一度排尿してください。 90ページをご参照ください。 & 1
	4704 5 (3K050)	尿中2,5-ヘキサンジオン	部分尿 1.7	X	冷蔵	4~10		Gas-chromatograph法 (GC-MSD)	(mg/L)	
	2620 0 (3K110)	鉛(Pb)	血液 3.0 (ヘパリン加)	G	冷蔵	3~5		原子吸光分析法	(μg/dL)	

鉛関連検査結果分布表

(鉛中毒予防規則、様式第3号)より

対 象 物 質	測 定 項 目	単 位	分 布			
			1	2	3	
鉛	血中鉛	μg/dL	20以下	20超	40以下	40
	尿中 1-アミノレブリン酸 ※	mg/L	5以下	5超	10以下	10超

検体取り扱い方法

※遮光保存してください。



生化学的検査

毒物・産業医学／その他

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
毒物・産業医学	3656 0 (3K105)	アルミニウム(AI)	血清 0.6	e	冷蔵	3~5	109 ※4	原子吸光分析法	10以下 ($\mu\text{g/L}$)	重凍 e 容器は凍結保存を避けてください。 コンタミネーションの防止のため、 シャントから滴下または真空採血し てください。採血後は直ちに充分転 倒混和し、遠心分離後そのまま冷蔵 保存してください。 & 1
	3657 9 (3K115)	クロム	血液 0.7 (ヘパリン加)	G	冷蔵	6~19		原子吸光 分光光度法	1.0以下 ($\mu\text{g/dL}$)	血液：凍結保存は避けてください。 指定の容器に採血し、よく混和させ、 冷蔵保存してください。 &N
	4674 9 (3K115)		部分尿 1	Z					2以下 ($\mu\text{g/L}$)	
	9520 4 (3K125)	マンガン	血液 0.7 (ヘパリン加)	G	冷蔵	7~20	① 27 ※4	原子吸光 分光光度法	0.8~2.5 ($\mu\text{g/dL}$)	凍 凍結保存は避けてください。 指定の容器に採血し、よく混和させ、 冷蔵保存してください。 &N
	3662 3 (3K120)	カドミウム	血液 0.5 (ヘパリン加)	G	冷蔵	7~11		ICP-MS	0.5以下 ($\mu\text{g/dL}$)	血液：凍結保存は避けてください。 指定の容器に採血し、よく混和させ、 冷蔵保存してください。 &M
	4992 6 (3K120)		部分尿 1	Z		7~13			3.8以下 ($\mu\text{g/L}$)	
その他の	E148 3 (3Z050)	イヌリン定量	血清 0.7	01 ↓ X	冷蔵 (21日)	2~8	② 120 ※4	酵素法	(mg/dL)	凍 凍結保存は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーション の影響がより大きくなりますので検 体採取にあたっては取り扱いに十分 ご注意ください。依頼書に臨床診断 名をご記入ください。 &ヨ
	E149 2 (3Z050)		部分尿 1	X						
	7741 1 (3Z065)	結石分析(成分比率)	結石 10mg	L2	室温	6~7	117 ※5	赤外線吸収 スペクトロ フォトメトリー	(%)	サンプルは乾燥させ結石専用容器に てご提出ください。血液などの付い たサンプルは蒸留水で洗浄後、乾燥 させてご提出ください。 &%
	8884 2	尿素呼気試験	250mL 以上	X6	室温	3~5	③ 70 ※7	赤外線光 分析法(IR)	2.5未満 (パーミル)	空腹時に実施願います。 検査薬ユービットの服用前後の呼気 を用いた測定のため、前後ベア提出し てください。 測定に120mL以上の呼気が必要で すので、呼気バックが十分に膨らむま で呼気を入れてください。 &%
	3785 7 (3Z040)	エタノール	血液 1.0 (ヘパリン加)	G ↓ X	凍結	3~6	105 ※4	Gas- chromatograph法	0.1未満 (mg/mL)	血液はポリスビッツに移し替え、必 ず凍結保存にてご提出ください。 & 1
	3787 5 (3Z024)	ネオプテリン	血清 0.3	01 ↓ i	冷蔵 (遮光)	6~12		HPLC	2~8 (pmol/mL)	遮光してください。 & 1

①1月以上(胆汁排泄能の低下している患者については2週間以上)高カロリー静脈栄養法が行われている患者に対して、3月に1回に限り算定することができる。
②尿素窒素又はクレアチニンにより腎機能低下が疑われた場合に、6月に1回に限り算定できる。ただし、「クレアチニン(腎クリアランス測定の目的で行い、血清及び尿を同時に測定する場合に限る。)」を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
③「尿素呼気試験-IR」、「便中ヘリコバクター・ピロリ抗原」を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号保医発0221第31号平成25年2月21日より一部改正)に即して行って下さい。



項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
K128 9 (3B222)	骨型酒石酸抵抗性酸性 フォスファターゼ (TRACP-5b)	血清 0.5	01 ↓ X	凍結	2~4	①② 156 ※5 (腫2)	EIA	男性 170~590 閉経前女性 120~420 閉経後女性 250~770 (mU/dL)	& 1
4753 1 (5C123)	I型コラーゲン架橋 N-テロペプチド (NTx) (骨粗鬆症)	部分尿 3	X	冷蔵	2~4	①③ 153 ※5	CLEIA	(クレアチニン換算値) 男性 13.0~66.2 閉経前女性 9.3~54.3 閉経後女性 14.3~89.0 (参考値) (nmol/mmol・CRE) 判定基準: 下記参照	午前中の第二尿をご提出ください。 血尿での提出は避けてください。
4756 8 (5C146)	デオキシピリジノリン (DPD) (骨粗鬆症)	部分尿 3	X	冷蔵	2~4	①③ 191 ※5	EIA	M 2.1~5.4 F 2.8~7.6 (nmol/mmol・CRE) 判定基準: 下記参照	& 1
3345 5 (3B072)	骨型アルカリ フォスファターゼ(BAP)	血清 0.8	01 ↓ X	冷蔵	2~4	④ 157 ※5	CLEIA	男性 3.7~20.9 閉経前女性 2.9~14.5 閉経後女性 3.8~22.6 (μg/L)	& I
A197 3 (5C120)	I型プロコラーゲン -N-プロペプチド (total P 1 NP)	血清 0.4	01 ↓ X	冷蔵 (28日)	2~4	④ 160 ※5	ECLIA	男性(30~83歳) 18.1~74.1 閉経前女性(30~44歳) 16.8~70.1 閉経後女性(45~79歳) 26.4~98.2 (ng/mL)	溶血でのご依頼は避けてください (溶血の場合、データが低値傾向となります。) & I

(腫2): 悪性腫瘍特異物質治療管理料 (35ページ参照)

- ①「NTx」,「オステオカルシン」,「尿中DPD」,「TRACP-5b」を併せて実施した場合は、いずれか1つのみ算定する。
- ②代謝性骨疾患及び骨転移(代謝性骨疾患や骨折の併発がない肺癌、乳癌、前立腺癌に限る。)の診断補助として実施した場合に1回、その後6月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合に1回に限り算定できる。また治療方針を変更した際には変更後6月以内に1回に限り算定できる。
- ③骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また、薬剤治療方針を変更した時は変更後6月以内に1回に限り算定できる。
- ④「骨型アルカリフォスファターゼ(BAP)」,「インタクトI型プロコラーゲン-N-プロペプチド(Intact P I NP)」,「I型プロコラーゲン-N-プロペプチド(P I NP)」及び「ALP・アインザイム(PAG電気泳動法)」のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるものに算定する。

[4753] I型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx) (骨粗鬆症) の判定基準 [4756] デオキシピリジノリン(DPD) (骨粗鬆症)

検査項目	骨粗鬆症薬剤治療の指標				単位
	骨折リスク	カットオフ値	骨量減少	カットオフ値	
I型コラーゲン架橋 N-テロペプチド(NTx) (骨粗鬆症)	54.3		35.3		nmolBCE/mmol・CRE
デオキシピリジノリン (DPD) (骨粗鬆症)	7.6		5.9		nmol/mmol・CRE




生化学的検査

クリアランス・機能試験

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
クリアランス・機能試験	0043 3 (8A020)	血清 0.5 と 時間蓄尿 5	(血清) 01 と (蓄尿) X	冷蔵	1~2		酵素法	80.0~200.0 (mL/min)	年齢、身長、体重、採尿時間、尿量を必ず明記してください。 採取方法は下記をご参照ください。 平均体表面積(補正係数)は、1.73m ² を使用しています。
	0044 2 (8A025)	血清 0.5 と 蓄尿 5						93.0~238.0 (L/day)	


[0043] クレアチニンクリアランスの採取方法

- (1) 排尿後、微温水500mLを飲ませる。
 - (2) 飲水後、60分後に放尿させ、完全に排尿し終わったとき時刻を正確に(1分以内の誤差で)記録する。
 - (3) 開始30分後に2mL採血する。溶血をさけて血清分離する(B₁)。
 - (4) 開始1時間後、完全採尿し、正確に尿量及び終了時刻を記録する(H₁)。
- 以上のようにして得た血清(B₁)、尿(H₁)を冷蔵保存し、提出してください。
年齢、身長、体重、採尿時間、尿量を必ず明記してください。



[0044] クレアチニンクリアランス(24時間法)の採取方法


- (1) 朝6時に完全排尿させてこれを捨て、以後の尿を翌朝6時まで蓄尿する。
 - (2) 混和後、蓄尿量を測定し、その一部(5mL)を提出する(H₁)。
 - (3) 昼食前に2mL採血する。溶血を避けて血清分離する(B₁)。
- 以上のようにして得た血清(B₁)、尿(H₁)を冷蔵保存し、ご提出ください。
年齢、身長、体重、採尿時間、尿量を必ず明記してください。



項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
血液一般形態検査	5503 7 末梢血液 一般検査	血液 2.0 (EDTA-2K加)	g	冷蔵	1~2	① 21 ※3	下記各項目の 検査方法をご 参照ください。	下記 各項目の基準値欄 をご参照ください。	溶凍 溶血・凝固・凍結検体は避けてくだ さい。 採血後直ちに4~5回転倒混和して 冷蔵保存してください。 (注) 採血直後、直ちに転倒混和して ください。転倒混和が不十分であ ったり、転倒混和するまで時間を要 すると血液の部分凝固や目視では確 認できないレベルの血液凝固が生じ るため、検査結果に影響を及ぼし ます。指定の容器に採血し、直ちに 5回以上転倒混和させ、冷蔵保存し てください。 溶血、凝固および凍結検体は測定 できません。 検体は採血後、当日中にご提出くだ さい。
	0801 1 (2A010) 緊急 白血球数(WBC)						半導体レーザー FCM方式 (自動化法)	M 3900~9800 F 3500~9100 (/μL)	
	0802 0 (2A020) 緊急 赤血球数(RBC)						シースフロー DC方式 (自動化法)	M 427~570 F 376~500 (×10 ⁴ /μL)	
	0803 9 (2A030) 緊急 血色素量(Hb)						SLS-Hb法 (自動化法)	M 13.5~17.6 F 11.3~15.2 (g/dL)	
	0804 8 (2A040) 緊急 ヘマトクリット値 (Ht)						シースフロー DC方式 (自動化法)	M 39.8~51.8 F 33.4~44.9 (%)	
	0805 7 (2A060) 緊急 平均赤血球容積 (MCV)						演算法 (自動化法)	M 82.7~101.6 F 79.0~100.0 (fL)	
	0806 6 (2A070) 緊急 平均赤血球血色素量 (MCH)							M 28.0~34.6 F 26.3~34.3 (pg)	
	0807 5 (2A080) 緊急 平均赤血球血色素濃度 (MCHC)							M 31.6~36.6 F 30.7~36.6 (%)	
	0808 4 (2A050) 緊急 血小板数(PLT)						シースフロー DC方式 (自動化法)	M 13.1~36.2 F 13.0~36.9 (×10 ⁴ /μL)	
	0809 3 (2A110) 緊急 網状赤血球数(RET)					12 ※3	半導体レーザー FCM方式 (自動化法)	M 2~27 F 2~26 (%)	
	0852 5 (2A090) 緊急 好酸球数					17 ※3	半導体レーザー FCM方式 (自動化法)	70~440 (/μL)	
	L101 7 (2A160) 緊急 末梢血液像 (白血球像)					血液 2.0	g	冷蔵	
M314 0 緊急 赤血球形態									
0853 4 (2A300) 緊急 鼻汁中好酸球	鼻汁塗抹 標本 2~3枚	t	室温	1~2	15 ※3	ライト染色に よる鏡検法	(ー)	標本は新鮮鼻汁で作成し、ご提出 ください。室温保存してください。	

①「末梢血液一般検査」は赤血球数、白血球数、血色素測定(Hb)、ヘマトクリット値(Ht)、血小板数の全部又は一部を行った場合に算定する。







②「好酸球数」及び「末梢血液像(自動機械法)」又は「末梢血液像(鏡検法)」を行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。



血液学的検査

血小板活性化検査

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
4101 4 (28600)	β-トロンボグロブリン (β-TG)	速やかに冷却 乏血小板 血漿 0.3	Q ↓ X	凍結 (1ヵ月)	2~9	171 ※3	EIA	50以下 (ng/mL)	検体採取方法は下記をご参照ください。 & 1
4102 3 (28620)	血小板第4因子 (PF-4)	速やかに冷却 乏血小板 血漿 0.3	Q ↓ X	凍結 (1ヵ月)	2~9	173 ※3	EIA	20以下 (ng/mL)	
K593 3 (56530)	HIT抗体(血小板第4因子・ ヘパリン複合体抗体)	速やかに遠心 血漿 0.5	K1 ↓ X	凍結	4~6	390 ※6	ラテックス 比濁法	1.0未満 陰性 (U/mL)	血小板第4因子・ヘパリン複合体に対する HIT 抗体 (IgG・IgM・IgA) を測定しております。なお、検査結果はグロブリンクラス別での報告ではありません。 3.2%クエン酸ナトリウム0.2mLに血液1.8mLの割合で採血し、転倒混和を5~6回繰り返した後、速やかに血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。 & 1

容器形態	検 査 項 目	保 存	採 取 方 法		注 意 事 項
Q  (真空採血禁止) 抗血小板剤入り 内 容 テオフィリン アデノシン ジビルタモール クエン酸ナトリウム クエン酸 貯蔵方法 遮光・冷蔵 有効期間 1年	β-トロンボ グロブリン(β-TG)	凍結		あらかじめ専用容器(Q)を冷却しておいてください。	砕氷水の水面より専用容器中の液面が下になるようにしてください。角氷は使用しないでください。
				できるだけ20ゲージ(19~21ゲージでも可)の針を用いたプラスチック注射器で血液3.0mLを採取してください。(採血にあたって、専用容器(Q)を使用しての直接採血は絶対にしないでください。)	真空採血管、カテーテルおよび他の方法は使用しないでください。また、駆血帯も使用しないでください。10mL以上の採血は避け、出来るだけ血管壁を損傷しないようにスムーズに採取してください。
				針を取って静かに専用容器(Q)のフタを開け、血液2.7mLを静かに移し、ゆっくり2~3回反転倒混和してください。	指定の専用容器以外は使用しないでください。専用容器は振とうさせないでください。
				専用容器を速やかに砕氷と水の入ったラックに入れてください。	砕氷水の水面より専用容器中の血液の液面が下になるようにしてください。
	血小板第4因子 (PF-4)	凍結	凍結	以上の操作を2分以内に行ってください。	
				砕氷水に15~30分間放置後、採取血液を2,000Gで30分間、2~4℃で遠心分離してください。(右表は2,000Gにおけるローターの回転半径と回転数との関係を示します。) * 遠心器回転数の計算式 G=1.118×10 ⁻⁵ ×r×n ² r:遠心器のローター半径(cm) n:1分間あたりの回転数(rpm)	1時間以内に必ず冷却下で遠心分離してください。
	上清の表面よりやや下の部分をマイクロピペットで各0.3mL検体容器へ採取してください。血餅に近い部分からの採取は絶対に避けてください。 (血漿の全量採取は避けてください。) 検体は必ず凍結保存してください。(1ヵ月安定)				

換 算 表			
半径 (cm)	回転数 (rpm)	半径 (cm)	回転数 (rpm)
10	4,200	22	2,800
12	3,800	24	2,700
14	3,500	26	2,600
16	3,300	28	2,500
18	3,100	30	2,400
20	3,000		

K1

3.2%クエン酸
ナトリウム入り
(真空採血量1.8mL)
内容
3.2%クエン酸 Na
0.2mL
貯蔵方法 室温
有効期間 1年



	項目コード (統一コード)	検 査 項 目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
凝固系一般検査	K801 1 (2B030)	緊急 プロトロンビン時間 (PT)	速やかに遠心 血漿 0.5	K1 ↓ X	凍結	1~2	18 ※3	凝固時間法	秒 10.5~13.5 (秒) % 70~130 (%) 比 設定せず	抗凝固療法の治療管理指標である国際標準化比 (INR) もご報告いたします。 3.2%クエン酸ナトリウム0.2mLに血液1.8mLの割合で採血し、転倒混和を5~6回繰り返した後、速やかに血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。(複数の検査項目をご依頼される場合で、採血量が1.8mL以上の場合、L容器をご使用ください。)
	0842 6 (2B020)	活性化部分 トロンボプラスチン時間 (APTT)	速やかに遠心 血漿 0.5	K1 ↓ X	凍結	1~2	29 ※3	凝固時間法	24.3~36.0 (秒)	3.2%クエン酸ナトリウム0.2mLに血液1.8mLの割合で採血し、転倒混和を5~6回繰り返した後、速やかに血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。(複数の検査項目をご依頼される場合で、採血量が1.8mL以上の場合、L容器をご使用ください。)
凝固因子検査	0848 0 (2B100)	フィブリノゲン (FIB)	速やかに遠心 血漿 0.5	K1 ↓ X	凍結	1~2	23 ※3	トロンビン 凝固時間法	150~400 (mg/dL)	3.2%クエン酸ナトリウム0.2mLに血液1.8mLの割合で採血し、転倒混和を5~6回繰り返した後、速やかに血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。(複数の検査項目をご依頼される場合で、採血量が1.8mL以上の場合、L容器をご使用ください。)
	4104 1 (2B350)	第Ⅱ因子 (F2)	速やかに遠心 血漿 各0.4	K1 ↓ X	凍結 (21日)	2~4	223 ※3	凝固時間法	75~135 (%)	3.2%クエン酸ナトリウム0.2mLに血液1.8mLの割合で採血し、転倒混和を5~6回繰り返した後、速やかに血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。(複数の検査項目をご依頼される場合で、採血量が1.8mL以上の場合、L容器をご使用ください。)
	4105 0 (2B370)	第Ⅴ因子 (F5)					223 ※3		70~135 (%)	
	4107 8 (2B380)	第Ⅶ因子 (F7)					223 ※3		75~140 (%)	
	4108 7 (2B390)	第Ⅷ因子 (F8)					223 ※3		60~150 (%)	
	4109 6 (2B400)	凝固因子 活性検査					223 ※3		70~130 (%)	
	4110 4 (2B410)	第Ⅹ因子 (F10)					223 ※3		75~145 (%)	
	4111 3 (2B420)	第ⅩⅠ因子 (F11)					223 ※3		50~150 (%)	
	4112 2 (2B430)	第ⅩⅡ因子 (F12)					223 ※3		70~140 (%)	
	4113 1 (2B440)	第ⅩⅢ因子 (F13)	速やかに遠心 血漿 0.4	L ↓ X	凍結 (21日)	2~4	144 ※3	ベセスダ法	検出せず (ベセスダU/mL)	
	4114 0 (2B460)	凝固抑制 因子検査	速やかに遠心 血漿 各1.0				144 ※3			
	4115 9 (2B470)	第Ⅸ(9) 因子	速やかに遠心 血漿 各1.0				144 ※3			

& 1

& 1

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
凝固	4138 4 (2B700)	プロテインC(抗原量)	速やかに遠心 血漿 0.3	K1 ↓ X	凍結	2~4	220 ※3	LPiA	70~150 (%)	① & 1
	4139 3 (2B700)	プロテインC活性	速やかに遠心 血漿 0.4	K1 ↓ X	凍結 (21日)	2~4	227 ※3	凝固時間法	64~146 (%)	
	8540 3 (2B710)	プロテインS(抗原量)	速やかに遠心 血漿 0.2	K1 ↓ X	凍結 (21日)	2~4	152 ※3	ラテックス 凝集反応	M 73~137 F 59~143 (%)	① 測定対象はトータル（遊離型および 複合体型）です。 & 1
	4152 8 (2B710)	プロテインS活性	速やかに遠心 血漿 0.4	K1 ↓ X	凍結 (21日)	2~4	163 ※3	凝固時間法	M 67~164 F 56~126 (%)	①
	9767 1 (2B711)	プロテインS (遊離型抗原量)	速やかに遠心 血漿 0.2	K1 ↓ X	凍結 (21日)	2~6	152 ※3	ラテックス 凝集反応	M 50~131 F 49~133 (%)	① & 1
線溶	4166 3 (2B310)	トータルPAI-1 (tPA・PAI-1複合体)	速やかに冷却 遠心 血漿 0.5	K1 ↓ X	凍結 (21日)	2~4	240 ※3	LPiA	50以下 (ng/mL)	採血後、速やかに低温（4℃）で血漿分離してください。室温遠心や専用容器（L）での採血はデータが高値となるため避けてください。速やかに分離できない場合は、氷水中に保存し、1時間以内に血漿分離してください。測定対象はトータルPAI-1（tPA・PAI-1複合体および活性型、潜在型 PAI-1）です。 ① & 1
	4147 4 (3G090)	ビタミンK分画	速やかに遠心 血漿 2.0	L ↓ i	凍結 (17日) 遮光	3~9		HPLC	ビタミンK1 0.15~1.25 ビタミンK2(MK-4) 0.10以下 (ng/mL)	採血後、速やかに血漿分離してください。血漿は必ず遮光ポリスビッツ(i)で凍結してご提出ください。 ② & 1
系	A865 1 (2B730)	トロンボモジュリン	血清 0.4	01 ↓ X	凍結 (21日)	2~4	204 ※3	CLEIA	12.1~24.9 (U/mL)	① & 1
	速やかに遠心 血漿 0.4		K1 ↓ X	8.7~22.7 (U/mL)						
検査	4158 2 (5G500)	ループスアンチ コアグラント	速やかに遠心 血漿 各1.0	L ↓ X	凍結 (21日)	2~4	265 ※6	APTT 凝固時間法	46.5以下 (秒)	採血後、速やかに室温で1500G以上15分間遠心後、バフィーコートより5mm以上うえから血漿を採取して凍結保存にてご提出ください。血小板の混入は、測定結果に影響しますのでご注意ください。 ※遠心器回転数の計算式 G = 1.118 × 10 ⁻⁵ × r × n ² r：遠心器のローター半径（cm） n：1分間あたりの回転数（rpm） & 1
	A049 7 (5G502)					リン脂質中和法		1.16以下		
						4167 2 (5G501)		希釈ラッセル 蛇毒時間法	1.2以下	

- ① 3.2%クエン酸ナトリウム0.2mLに血液1.8mLの割合で採血し、転倒混和を5~6回繰り返した後、速やかに血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。(複数の検査項目をご依頼される場合で、採血量が1.8mL以上の場合、L容器をご利用ください。)
- ② 3.2%クエン酸ナトリウム0.5mLに血液4.5mLの割合で採血し、転倒混和を5~6回繰り返した後、速やかに血漿分離してください。血漿は必ず遮光スビッツ(i)にてご提出ください。血漿は必ず凍結保存してください。

トータルPAI-1(tPA・PAI-1複合体) 注意事項

- 採血容器はK1を用い、必ず冷却遠心してください。室温遠心やL容器での採血はデータが高値となるため、避けてください。
- 速やかに分離できない場合は、氷水中に保存し、1時間以内に分離してください。



一般検査

尿一般検査

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
尿 一 般 検 査	5510 9	尿一般定性検査 pH, 蛋白, 糖, ウロ ビリノーゲン, ビリル ビン, ケトン体, 潜血, 比重(部分尿)	部分尿 10	X	冷蔵	1~2		下記 各項目の検査 方法欄をご参 照下さい。	下記 各項目の基準値欄 をご参照下さい。	
	1001 8 (1A035)	pH	部分尿 10	X	冷蔵	1~2	①	試験紙法	5.0~7.5	凍結保存は避けてください。 採尿後、当日中にご提出ください。 2.0mL以上の提出がない場合、検査 不能となる場合があります。
	1003 6 (1A010)	蛋白							(-)	
	1004 5 (1A020)	糖							(-)	
	1005 4 (1A040)	ウロビリノーゲン							(±)	
	1007 2 (1A055)	ビリルビン							(-)	
	1008 1 (1A060)	ケトン体							(-)	
	1006 3 (1A100)	潜血							(-)	
	1002 7 (1A030)	比重(部分尿)						屈折法	1.005~1.030	
尿 一 般 検 査	1115 2 (1A105)	尿沈渣	部分尿 10	X	冷蔵	1~2	①	フローサイト メトリー 又は 鏡検法	赤血球:4個以下 白血球:4個以下 (/HPF)	凍結保存は避けてください。 (JCCLS GP1-P4「尿沈渣検査法」 準拠) 採尿後、当日中にご提出ください。 凍結検体は測定できません。 HPF: 強拡大視野(400倍)にて鏡 検
	L138 7 (1A015)	尿蛋白定量	蓄尿 1	X	冷蔵	1~2	7 ※1	ピロガロール レッド法	31.2~120.0 (mg/day)	
	1011 7 (1A015)		部分尿 1	X					10以下 (mg/dL)	
	L139 6 (1A025)	尿糖定量	蓄尿 1	X	冷蔵	1~2	9 ※1	ヘキシチ ナーゼUV法	40~85 (mg/day)	
	1012 6 (1A025)		部分尿 1	X					20以下 (mg/dL)	

①★当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。(尿中一般検査26点, 尿沈渣(鏡検法)27点, フローサイトメトリー法24点)

採尿にあたっての注意事項

早朝尿かつ中間尿で採尿しご提出ください。

中間尿は最初と最後の尿は採らず中間の尿を採ったもので、尿道や外陰部からの成分(赤血球, 白血球, 扁平上皮, 細菌など)の混入を防ぎます。



項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備考
E776 6 (1B042)	便中ヘモグロビン及び トランスフェリン 1B042-0000-015-064	糞便	d8	冷蔵	2~4	56 ※1	金コロイド法	ヘモグロビン 100未満 トランスフェリン 50未満 (ng/mL)	凍 凍結保存は避けてください。 専用採便容器に採取してご提出ください。 2回法依頼時は1回目=ピンク色, 2 回目=黄色ラベル容器を使用してく ださい。
E767 6 (1B042)	便中ヘモグロビン及び トランスフェリン (1回目) 1B042-1301-015-064								
E770 2 (1B042)	便中ヘモグロビン及び トランスフェリン (2回目) 1B042-1302-015-064								
0671 6 (1B040)	便中ヘモグロビン 定性(金コロイド法) 1回目 1B040-1301-015-064	糞便	d8	冷蔵	1~2	37 ※1	金コロイド法	陰性	凍 凍結保存は避けてください。 専用採便容器に採取してご提出くだ さい。 2回法依頼時は1回目=ピンク色, 2 回目=黄色ラベル容器を使用してく ださい。
0672 5 (1B040)	便中ヘモグロビン 定性(金コロイド法) 2回目 1B040-1302-015-064								
0668 0 (1B040)	便中ヘモグロビン 定量(金コロイド法) 1回目 1B040-1301-015-064	糞便	d8	冷蔵	1~2	41 ※1	金コロイド法	100未満 (ng/mL)	凍 凍結保存は避けてください。 専用採便容器に採取してご提出くだ さい。 2回法依頼時は1回目=ピンク色, 2 回目=黄色ラベル容器を使用してく ださい。
0669 9 (1B040)	便中ヘモグロビン 定量(金コロイド法) 2回目 1B040-1302-015-064								

糞便検査

一般検査



一般検査

髄液検査／精液検査／その他

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
髄 液 検 査	5906 0 (1C990)	髄液一般検査 外見, 比重, 反応 細胞数, 細胞種類	髄液 5~10	X	冷蔵	1~2	77 ※1	下記 各項目の検査 方法欄をご参 照ください。	下記 各項目の基準値欄 をご参照ください。	凍結保存は避けてください。
	L151 2	外見 (キサントクロミー)	髄液 5~10	X	冷蔵	1~2	77 ※1	肉眼的観察	(-)	
	L152 1	比重						屈折計法	1.005~1.007	
	L153 0	反応(pH)						pH試験紙法	7.0~7.5	
	M019 8 (1C030)	細胞数						視算法F-R計 算板法	0/3~15/3 (/mm ³)	
	1065 8 (1C035)	細胞種類					11 ※4	鏡検法		
	M014 3	蛋白定量						ピロガロール レッド法	10.0~40.0 (mg/dL)	
	1069 4	糖定量						電極法	50.0~75.0 (mg/dL)	
	1070 2	クロール定量						電極法	120~125 (mEq/L)	
そ の 他	0090 1	関節液検査	関節液 10.0	X	冷蔵	3~6	50 ※1	鏡検法		凍結保存は避けてください。検体は 採取後、当日中にご提出ください。 測定項目：尿酸ナトリウム結晶。ピ ロリン酸カルシウム結晶。コレステ ロール結晶

分類 (由来)	材料	容器	採取方法
口腔・ 気道・ 呼吸器	喀痰	①滅菌喀痰採取容器	可能な限り上気道・口腔内常在菌に汚染されないように滅菌喀痰容器に採取し、直ちに冷蔵保存してください。 (患者に十分説明し、うがいにより洗浄後、咳によって深部から喀出され、かつ唾液混入の少ない喀痰を採取してください。)
	咽頭ぬぐい液	⑧eSwab105 レギュラー FLOQスワブ	eSwab105 レギュラーFLOQスワブの綿棒で咽頭をこすって、粘液を採取し、直ちに付属のアミース培地に無菌的に入れ、速やかに冷蔵保存してください。
消化器	便	⑧eSwab105 レギュラー FLOQスワブ または ⑪①キャリーブリア採便管	eSwab105 レギュラーFLOQスワブまたはキャリーブリア採便管を用い適量の便を採取し付属のキャリーブリア培地に無菌的に入れてください。 ・嫌気性菌の検出には、拇指頭大の便を採取し、嫌気ポーターを使用してください。 ・便での塗抹鏡検は実施しておりません。
	胆汁(A・B・C) 胃液 十二指腸液	⑨嫌気ポーター	5～10mLのサンプルを無菌的に採取し、嫌気ポーターに速やかに注入し、直ちに冷蔵保存してください。
	部分尿 尿管カテーテル 膀胱カテーテル	①①滅菌ポリスピッツ	5～10mLのサンプルを無菌的に採取し、滅菌ポリスピッツに入れ直ちに冷蔵保存してください。また、淋菌とトリコモナスの検索を目的とする場合は室温保存してください。
泌尿器 ・ 生殖器	前立腺液 陰分泌 物 膿	⑧eSwab105 レギュラー FLOQスワブ	eSwab105 レギュラーFLOQスワブの綿棒で適量を採取し、直ちに付属のアミース培地に無菌的に入れ、直ちに冷蔵保存してください。また、淋菌とトリコモナスの検索を目的とする場合は室温保存してください。
	動脈血 静脈血	①①①血液カルチャーボトル	血液カルチャーボトル好気性菌用、嫌気性菌用の2本に各3～10mL(最適8～10mL)の血液を無菌的に注入し、緩やかに転倒混和し、室温保存してください。フラン器での保存は検査結果に影響を与えます。
血液 ・ 穿刺液	髄液 腰椎穿刺液	⑨シードチューブⅡ	3～5mLのサンプルを無菌的に採取し、嫌気ポーターに速やかに注入し、室温保存してください。
	胸水 関節液 腹水	⑨シードチューブⅡ	5～10mLのサンプルを無菌的に採取し、嫌気ポーターに速やかに注入し、直ちに冷蔵保存してください。
	耳漏	⑧①eSwab106 ミニチップ FLOQスワブ	eSwab106 ミニチップFLOQスワブの綿棒で適量を無菌的に採取し、付属のアミース培地に入れ、直ちに冷蔵保存してください。
その他	組織 膿	⑨シードチューブⅡ	各サンプルを綿棒で無菌的に採取し、嫌気ポーターに速やかに入れ、直ちに冷蔵保存してください。

I 滅菌喀痰採取 容器  貯蔵方法：室温	k eSwab105 レギュラー FLOQスワブ  内容： アミース培地 1mL 貯蔵方法：室温 有効期間： 製造から1年3ヵ月	k1 eSwab106 ミニチップ FLOQスワブ  内容： アミース培地 1mL 貯蔵方法：室温 有効期間： 製造から1年3ヵ月	n シードチューブⅡ嫌気 培養用(容器容量4mL)  内容： 寒天、塩化ナトリウム リン酸塩等 貯蔵方法：室温 有効期間：製造から6ヵ月
U1 キャリーブリア 採便管  貯蔵方法：室温	m1 血液カルチャー ボトル (嫌気用)  抗生物質吸着中和剤入り 貯蔵方法：室温 有効期間：製造から9ヵ月 最適量：8～10mL (許容範囲 3～10mL)	q1 血液カルチャーボトル (好気用)  抗生物質吸着中和剤入り 貯蔵方法：室温 有効期間：製造から9ヵ月 最適量：8～10mL (許容範囲 3～10mL)	r1 滅菌ポリスピッツ  貯蔵方法：室温

シードチューブⅡの取り扱い方法

■液体検体(穿刺液、消化液など)

1. 穿刺部(ゴムキャップ上の小円)を消毒用アルコール綿などで消毒します。
2. 注射針を穿刺部に垂直に穿刺し、液体検体を注入します。
3. チューブラベルを貼付し輸送してください。
4. 検体は速やかに検査してください。やむを得ず保存する場合は、**冷蔵**保存してください。



■固形検体(膿、糞便、組織片など)

1. ゴムキャップを消毒用アルコール綿などで消毒します。
2. ゴムキャップをはずし、固形検体を入れます。検体は寒天の奥まで挿入してください。(注)綿棒は長さ7cmまで入ります。それ以上のものは、切断してください。
3. ゴムキャップを速やかにしっかり閉めます。
4. チューブラベルを貼付し輸送してください。
5. 検体は速やかに検査してください。やむを得ず保存する場合は、**冷蔵**保存してください。



細菌検査採取方法

- ・検査材料名または材料採取部位を必ず明記してください。
- ・目的菌が淋菌、髄膜炎菌の場合は、**室温**保存してください。
- ・嫌気性培養の検査材料は、シードチューブⅡに採取してください。
- ・所要日数は目的菌等により異なりますので、ご了承ください。

目的菌名	目的菌名	目的菌名	目的菌名	備考(全目的菌共通)
下痢原性大腸菌(O157含)	腸炎ビブリオ	クロストリジオイデス・ディフィシル	肺炎球菌	●目的菌のみのご依頼はできません。一般細菌培養同定も同時にご依頼ください。 ●クロストリジオイデス・ディフィシル、クロストリジウム・パーフリンゲンスは嫌気性培養を同時にご依頼ください。 便の嫌気性培養で目的菌のご依頼がない場合はクロストリジオイデス・ディフィシルを対象として検査します。 ●下痢原性大腸菌、O157大腸菌は、培養同定(消化管)と同時に依頼ください。(注)チェックがない場合は検査を実施いたしませんのでご注意ください。 ●MRSAは薬剤感受性の結果から判定されます。薬剤感受性のご依頼がない場合、スクリーニング培地の結果から判定しますので、より確実な判定のため薬剤感受性検査の同時依頼をお勧めします。 ●百日咳菌、レジオネラ、ジフテリア菌などはチェックをいただいた場合のみ検査を実施します。 ●目的菌の指定は10項目まででお願いします。それ以上のご依頼は、報告書には反映できません。
O157大腸菌	コレラ菌	クロストリジウム・パーフリンゲンス	A群溶連菌	
赤痢菌	エルシニア菌	レジオネラ	B群溶連菌 (GBS)	
サルモネラ菌	カンピロバクター	ジフテリア菌	カンジダ	
チフス菌	ブドウ球菌	百日咳菌	クリプトコッカス	
パラチフス菌	MRSA	室温 淋菌	アスペルギルス	
腸チフス菌	緑膿菌	室温 髄膜炎菌	白黴菌	

微生物学的検査

一般細菌

	項目コード (統一コード)	検査項目	検査材料	容器	保存	検査方法	実施料 判断料	所要 日数	備 考				
一般細菌	00665-3	塗抹鏡検	口腔，気道または呼吸器からの検体	喀痰咽頭ぬぐい液	冷蔵	グラム染色	① 67 ※7	2～4	&1				
	00666-2	培養同定				培養同定およびMALDI-TOF-MS	②③ 180 ※7	3～6		&1			
	00669-9	嫌気性培養				嫌気培養同定およびMALDI-TOF-MS	④ 137 ※7	6～14			必ず培養同定と同時に ご依頼ください。 ☆		
	00668-0	感受性検査				微量液体希釈法 ディスク拡散法	⑤ —	3～6				&1	
	00670-7	塗抹鏡検	消化管からの検体	糞便胆汁胃液		グラム染色	① 67 ※7	2～4	便での塗抹鏡検は実施して おりません。 &1				
	00671-6	培養同定				培養同定およびMALDI-TOF-MS	②③ 200 ※7	3～6		&1			
	00674-3	嫌気性培養				嫌気培養同定およびMALDI-TOF-MS	④ 137 ※7	6～14			必ず培養同定と同時に ご依頼ください。 ☆		
	00673-4	感受性検査				微量液体希釈法 ディスク拡散法	⑤ —	3～6				&1	
	00675-2	塗抹鏡検	泌尿器または生殖器からの検体	中間尿カテーテル尿腔分泌物膿		グラム染色	① 67 ※7	2～4	&1				
	00676-1	培養同定				培養同定およびMALDI-TOF-MS	②③ 190 ※7	3～6		目的菌が淋菌の場合は室温 保存してください。 &1			
	00679-8	嫌気性培養				嫌気培養同定およびMALDI-TOF-MS	④ 137 ※7	6～14			必ず培養同定と同時に ご依頼ください。 ☆		
	00678-9	感受性検査				微量液体希釈法 ディスク拡散法	⑤ —	3～6				&1	
	00680-6	尿中生細菌数定量				標準白金耳法	②③ 60 ※7	3～5					尿以外の材料では実施して おりません。(単位:CFU/mL) &1
	00681-5	塗抹鏡検	血液または穿刺液	静脈血動脈血髄液 胸水腹水関節液		静脈血動脈血髄液は室温	① 67 ※7	2～4	純髄液は室温保存して ください。血液は血液培養 ボトルに入れ室温保存 してください。 &1				
	00682-4	培養同定				培養同定およびMALDI-TOF-MS	②③⑥ 240 ※7	3～10		必ず培養同定と同時に ご依頼ください。 ☆			
	00685-1	嫌気性培養				嫌気培養同定およびMALDI-TOF-MS	④ 137 ※7	6～14			&1		
	00684-2	感受性検査				微量液体希釈法 ディスク拡散法	⑤ —	3～10				&1	
00686-0	塗抹鏡検	その他の部位からの検体	耳漏眼脂皮膚爪組織膿		グラム染色	① 67 ※7	2～4	&1					
00687-9	培養同定				培養同定およびMALDI-TOF-MS	②③ 180 ※7	3～6		&1				
00690-5	嫌気性培養				嫌気培養同定およびMALDI-TOF-MS	④ 137 ※7	6～14			必ず培養同定と同時に ご依頼ください。 ☆			
00689-7	感受性検査				微量液体希釈法 ディスク拡散法	⑤ —	3～6				&1		
03636-2	KOH染色(皮膚(爪)糸状菌塗抹鏡検)				皮膚爪	KOH直接鏡検	① 67 ※7					2～4	爪白癬の検体はできるだけ、 検出率の高い爪の基部に 近いところの深部(爪床に 近い部位)から採取して ください。 &1

- ①同一検体について「尿沈渣(鏡検法)」又は「尿沈渣(フローサイトメトリー法)」を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。尿沈渣(鏡検法)」又は「尿沈渣(フローサイトメトリー法)」を同一日に併せて算定する場合は、当該検査に用いた検体の種類を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- ②検体ごとに所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、簡易培養は算定できない。症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数ヶ所から検体を採取した場合は主たる部位又は一ヶ所のみの所定点数を算定する。
- ③各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合も含む。
- ④同一検体について、培養同定と併せて嫌気培養を行った場合は、122点を加算する。
- ⑤1菌種185 2菌種240 3菌種以上310 ※7
- ⑥血液を2か所以上から採取した場合に限り、培養同定の血液又は穿刺液を2回算定できる。
- ☆感受性薬剤は、委託先であるエスアールエルセントラルラボラトリー標準の薬剤にて実施します。
- 注)ご依頼の検査の内容によっては、所要日数がさらにかかる場合があります。

項目コード	検 査 項 目		検査材料	容器	保存	検査方法	実施料 判断料	所要 日数	備 考
抗 <									

①集菌塗抹法を行った場合は、集菌塗抹法加算として、35点を所定点数に加算する。

②抗酸菌分離培養検査は、検体の採取部位が異なる場合であっても、同時に又は一連として検体採取した場合は、1回のみ所定点数を加算する。

③他の検査により結核菌が陰性であることが確認された場合にのみ算定できる。「抗酸菌同定」と併せて実施された場合にあっては、主たるもののみ算定する。

☆[50092A1]結核菌感受性(MIC)と[50396A1]抗酸菌感受性(MIC)SGMおよび[50397A1]抗酸菌感受性(MIC)RGMは同時に依頼いただけません。

★[50087A1]抗酸菌分離培養[液体法]からの検査の場合は、平板培地に増菌後に実施となるため日数がさらにかかります。(+3~7日)

材料	容器	検査方法
喀痰	①滅菌喀痰採取容器	可能な限り上気道・口腔内常在菌に汚染されないように滅菌喀痰容器に採取し、直ちに冷蔵保存してください。(患者に十分説明し、うがいにより洗浄後、咳によって深部から喀出され、かつ唾液成分の少ない喀痰を採取してください。)
便	①滅菌ポリスピッツ	適量を無菌的に採取し、滅菌ポリスピッツに入れ、直ちに冷蔵保存してください。 ・便の塗抹鏡検は実施しておりません。
胸水 腹水 関節液	①滅菌ポリスピッツ	各サンプルを無菌的に採取し、滅菌ポリスピッツに入れ、直ちに冷蔵保存してください。 ・一般細菌を同時に依頼される場合は嫌気ポーターをご使用ください。
部分尿	①滅菌ポリスピッツ	5~10mLのサンプルを無菌的に採取し、滅菌ポリスピッツに入れ、直ちに冷蔵保存してください。
核酸同定	①滅菌喀痰採取容器	核酸同定検査ではコンタミネーションの影響が大きくなりますので検体採取にあたっては、取扱いに十分ご注意ください。可能な限り上気道・口腔内常在菌に汚染されないよう滅菌喀痰容器に採取し、直ちに冷蔵保存してください。



微生物学的検査

一般細菌特殊検査

	項目コード (統一コード)	検 査 項 目	検査材料	容器	保存	検査方法	実施料 判断料	所要 日数	備 考	
一般細菌 特殊検査	02232-1	ヘリコバクター培養 同定	胃生検組織	n2	冷蔵	培養同定	① 200 ※7	9~11	&1	
	02884-8	ヘリコバクター感受性 検査				寒天平板 希釈法	185 ※7	14~20		薬剤名：アモキシシリン、クラリス ロマイシン、メトロニダゾール &1
	01055-9	CDトキシン(GDH)	便1.0g	U		イムノクロマ ト法	95 ※6	2~4	単独の検体にてご依頼ください。 凍結保存は避けてください。 &1	
	04897-2	CDトキシンB遺伝子 定性	便1.0g			PCR(リアル タイムPCR)	②③ 450 ※7		単独の検体にてご依頼ください。 基準値：陰性 凍結保存は避けてください。 &1	
	02220-4	大腸菌ペロトキシン	菌株			室温	RPLA	④ 184 ※7	2~4	下痢原性大腸菌検出時の追加時には、 最寄りの営業所・営業拠点までご連絡 ください。 ※当社で検出された大腸菌に追加し た場合の所要日数です。 &1
	08834-7	コアグラゼ型別	菌株			室温	中和反応		4~6	純培養された黄色ブドウ球菌をご提 出ください。
	08917-5	エンテロトキシン型別	菌株			室温	RPLA			
	08918-4	TSST-1産生	菌株			室温	RPLA			


その他	0Y103-2 院内環境(ふきとり法)	環境材料	k	冷蔵	培養同定		4~8	※院内環境検査は、MRSAを含むブドウ球菌、腸内細菌、緑膿菌、酵母様真菌、糸状菌等の一般細菌を目的として検査します。 &1
	0Y126-7 院内環境(スタンプ法)		n3	室温				
	02128-7 O157スクリーニング	便	k	冷蔵	培養同定		4~6	病院内、施設内職員(健常者)のスクリーニング検査としてご依頼ください。 &1
	02174-6 MRSAスクリーニング	咽頭ぬぐい液、 鼻腔など	k k1		培養同定		3~5	

項目コード (統一コード)	便検診検査	便		K U1	冷蔵	培養同定						4～6	病院内、施設内職員（健常者）のスクリーニング検査としてご依頼ください。			
	対象菌種→	赤痢	サルモネラ	腸管出血性 大腸菌	下痢原性 大腸菌	O157	腸炎 ビブリオ	腸チフス	パラチフス	コレラ	黄色 ブドウ球菌	カンピロ バクター	ビブリオ	エルシニア		
便 検 診 検 査	OY084-4 便検診2菌種	○	○													
	OY066-4 便検診3菌種-1	○	○		○											
	OY087-1 便検診3菌種-2	○	○			○										
	OY067-3 便検診3菌種-3	○	○				○									
	OY303-0 便検診3菌種-4	○	○										○			
	便検診3菌種-5	○	○	○												
	OY056-5 便検診4菌種-1	○						○	○	○						
	OY057-4 便検診4菌種-2	○	○		○		○									
	OY095-2 便検診4菌種-3	○	○			○	○									
	OY073-6 便検診4菌種-4	○	○		○						○					
	OY304-9 便検診4菌種-5	○	○			○							○			
	OY305-8 便検診4菌種-6	○	○		○								○			
	便検診4菌種-7	○	○	○			○									
	OY074-5 便検診5菌種-1	○	○			○		○	○							
	OY075-4 便検診5菌種-2	○	○			○	○					○				
	OY306-7 便検診6菌種-1	○	○			○	○					○		○		

- ①「大腸菌O157抗体定性」、「大腸菌O157抗原定性」及び「細菌培養同定検査の消化管からの検体によるもの」のうちいずれかを複数測定した場合は、主たるもののみ算定する。なお、「大腸菌O157抗体定性」はLA法による。
- ②別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。
- ③「クロストリジイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出」は、以下の(イ)から(ハ)をいずれも満たす入院中の患者に対して実施した場合に限り算定する。
(イ)クロストリジイデス・ディフィシル感染症を疑う場合であって、「クロストリジイデス・ディフィシル抗原定性」において、クロストリジイデス・ディフィシル抗原陽性かつクロストリジイデス・ディフィシルトキシン陰性であること。(ロ)2歳以上でBristol Stool Scale 5以上の下痢症状があること。(ハ)24時間以内に3回以上、又は平常時より多い便回数があること。イ 本検査は、関連学会の定める指針に沿って実施した場合に限り算定できる。なお、下痢症状並びに本検査を行う前のクロストリジイデス・ディフィシル抗原及びクロストリジイデス・ディフィシルトキシンの検査結果について診療録に記載すること。
- ④「大腸菌ペロトキシン定性」は、「細菌培養同定検査」により大腸菌が確認され、病原性大腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。イ「大腸菌ペロトキシン定性」のうち、細菌培養を行うことなく糞便から直接検出する方法であってELISA法によるものについては、臨床症状や流行状況から腸管出血性大腸菌感染症が強く疑われる場合に限り、「細菌培養同定検査」を踏まえることなく行った場合にも算定できる。

ヘリコバクター培養同定採取方法(シードチューブHPの取り扱い方法)

- 採取した「胃生検組織」を直ちに採取容器(n2)に入れ、黒線より下へ挿入してください。
- 検体は30分以内に冷蔵保存し、当日中にご依頼ください。



n2
シードチューブHP
(ヘリコバクター
培養同定用)

貯蔵方法: 冷蔵
有効期間: 製造から3ヵ月

U
糞便容器

貯蔵方法: 室温

k
eSwab105
レギュラー
FLOQスワブ

内容:
アミース培地 1mL
貯蔵方法: 室温
有効期間:
製造から1年3ヵ月

k1
eSwab106
ミニチップ
FLOQスワブ

内容:
アミース培地 1mL
貯蔵方法: 室温
有効期間:
製造から1年3ヵ月


U1
キャリーブリア
採便管

n3
スタンプ培地
院内環境検査用

貯蔵方法:
冷蔵 有効期間:
製造から4ヵ月

院内環境検査(ふきとり法)


被検体の一定面積 (10cm×10cm通例) をeSwab105レギュラー FLOQスワブに添付されている綿棒 (あらかじめ培地に刺して湿らせておく) にてよくふきとり再度培地に刺しご提出ください。



テープ等でわくをつくり、
培地で湿らせた綿棒で全体をよくふきとります。

院内環境検査(スタンプ法)

スタンプ培地 (n3) のキャップをとりはすし、培地面に手指など触れないよう注意し被検体の表面に培地面をかるく押しつけます。約5秒後再びキャップをしてご提出ください。



約5秒間かるく押しつけます。
(スタンプ培地は担当営業までお問い合わせください)

薬剤感受性標準セット

菌群			ブドウ球菌	グラム陽性桿菌	バチルス菌	リステリア菌	ノカルジア菌	モラクセラ菌	肺炎球菌	連鎖球菌	腸球菌	ヘモフィルス菌	グラム陰性桿菌	緑膿菌	アシネトバクター	マルトフィリア	バクテロイデス	その他の非発酵菌	カンピロバクター	ビブリオ	嫌気性菌	淋菌
薬剤系統	略号	一般名																				
ペニシリン系(penicillins)	PCG	ベンジルペニシリン	●	●	●	●	●		●	●	●										●	○
	MPIPC	オキサシリン	●																			
	ABPC	アンピシリン	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●						●	●	●	
	PIPC	ピペラシリン												●						●	●	
セフェム系(cephems)	CEZ	セファゾリン	●										●							●		
	CTM	セフォチアム	●					●				●	●									
	CXM	セフロキシム						●														
	CTX	セフォタキシム		●	●		●	●	●	●			●		●					●	●	
	CMX	セフメノキシム		●								●										
	CAZ	セフトアジジム											●	●	●	●	●	●		●		
	CTRX	セフトリアキソン						●	●	●		●										○
	CFPM	セフェピム		●				●					●	●	●				●	●		
	CMZ	セフメタゾール											●								●	
	CCL	セファクロル										●	●									○
	CFIX	セフィキシム																				○
	CPDX-PR	セフボドキシム-プロキシセチル											●									
	CDTR-PI	セフトレレン-ピボキシル											●									
	CFDN	セフジニル										●										
カルバペネム系(carbapenems)	IPM/CS	イミペネム/シラスタチン	●	●	●		●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	MEPM	メロペネム		●		●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	DRPM	ドリベネム											●									
モノバクタム系(monobactams)	AZT	アズトレオナム											●	●				●				
β-ラクタマーゼ阻害剤合剤 (β-lactamase inhibitors)	CVA/AMPC	クラバン酸/アモキシシリン						●	●	●		●	●						●	●		
	SBT/ABPC	スルバクタム/アンピシリン	●					●				●	●		●					●	●	
	SBT/CPZ	スルバクタム/セフォペラゾン											●									
	TAZ/PIPC	タゾバクタム/ピペラシリン										●	●	●	●					●	●	
アミノグリコシド系 (aminoglycosides)	GM	ゲンタマイシン	●	●	●	●							●	●	●				●	●		
	AMK	アミカシン			●		●						●	●	●				●			
	TOB	トブラマイシン											●	●	●				●			
	ABK	アルベカシン	●																			
マクロライド系(macrolides)	CAM	クラリスロマイシン						●		●		●							●			
	EM	エリスロマイシン	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●		
	AZM	アジスロマイシン						●	●	●	●	●							●	●		
テトラサイクリン系 (tetracyclines)	MINO	ミノサイクリン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	TC	テトラサイクリン						●	●	●	●	●							●	●		○
リンコマイシン系(lincomycins)	CLDM	クリンダマイシン	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●		
キノロン系(quinolones)	LVFX	レボフロキサシン	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	CPFX	シプロフロキサシン		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	MFLX	モキシフロキサシン						●													●	
	GRNX	ガレノキサシン								●		●										
	STFX	シタフロキサシン								●												
グリコペプチド系 (glycopeptides)	VCM	バンコマイシン	●	●	●			●	●	●											▲	
	TEIC	テイクラン	●								●											
その他の系 (miscellaneous antibacterial agents)	ST	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	FOM	ホスホマイシン									●		●						●			
	CP	クロラムフェニコール			●			●	●	●		●					●	●	●	●	●	
	MNZ	メトロニダゾール														●	●	●	●	●	●	
	RFP	リファンピシン	●								●											
	LZD	リネゾリド	●	●			●				●											
	DAP	ダプトマイシン	●								●											

- 検出された菌種 (群) によって、効力の高い薬剤の組み合わせが検査されます。
- 上記一覧の菌種 (群) に該当しない場合は、当社にて薬剤の選定をさせていただきます。
- 検出された菌種によっては、標準薬剤パターンで検査できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 常在細菌 (Normal flora) の感受性検査は実施しておりません。
- ▲: VCMはC.difficile検出時報告します。
- : 淋菌はディスク拡散法を用いて検査します。

カテゴリー	内容	備考
S	Susceptible (感性)	CLSIの基準に基づき報告します。
I	Intermediate (中間)	
R	Resistant (耐性)	

薬物検査

抗てんかん剤

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位) (治療濃度範囲)	採血時刻	備考 (製品名、薬剤名等)
抗 て ん か ん 剤	0061 3 (3L175)	緊急 フェノバルビタール	血清 0.5	02 ↓ X	冷蔵	2~4	① 特	EIA	10~40 ($\mu\text{g/mL}$)	次回投与直前 (Trough濃度)	フェノバル、 ワコビタール、 ルミナール ③
	4066 4 (3L175)		血漿 0.5	G ↓ X							
	3802 7 (3L190)	緊急 プリミドン	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	2~4	① 特	EIA	5.0~12.0 ($\mu\text{g/mL}$)		プリミドン、 プリムロン ③
	(3L190)		血漿 0.3	G ↓ X							
	0063 1 (3L185)	緊急 フェニトイン	血清 0.5	02 ↓ X	冷蔵	2~4	① 特	EIA	10.0~20.0 ($\mu\text{g/mL}$)	経口： 次回投与直前 (Trough濃度) 静注： 投与後 2~4時間	アレビアチン、 ヒダントール、 ジフェニルヒダントイン ③
	(3L185)		血漿 0.5	G ↓ X							
	0064 0 (3L115)	緊急 カルバマゼピン	血清 0.5	02 ↓ X	冷蔵	2~4	① 特	EIA	4~12 ($\mu\text{g/mL}$)		デグレトール、 テレスミン、 レキシン ③
	(3L115)		血漿 0.5	G ↓ X							
	3809 0 (3L135)	緊急 エトスクシミド	血清 0.5	02 ↓ X	冷蔵	2~4	① 特	EIA	40.0~100.0 ($\mu\text{g/mL}$)	次回投与直前 (Trough濃度)	ザロンチン、 エピレオプチマル ③
	(3L135)		血漿 0.5	G ↓ X							
	0066 8 (3L195)	緊急 バルプロ酸	血清 0.2	02 ↓ X	冷蔵	1~2	① 特	EIA	50~100 ($\mu\text{g/mL}$)		デパケン、 セレニカ R、 バレリン、 ハイセレン ③

①: 特定薬剤治療管理料 (115ページ参照)

① 投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

採血容器についての注意事項

血清分離剤入り容器の使用は避けてください。薬物検査において、測定値に影響を及ぼす場合があります。

採血時刻についての注意事項

1. TDM(血中薬物濃度モニター)における採血時間です。
2. 連続投与においては定常状態到達後、採血を行ってください。
3. 中毒時はPeak濃度も測定する必要があります。
4. 標準的な時間であり、患者状況にあわせて採血することをお勧めします。

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位) (治療濃度範囲)	採血時刻	備考 (製品名、薬剤名等)
抗 て ん か ん 剤	A257 6 (3L210)	ゾニサミド	血清 0.5	02 ↓ X	冷蔵	2~4	① (特)	ラテックス凝集法	10~30 ($\mu\text{g/mL}$)	次回投与直前 (Trough濃度)	エクセグラン &3
	3813 5 (3L205)	トリメタジオン	血清 0.5	02 ↓ X	凍結 (12日)	7~13	① (特)	LC-MS/MS	300~500 ($\mu\text{g/mL}$)		ミノアレ (活性代謝物であるジメ タジオンを測定) &M
	3814 4 (3L125)	クロナゼパム	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	3~5	① (特)	LC/MS/MS	20~70 (ng/mL)	次回投与直前 (Trough濃度)	リボトリール, ランドセン &1
	3815 3 (3L165)	ニトラゼパム	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	3~5	① (特)	LC/MS/MS	20~200 (ng/mL)	次回投与直前 (Trough濃度)	ベンザリン, ネルボン &1
	3816 2 (3L130)	ジアゼパム	血清 0.5	02 ↓ X	冷蔵	3~6	① (特)	HPLC	ジアゼパム 600~1000 (ng/mL)	次回投与直前 (Trough濃度) ただし、抗て んかん剤とし て用いる場合	N-デスメチルジア ゼパムも同時報告いたし ます。 セルシン, ホリゾン, ジアバックス &1
	3085 4 (3L145)	クロバザム	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	3~5	① (特)	LC/MS/MS	(ng/mL)		デスメチルクロバザム も同時報告いたしま す。 マイスタン &1
	K598 8 (3L230)	レベチラセタム	血漿 (ヘパリン加) 0.3	G ↓ X	冷蔵 (21日)	3~5	① (特)	LC/MS/MS	12~46 ($\mu\text{g/mL}$)	次回投与直前 (Trough濃度)	イーケブラ &1
	K599 7 (3L225)	トピラマート	血漿 (ヘパリン加) 0.3	G ↓ X	冷蔵 (21日)	3~5	① (特)	LC/MS/MS	5~20 ($\mu\text{g/mL}$)	次回投与直前 (Trough濃度)	トピナ &1
	K218 9 (3L220)	ラモトリギン	血漿 0.3	G ↓ X	冷蔵	3~5	① (特)	LC/MS/MS	2.5~15 ($\mu\text{g/mL}$)	次回投与直前 (Trough濃度)	ラミクタール &1
	E948 5 (3L215)	ガバペンチン	血漿 0.3	G ↓ X	冷蔵	3~5	① (特)	LC/MS/MS	($\mu\text{g/mL}$)		ガバペン錠 &1
剤	3817 1 (3L950)	アセタゾラミド	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	3~9	① (特)	HPLC	($\mu\text{g/mL}$)		ダイアモックス &1
	A231 4 (3L248)	ラコサミド	血漿 0.3	G ↓ X	冷蔵 (28日)	3~5	① (特)	LC/MS/MS	($\mu\text{g/mL}$)	次回投与直前 (Trough濃度)	ビムバット &1

①: 特定薬剤治療管理料(115ページ参照)

① 投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

採血容器についての注意事項

血清分離剤入り容器の使用は避けてください。薬物検査において、測定値に影響を及ぼす場合があります。

採血時刻についての注意事項

1. TDM(血中薬物濃度モニター)における採血時間です。
2. 連続投与においては定常状態到達後、採血を行ってください。
3. 中毒時はPeak濃度も測定する必要があります。
4. 標準的な時間であり、患者状況にあわせて採血することをお薦めします。



薬物検査

精神神経用剤／強心剤

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位) (治療濃度範囲)	採血時刻	備考 (製品名、薬剤名等)
精神神経用剤	3807.2 (3L320)	緊急 リチウム	血清 0.5	02 ↓ X	冷蔵	2～4	① (特)	比色法	治療濃度範囲 0.3～1.2 (mEq/L)	最終投与後 12時間または 早朝投与前 (Trough濃度)	リーマス, リチオマール &③
	3818.0 (3L300)	ハロペリドール	血清 0.5	02 ↓ X	冷蔵	2～4	① (特)	金コロイド 凝集法	3～17 (ng/mL)	随時(ただし、 採血時刻を 一定とする)	ハロペリドール・プロ ムペリドールは、ほぼ 同等の交差反応を示す ため、双方を併用され ている 患者検体の測定値は、 各々の正確な血中濃度 値とは合致しませんの で、ご注意ください。 セレネース, ハロマンズ, リントン, ネオペリドール, ハロステン &③
	3843.2 (3L302)	プロムペリドール	血清 0.5	02 ↓ X	冷蔵	2～4	① (特)	金コロイド 凝集法	至適血中濃度 15以下 (ng/mL)		ハロペリドール・プロ ムペリドールは、ほぼ 同等の交差反応を示す ため 双方を併用されている 患者検体の測定値は、 各々の正確な血中濃度 値とは合致しませんの で、ご注意ください。 インプロメン, ルナブロン &③
強心剤	0068.6 (3L765)	緊急 ジゴキシン	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	1～2	① (特)	EIA	消失相濃度 0.8～2.0 (ng/mL)	投与後6時間～ 次回投与直前 (消失相)	ジゴキシン, ジコキシン

①: 特定薬剤治療管理料(115ページ参照)

① 投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

採血容器についての注意事項

血清分離剤入り容器の使用は避けてください。薬物検査において、測定値に影響を及ぼす場合があります。

採血時刻についての注意事項

1. TDM(血中薬物濃度モニター)における採血時間です。
2. 連続投与においては定常状態到達後、採血を行ってください。
3. 中毒時はPeak濃度も測定する必要があります。
4. 標準的な時間であり、患者状況にあわせて採血することをお薦めします。

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位) (治療濃度範囲)	採血時刻	備考 (製品名, 薬剤名等)
不 整 脈 用 剤	3834 2 (3L875)	緊急 リドカイン	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	2~4	① 特	EIA	1.2~5.0 ($\mu\text{g/mL}$)	静注: 投与後2時間 点滴静注: 6~12時間	キシロカイン &3
	3836 0 (3L865)	ジソピラミド	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	2~4	① 特	EIA	2.0~5.0 ($\mu\text{g/mL}$)		ノルベース, リスモダン, カフィール, リスラミド R &3
	(3L865)		血漿 0.3	G ↓ X							
	3837 9 (3L890)	緊急 プロカインアミド	血清 0.4	02 ↓ X	冷蔵	2~4	① 特	EIA	4.0~10.0 ($\mu\text{g/mL}$)	次回投与直前 (Trough濃度)	アミサリン &3
	(3L890)		血漿 0.4	G ↓ X							
	3822 5 (3L897)	プロパフェノン	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	3~5	① 特	LC/MS/MS	(ng/mL)		プロノン &1
	3841 4 (3L890)	メキシレチン	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	3~5	① 特	LC/MS/MS	0.5~2.0 ($\mu\text{g/mL}$)	経口: 次回投与直前 (Trough濃度) 静注: 随時	メキシチール &1
	3877 5 (3L896)	ピルシカイニド	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	3~5	① 特	LC/MS/MS	0.2~0.9 ($\mu\text{g/mL}$)	次回投与直前 (Trough濃度)	サンリズム &1
	A616 7 (3L896)		血漿 0.3	G ↓ X							
	8748 3 (3L898)	シベンゾリン	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	3~5	① 特	LC/MS/MS	Trough濃度 70~250 (ng/mL)	朝投与直前 (Trough濃度)	シベノール &1
	A541 0 (3L898)		血漿 0.3	G ↓ X							
	8756 4 (3L905)	フレカイニド	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	3~5	① 特	LC/MS/MS	200~1000 (ng/mL)	次回投与直前 (Trough濃度)	タンボコール &1
	A978 6 (3L905)		血漿 0.3	G ↓ X							

①: 特定薬剤治療管理料(126ページ参照)

薬物検査

不整脈用剤

	項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位) (治療濃度範囲)	採血時刻	備考 (製品名、薬剤名等)
不 整 脈 用 剤	4240 0 (3L899)	ピルメノール	血漿 1.3	G ↓ X	冷蔵	3~9	① 特	HPLC	400.0以上 (ng/mL)	随時	ピメノール & 1
	3839 7 (3L855)	アプリンジン	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	3~5	① 特	LC/MS/MS	0.25~1.25 (μg/mL)	経口 次回投与直前: (Trough濃度) 投与後 2~4時間 (Peak濃度) 静注: 次回投与直前 (Trough濃度)	アスペノン & 1
	(3L855)		血漿 0.3	G ↓ X							
	K588 9 (3L802)	ベプリジル	血漿 0.3	G ↓ X	冷蔵 (21日)	3~5	① 特	LC/MS/MS	250~800 (ng/mL)		ベプリコール & 1
	4227 5 (3L800)	アミオダロン	血漿 0.3	G ↓ X	冷蔵	3~5	① 特	LC/MS/MS	(ng/mL)	次回投与直前 (Trough濃度)	アミオダロン 有効血中濃度: 500~1000ng/mL (200mg/日投与, 定常状態, トラフ値) Desethylamiodarone /Amiodarone = 0.8 (定常状態)。 アンカロン & 1
	3840 5 (3L895)	プロプラノロール	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵			HPLC	50~100 (ng/mL)		インデラル & 1
	(3L895)		血漿 0.3	G ↓ X							

特: 特定薬剤治療管理料(115ページ参照)

① 投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

採血容器についての注意事項

血清分離剤入り容器の使用は避けてください。薬物検査において、測定値に影響を及ぼす場合があります。

採血時刻についての注意事項

1. TDM(血中薬物濃度モニター)における採血時間です。
2. 連続投与においては定常状態到達後、採血を行ってください。
3. 中毒時はPeak濃度も測定する必要があります。
4. 標準的な時間であり、患者状況にあわせて採血することをお勧めします。



項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位) (治療濃度範囲)	採血時刻	備考 (製品名、薬剤名等)
抗 生 物 質 製 剤	3851 3 (3M606) ゲンタマイシン	血清 0.4	02 ↓ X	凍結	2~4	① 特	EIA	Peak 15~20 Trough 1未満 ($\mu\text{g/mL}$)	点滴開始1時間後 (30分で投与した 場合、終了30分後) (Peak濃度) 投与前30分以内 (Trough濃度)	ゲンタシン, エルタシン, ルイネシン ＆③
	3853 1 (3M602) トブラマイシン	血清 0.4	02 ↓ X	凍結	2~4	① 特	EIA	Peak 15~20 Trough 1未満 ($\mu\text{g/mL}$)	点滴開始1時間後 (30分で投与した 場合、終了30分後) (Peak濃度) 投与前30分以内 (Trough濃度)	トブラシン ＆③
	3854 0 (3M601) アミカシン	血清 0.4	02 ↓ X	凍結	2~4	① 特	KIMS	Peak 50~60 Trough 4未満 ($\mu\text{g/mL}$)	点滴開始1時間後 (30分で投与した 場合、終了30分後) (Peak濃度) 投与前30分以内 (Trough濃度)	アルベカシンとの交差 反応があるのでご注意 ください。 アミカマイシン, ピクリン ＆③
	3830 6 (3M613) アルベカシン	血清 0.3	02 ↓ X	凍結 (21日)	2~4	① 特	ラテックス 凝集比濁法	Peak 15~20 Trough 1~2未満 ($\mu\text{g/mL}$)	点滴開始1時間後 (30分で投与した 場合、終了30分後) (Peak濃度) 投与前30分以内 (Trough濃度)	ハベカシン ＆③
	3859 5 (3M530) 緊急 バンコマイシン	血清 0.4	02 ↓ X	冷蔵	2~4	① 特	ラテックス 凝集比濁法	Trough 10~15 ($\mu\text{g/mL}$)	投与前30分以内 (Trough濃度)	塩酸バンコマイシン ＆③
	3846 9 (3M532) 緊急 テイコプラニン	血清 0.3	02 ↓ X	冷蔵	2~4	① 特	ラテックス 凝集比濁法	Trough 15~30 ($\mu\text{g/mL}$)	投与前30分以内 (Trough濃度)	タゴシッド ＆③
抗 真 菌 剤	K132 4 (3M698) ボリコナゾール	血漿 0.3	G ↓ X	冷蔵	3~5	① 特	LC/MS/MS	($\mu\text{g/mL}$)		ブイフェンド ＆①

①: 特定薬剤治療管理料(115ページ参照)

① 投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

採血容器についての注意事項

血清分離剤入り容器の使用は避けてください。薬物検査において、測定値に影響を及ぼす場合があります。

採血時刻についての注意事項

1. TDM(血中薬物濃度モニター)における採血時間です。
2. 連続投与においては定常状態到達後、採血を行ってください。
3. 中毒時はPeak濃度も測定する必要があります。
4. 標準的な時間であり、患者状況にあわせて採血することをお薦めします。

テイコプラニン検査について

医薬品添付文書には、「テイコプラニンのトラフレベルの血中濃度は、敗血症などの重症感染症においては確実な臨床効果を得るために $10\mu\text{g/mL}$ 以上を保つこと。ただし、トラフレベルの血中濃度が $60\mu\text{g/mL}$ 以上になった場合には腎障害、聴覚障害等の副作用の発現に注意すること。また、トラフレベルの血中濃度が $20\mu\text{g/mL}$ 以上で一過性に肝機能検査値が軽度上昇したとの報告がある。(医薬品添付文書・2003年1月改訂第8版より)」の内容が記載されております。



項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位) (治療濃度範囲)	採血時刻	備考 (製品名, 薬剤名等)
3872 0 (3M205)	緊急 サリチル酸	血清 0.4	02 ↓ X	冷蔵	2~4	① 特	酵素法	抗炎症作用として 100~250 ($\mu\text{g/mL}$)	次回投与直前 (Trough濃度)	アスピリン, バファリン ※3
3838 8 (3L005)	アセトアミノフェン	血清 0.4	02 ↓ X	冷蔵	2~8	② 180 ※4	EIA	中毒域 200.1以上(4時間) 100.1以上(8時間) 50.1以上(12時間) ($\mu\text{g/mL}$)		アセトアミノフェン, ピリナジン, ナバ ※3
A878 7 (3M805)	シクロスポリン	血液 0.7 (EDTA-2K加)	g1	凍結 (14日)	2~4	① 特	CLEIA	(ng/mL)	次回投与直前 (Trough濃度)	他の検査項目との同時 依頼はできませんので ご注意ください。 ネオラル, サンディ ミュン ※3
A879 6 (3M810)	タクロリムス	血液 0.7 (EDTA-2K加)	g1	凍結 (21日)	2~4	① 特	CLEIA	(ng/mL)		他の検査項目との同時 依頼はできませんので ご注意ください。 プログラフ, グラセプ ター ※3
A225 1 (3M815)	エベロリムス 3M815-0000-019-053	血液 1.0 (EDTA-2K加)	g1	凍結	2~4	① 特	ECLIA	免疫抑制剤として シクロスポリンと 併用した場合 Trough濃度 3.0~8 抗悪性腫瘍剤とし て使用した場合 Trough濃度 5~15 (ng/mL)	次回投与直前 (Trough濃度)	他の検査項目との同時 依頼はできませんので ご注意ください。 サーティカン アフィニートール ※3
B214 2 (3M725)	緊急 メトトレキサート	血清 0.7	02 ↓ X	冷蔵 (35日)	2~4	① 特	CLEIA	危険限界濃度 24時間値 10以上 48時間値 1以上 72時間値 0.1以上 ($\mu\text{mol/L}$)	メトトレキサート ロイコボリン 救援療法時 24, 48, 72時間	メソトレキサート ※3
B215 2 (3L725)		血漿 0.7	G ↓ X							
0067 7 (3M070)	緊急 テオフィリン	血清 0.2	02 ↓ X	冷蔵	2~4	① 特	EIA	10.0~20.0 ($\mu\text{g/mL}$)	☆下記参照	テオドル, テオロン, ユニフィル ※1
K597 9 (3M750)	イマチニブ	血漿 (EDTA-2Na加) 0.3	C ↓ X	冷蔵 (21日)	3~16	① 特	LC/MS/MS	(ng/mL)	服用後24時間 ±2時間後 (Trough濃度)	グリベック ※1

特: 特定薬剤治療管理料(115ページ参照)

- ① 投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。
- ② 同一患者につき1月以内に2回以上行った場合は、第1回目の測定を行ったときに1回に限り算定する。

採血容器についての注意事項

血清分離剤入り容器の使用は避けてください。薬物検査において、測定値に影響を及ぼす場合があります。

採血時刻についての注意事項

- TDM(血中薬物濃度モニター)における採血時間です。
- 連続投与においては定常状態到達後、採血を行ってください。
- 中毒時はPeak濃度も測定する必要があります。
- 標準的な時間であり、患者状況にあわせて採血することをお薦めします。

☆経口・静注

徐放性製剤では投与後4時間、裸錠では投与後2時間(Peak濃度)、次回投与直前(Trough濃度)静注: 負荷投与後30分、点滴開始後4~6、および12~18時間



特定薬剤治療管理料

薬 剤 名	検 査 項 目	特定薬剤治療管理料 (同一患者月1回) 1～3ヵ月 4ヵ月以降		加算点(初回月)	備 考
ジギタリス製剤 (心疾患)	ジゴキシシン	470点	235点	280点 (薬剤の投与を行っ た初回月のみ加算)	ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合所定点数 (470点)にかかわらず、1回に限り740点を算定する。
テオフィリン製剤 (気管支喘息、喘息性(様)気管 支炎、慢性気管支炎、肺気腫又 は未熟児無呼吸発作)	テオフィリン	470点	235点		
不整脈用剤 (不整脈)	プロカインアミド、N-アセチルプロカインアミド、 シンピラミド、キニジン、アプリンジン、リドカイン、 ビルシカイニド、プロパフェノン、メキシレチン、 フレカイニド、シベンゾリン、ビルメノール、ア ミオダロン、ベプリジル、ソタロール塩酸塩	470点	235点		
抗てんかん剤 (てんかん)	フェノバルビタール、ブリミドン、 フェニトイン、カルバマゼピン、エト スクシミド、バルプロ酸、ゾニサミ ド、トリメタジオン、クロナゼパム、 ニトラゼパム、ジアゼパム、クロバザ ム、ガバペンチン、アセタゾラミド、 ラモトリギン、レベチラセタム、トピ ラマート、ラコサミド、ペランパネル、 スチリベントール、ルフィナミド	470点	470点		てんかんの患者であって、2種類以上の抗てんかん 剤を投与されているものについて、同一暦月に血 中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し、その測 定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した 場合は、当該管理を行った月において、2回に限り 所定点数を算定できる。 てんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤 の注射等を行った場合は、所定点数(470点)にか かわらず、1回に限り740点を算定する。
アミノ配糖体抗生物質 [入院中]	ゲンタマイシン、トブラマイシン、 アミカシン、アルベカシン	470点	235点		
グリコペプチド系抗生物質 [入院中]	バンコマイシン、テイコブラニン	470点	235点		同一暦月にバイコマイシンの濃度を複数回測定し、 その測定結果に基づき、投与量を厳密に管理した 場合は、1回目に限り530点を所定点数に加算する。
トリアゾール系抗真菌剤 [入院中] (重症又は難治性真菌感染症又 は造血幹細胞移植)	ボリコナゾール	470点	235点		
免疫抑制剤 (臓器移植後)	シクロスポリン、タクロリムス、エ ベロリムス、ミコフェノール酸	470点	470点	2740点 (臓器移植を行った日の属す る月を含め3月に限り加算)	ミコフェノール酸モフェチルを投与している臓器移植後 の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与され ているものについて、同一暦月に複数の免疫抑制剤の濃度 を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密 に管理した場合は、6月に1回に限り250点を加算する。 エベロリムスを投与している臓器移植後の患者であって、 2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、 同一暦月に複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その結果 に基づき、個々の投与量を厳密に管理した場合は、初回 投与を行った日の属する月を含め3月に限り月1回、4月 目以降は4月に1回に限り250点を所定点数に加算する。
シクロスポリン(免疫制御剤) パーチェット病(活動性・難治性眼症状を有す るもの)、その他の非感染性ぶどう膜炎(既存治 療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活 動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎 に限る)、再生不良性貧血、赤芽球病、尋常性 乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾 癬、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎(既 存治療で十分な効果が得られない患者に限る)、 ネフローゼ症候群、川崎病の急性期	シクロスポリン	470点	470点	280点 (薬剤の投与を行っ た初回月のみ加算)	
ハロペリドール製剤 (統合失調症)	ハロペリドール	470点	235点		
プロムペリドール製剤 (統合失調症)	プロムペリドール				
リチウム製剤(躁うつ病)	リチウム	470点	235点		
バルプロ酸ナトリウム (躁うつ病又は躁病)	バルプロ酸	470点	470点		
カルバマゼピン (躁うつ病又は躁病)	カルバマゼピン				
サリチル酸系製剤 (若年性関節リウマチ、リウマ チ熱、関節リウマチ)	サリチル酸	470点	235点		
メトトレキサート(悪性腫瘍)	メトトレキサート	470点	235点		
タクロリムス水和物(免疫制御剤) (全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ルー プス腎炎、潰瘍性大腸炎又は間質性肺炎(多発性 筋炎又は皮膚筋炎に合併するものに限る))	タクロリムス	470点	470点		
イマチニブ	イマチニブ	470点	235点		
バルプロ酸ナトリウム (片頭痛)	バルプロ酸	470点	235点		
エベロリムス (結節性硬化症)	エベロリムス	470点	235点		
シロリムス製剤 (リンパ脈管筋腫症)	シロリムス	470点	235点		
スニチニブ(抗悪性腫瘍剤) (腎細胞癌)	スニチニブ	470点	235点		

細胞性免疫検査

細胞性免疫検査

	項目コード	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位)	備 考
細胞性免疫検査	3929 7 (51010)	曜日指定 PHAによるリンパ球 幼若化検査	血液 各5.0 (ヘパリン加)	PH9	室温	7~8	① 345 ※6	³ H- サイミジン 取り込み能	PHA+ 20500~56800 CONTROL 127~456 (cpm)	受託可能日は月~金曜日です。 指定の容器に採血し、よく混和 させ、室温保存(17℃~25℃) してください。なお、リンパ球 が少ない場合は多めに採血して ください。 検体は採取後、当日中にご提出 ください。 & 1
	3932 3 (51011)	曜日指定 Con-Aによるリンパ球 幼若化検査	同時 依頼の 場合は 8.0mL	PH9	室温	7~8	① 345 ※6	³ H- サイミジン 取り込み能	Con-A+ 20300~65700 CONTROL 127~456 (cpm)	
	3935 0 3936 9 3937 8 3938 7 3939 6 (51014)	曜日指定 薬剤によるリンパ球 刺激試験(DLST)	1 薬剤 血液12.0 (ヘパリン加)	PH9	室温	8~10	①	³ H- サイミジン 取り込み能	陰性	受託可能日は月~金曜日です。 1 薬剤増ごとに血液5.0mL 必要 となります。血液と同時にご依 頼薬剤もご提出ください。(原則 として皮内反応注射薬は検査で きません。) ヘパリンが起因薬剤と疑われる 場合は(PNK)の容器を使用して ください。 & 1

① Con-A, PHA又は薬疹の被疑医薬品によるものである場合算定できる。(リンパ球刺激試験(LST)1薬剤345点, 2薬剤425点, 3薬剤以上515点)

薬剤によるリンパ球刺激試験(DLST)の検体について

- 1 薬剤増ごとに血液5.0mL必要となります。
- 1 薬剤で500万個のリンパ球が必要となります。場合により検査に必要なリンパ球数が得られず、検査不能となる場合があります。
- 目安として白血球数が3,000/mm³以下の場合は倍量程度を採血しご提出ください。なお、詳しい白血球数とリンパ球%が判明している場合は、担当営業員までお問い合わせください。
- 2項目以上ご依頼の場合は、必ず優先順位をご指示ください。
- 血液と同時にご依頼薬剤もご提出ください。
錠剤(1錠)、カプセル(1カプセル)、粉末(1回投与量程度1包)、リキッドタイプの飲み薬(0.5mL程度)、注射薬(1バイアル[アンプル])。皮内反应用テストアンプルは微量のため検査できません。その他の薬剤以外で検査をご依頼の場合は、担当営業員までご連絡ください。
- ヘパリンが起因薬剤と疑われる場合は専用容器(PNK)を使用してください。
- 「麻薬及び向精神薬取締法」第一章第二条および「覚醒剤原料取締法」第三章および別表に掲げられている規制対象薬剤の受領はできません。
- ご依頼の際は、麻薬、覚醒剤原料が含まれていないことをご確認いただき、依頼書等へご署名をお願いいたします。ご署名のない場合は、受領致しかねます。



下記検査項目は東京セントラルパソロジーへ委託外注しております。

	項目コード (統一コード)	検査項目	提出材料	検体量	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法
病理組織検査	(7B010)	病理組織検査(1臓器)	ホルマリン固定組織		u5	室温	* 5~7	1臓器 につき 860 ※8	ヘマトキシリン・ エオジン染色 &T
	(7B010)	病理組織検査(2臓器)							
	(7B010)	病理組織検査(3臓器)							
病理標本作製		ブロック作製	ホルマリン固定組織	1×1×1mm以上 10×10×5mm以下	u5	室温	* 5~7		&T
		未染標本作製	パラフィンブロック			室温	* 5~7		
		染色標本作製	未染標本スライド	未染標本スライド2枚	u5	室温	* 5~7		
		酵素抗体染色 【ホルマリン固定組織】	ホルマリン固定組織 (パラフィンブロック・ 未染色標本スライドでも可)		u5	室温	* 5~8	①② 1臓器 につき 400 ※8	

①「酵素抗体染色」は、方法(蛍光抗体法又は酵素抗体法)又は試薬の種類にかかわらず、1臓器につき1回のみ算定する。

②確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合には、1,200点を所定点数に加算する。「確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者」とは、原発不明癌、原発性脳腫瘍悪性リンパ腫、悪性中皮腫、肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)、消化管間質腫瘍(GIST)、慢性腎炎、内分泌腫瘍、軟部腫瘍、皮膚の血管炎、水疱症(天疱瘡、類天疱瘡等)、悪性黒色腫、筋ジストロフィー又は筋炎が疑われる患者を指す。これらの疾患が疑われる患者であっても3種類以下の抗体で免疫染色を行った場合は、当該加算は算定できない。肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)が疑われる患者に対して加算を算定する場合は、腫瘍が未分化であった場合等HE染色では腺癌または扁平上皮癌の診断が困難な患者に限り算定する。既に悪性腫瘍遺伝子検査のEGFR遺伝子検査「ROS1融合遺伝子検査」又は「ALK融合遺伝子標本作製」を算定している場合には、当該加算は算定できない。

* 所要日数

- ・酵素抗体染色、脱脂処理、脱灰処理が必要な場合は所要日数が7~12日となります。
- ・切り出しが必要な臓器は所要日数が2~3週間となります。
- ・特殊なご依頼の場合、まとまった件数(処理内容により異なりますがおおむね30件以上)の場合は通常より所要日数が遅れますので、事前に営業員へお問い合わせください。

●病理組織検査におけるHE染色標本は委託先で5年間保管させていただきます。

●診断を実施する上で、HE染色および上記特殊染色以外に各種染色・酵素抗体染色等が必要となった場合は、追加オーダーさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

●ブロック作製をご依頼される際、摘出臓器のままご提出される場合は、その切り出し図と包埋の方向について依頼書に必ず記載してください。

●パラフィンブロックで染色標本作製をご依頼される場合は、未染標本作製の料金もご請求申し上げます。

●未染標本スライドで染色標本作製をご依頼される場合は、1染色2枚をご提出ください。

●病理診断は凍結組織ではできません。

病理専用容器(u5)容器について

病理専用容器(u5)に10%ホルマリン液を充填し、組織を固定してご提出ください。

依頼書およびラベルへの記入方法

病理組織検査をご依頼の際は専用の「病理検査依頼書」および容器をご使用ください。なお、依頼書およびラベルには下記事項を必ずご記入下さい。

■依頼書

- 1) 氏名、性別、年齢
- 2) 切除(採取)日、切除臓器名、切除数
- 3) 臨床診断名、臨床経過、治療、臨床検査諸事項
- 4) 前回実施の登録標本No.
- 5) 婦人科疾患、女性乳腺疾患などの場合は月経、妊娠の状態等をご記入ください。

■容器ラベルおよび凍結組織ラベル

- 1) 施設名、氏名、性別、年齢
- 2) 依頼書における容器No.とのひも付けのため、必ず容器No.(1, 2, 3……)をご記入ください。
また、併せて臓器名、切除数もご記入ください。
(容器No.と臓器名称が不明確な場合には、診断結果をお返しできないこともございます。)

検査結果の報告

■病理組織検査報告

「病理組織検査報告書」に病理組織学的診断および所見を記入しご報告いたします。

細胞診検査

細胞診検査

下記検査項目は東京セントラルパソロジーへ委託外注しております。

項目コード (統一コード)	検査項目	検査材料	検体量	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法
(7A020)	細胞診(婦人科)	膣内容・子宮腔部・子宮頸部・ 子宮内膜	塗抹標本 (湿固定)1枚	t	室温	4~7	1部位につき 150 ※8	パバニコロウ染色 &T
(7A010)	一般細胞診	喀痰	塗抹標本 (湿固定)2枚	t	室温	4~7	1部位につき 190 ※8	(喀痰) パバニコロウ染色 (その他) パバニコロウ染色と PAS染色またはギムザ染色 &T
		擦過物・洗浄液・針穿刺吸引液状 検体(胸水・腹水・尿・髄液・胆汁等)・ 捺印標本(リンパ節等)・圧挫標本・ その他	塗抹標本2枚 (湿固定1枚 乾燥固定1枚)					
(7A030)	細胞診 【喀痰集細胞法】 (Class判定)	喀痰 (3~5日蓄痰)	容器ごと提出	f	室温	4~7		パバニコロウ染色 &T

* 専門医の判定が必要な場合(原則的にASC-US, ClassⅢaまたは判定D以上)は通常日数より遅れる場合があります。

細胞診検査の注意事項

細胞診検査は、必ずしも確定診断ではありません。診断はご提出いただいた標本において下されたもので、病変全体を反映するものではないことを、あらかじめご承知おきください。組織診検査等による総合的な診断をお勧めします。

検査材料の提出方法

■各種材料の塗抹

塗抹の仕方は検査材料の種類、性状などに応じて異なります。下記の要領で塗抹してください。

【一般細胞診】

1) 喀痰

「小豆」大の喀痰を2枚のスライドガラスの間にはさみ、前後左右に押しつぶすように満遍なくのばしてください(すり合わせ法)。癌細胞は血痰部や不透明白濁部、ゼリー状粘液部に多く含まれるので、その部分を塗抹してください。

2) 擦過材料(気管支、消化管、胸膜・腹膜等)

ブラシ、綿棒等により病巣などを擦過しスライドガラスに塗抹してください。擦過物は非常に乾燥しやすいので塗抹固定を迅速に行うことが必要です。

3) 液状材料(尿、胸水、腹水、心嚢液、陰嚢水腫液、各種洗浄液等)

1500rpm5分間遠心後、沈渣をすり合わせ法または引きガラス法によって塗抹してください。血性検体の場合は有核成分が多いバフィーコート部分を塗抹してください。

4) 針穿刺吸引材料(乳腺、甲状腺、肺、リンパ節、前立腺、睾丸、軟部腫瘍、肝等)

穿刺針内に吸引された材料をスライドガラス中央に静かに吹きだし塗抹します。検体が微量なときはもう1枚のスライドガラスを合わせてからはがし2枚作製してください。多めに得られたときや多量の場合は引きガラス法で塗抹してください。

5) 捺印標本(各種固形腫瘍、リンパ節等)

メスやカミソリで切った新しい組織断面をスライドガラスに軽く捺印してください。

6) 圧挫標本(中枢神経腫瘍、甲状腺腫瘍等)

組織の小塊(直径1-2mm)を2枚のスライドガラスの間にはさみ、軽く押しつぶして組織が伸展したらスライドガラスをはなし、厚い方を湿固定、薄い方を乾燥固定してください。

〈注意〉 検体採取から塗抹固定までの許容時間(室温)

喀痰・胸水・腹水・心嚢液…12時間以内

尿・穿刺液・洗浄液・髄液…1時間以内

胆汁・脾液・十二指腸液…冰冷中の容器に採取し、1時間以内

擦過材料・捺印材料・圧挫材料…5秒以内

【婦人科細胞診】

1) 婦人科材料

乾燥しやすいので塗抹後直ちに湿固定してください。

■標本の固定

固定は細胞の変性・融解などの変化を停止させる作業ですので、塗抹後直ちに固定する必要があります。湿固定はパバニコロウ染色、PAS染色などのための固定法で、乾燥固定はギムザ染色などのための固定法です。

固定の良否は採取部位・方法とともに細胞診判定内容を左右する重要な因子の一つです。迅速な固定をお願いいたします。

1) 湿固定【婦人科細胞診・一般細胞診】

塗抹したスライドガラスを95%エタノールに30分以上浸漬して固定してください。湿固定にはサイトタック等を用いたコーティング固定法もあります。コーティング固定剤を使用する場合は、ムラが生じないよう固定液を塗抹全面に十分に噴霧または滴下してください。



2) 乾燥固定【一般細胞診】

塗抹後直ちに、塗抹面を扇風機や冷風ドライヤーなどで急速に乾燥させます。自然乾燥は乾燥むらを生じるので不十分です。

コーティング固定剤の使用法

噴霧式

滴下式



依頼書、スライド ガラスおよびオブジェクトケースへの記入方法

■依頼書

細胞診検査は各種の臨床情報を参考にして行う形態学的検査です。細胞診検査のご依頼にあたっては専用の細胞診検査依頼書に下記の内容を記載してください。細胞診の判定内容を左右する因子ですので記載もれがないようお願いいたします。

a) 氏名、性別、年齢、科名等

e) 婦人科材料や乳腺材料の場合月経等諸事項

b) 検査材料、採取方法

f) 前回の登録標本番号

c) 臨床診断、臨床経過、検査、治療諸事項

g) ご提出のスライドガラス枚数

d) 病変の大きさ、性状

■スライドガラス

a) スリガラス部に氏名をご記入ください。

b) 乾燥固定の場合は「乾燥」または「ドライ」とご記入ください。

■オブジェクトケース

a) 氏名、性別、年齢 b) 標本枚数(湿固定枚数と乾燥固定枚数)

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	備考
AIRS® ・ AICS®	5521 7 男性AIRS (認知機能評価あり)	速やかに 冷却 血漿 0.5	C ↓ X	凍結 (7日)	9~12		LC/MS	重注 50歳以上の方、かつ AILS (認知機能低下) を選択した方が受診する際には、本コードをご選択ください。 なお、49歳以下の方は、AILS (認知機能低下) の検査対象外 (除外基準) となりますので、別コード (認知機能評価なし) をご選択ください。 検体取扱いは次ページをご参照ください。 本項目は、血液中のアミノ酸濃度から、委託先 (味の素株式会社) にてデータ解析することにより、AICS® 及び AILS® を報告する検査です。なお、本検査結果はその他の検査結果を考慮して総合的に判断してください。
	5523 5 女性AIRS (認知機能評価あり)							
	5519 0 男性AIRS (認知機能評価なし)							
	5522 6 女性AIRS (認知機能評価なし)							
	5957 4 男性AICS (5種)							
	5958 3 女性AICS (6種)							

アミノインデックス® とは

アミノインデックス® は、血液中の各種アミノ酸濃度のバランスから、現在の健康状態や病気の可能性を明らかにする検査です。アミノインデックス® の解析は、味の素株式会社に委託して解析されています。

AIRS® (AminoIndex® Risk Screening) とは

アミノインデックス® を用いて1回の採血で、血液中のアミノ酸のバランスから、現在・将来のさまざまな疾患リスクを一度に評価する検査です。

AICS® (AminoIndex® Cancer Screening) とは

アミノインデックス® を用いて、現在がんである可能性を評価する検査です。

男性AICS 5種: 胃がん, 肺がん, 大腸がん, 膵臓がん, 前立腺がん

女性AICS 6種: 胃がん, 肺がん, 大腸がん, 膵臓がん, 乳がん, 子宮がん (子宮頸がん, 子宮体がん)・卵巣がん

AILS® (AminoIndex® LifeStyle diseases) とは


血液中のアミノ酸濃度バランスから10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク、4年以内に糖尿病を発症するリスク、血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ、および現在認知症機能が低下している可能性を評価し、検査結果に基づくI~IV, およびI*~IV*のタイプを報告します。また、このタイプをもとに、生活改善評価情報が提供できます。なお、AILS® 単独での受託はできません。

受託における注意点

AIRS® は下記年齢の日本人 (妊娠されている方を除く) を対象として開発された検査です。これらの方以外は評価対象外となります。


検査項目	評価対象	対象年齢
男性	AICS (5種)	胃がん, 肺がん, 大腸がん, 膵臓がん 前立腺がん
	AILS (脳心疾患リスク)	10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク
	AILS (糖尿病リスク)	4年以内に糖尿病を発症するリスク
	AILS (アミノ酸レベル)	血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ
	AILS (認知機能低下)	現在認知機能が低下している可能性 ※ AILS (認知機能低下) については49歳以下の方は選択できません。
女性	AICS (6種)	胃がん, 肺がん, 大腸がん, 膵臓がん, 乳がん 子宮がん・卵巣がん
	AILS (脳心疾患リスク)	10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク
	AILS (糖尿病リスク)	4年以内に糖尿病を発症するリスク
	AILS (アミノ酸レベル)	血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ
	AILS (認知機能低下)	現在認知機能が低下している可能性 ※ AILS (認知機能低下) については49歳以下の方は選択できません。

- ※ 脳卒中の方、心筋梗塞の方、糖尿病の方、認知症の方、軽度認知障害の方 (いずれも医療機関で診断を受けた方、あるいは治療中の方) の場合、その疾病・所見に関するAILS値や生活習慣改善タイプは出力されますが、いずれも評価対象外となります。
- ・ 妊娠されている方、授乳中の方、がん患者 (治療を含む) の方、先天性代謝異常の方、透析患者の方は、検査結果に影響があるため、検査の実施はご遠慮ください。
- ・ 検査前8時間以内に、水以外 (食事、サプリメント等) は摂取せず、午前中に採血してください。
(検査前日高タンパク質の食事も避けてください) また、当日朝の運動はお控えください。
- ・ 薬剤による本検査への影響はわかっておりません。
- ・ 他項目との重複依頼は避けてください。
- ・ 強溶血検体や、血漿 (EDTA-2Na) 以外の材料での、受託はできません。
- ・ ご依頼の際は性別・年齢を必ず明記してください。



検体のお取り扱いについて

1. EDTA-2Na入り採血チューブにて血液約5mLを採取してください
2. 採血直後、血液を2〜3回軽く転倒混和してください(ローラでの混和は行わないでください)
3. 混和後直ちに(1分以内)採血チューブを氷水中(血液の液面まで氷水につかる状態)で冷却(15分以上、遠心操作まで冷却)してください
4. 採血から8時間以内に冷却条件で遠心分離(4℃、3,000回転、15分)または通常遠心分離(3,000回転、15分、ローターが昇温してないこと)してください
5. 遠心後、直ちに上清の血漿を血液との界面に触れないように血漿上清の中央部から採取し、分注してください
6. 分注後、血漿を4時間以内に凍結保存してください



検査項目	基準値	緊急報告検査値範囲
免疫学的検査		
直接クームス試験	陰性	陽性(Baby)
生化学的検査		
アミラーゼ(AMY) (血清)	44~132	1000U/L以上
AST(GOT)	10~40	500U/L以上
ALT(GPT)	5~40	500U/L以上
LD(LDH)	124~222	1000U/L以上
尿素窒素(UN) (血清)	8.0~22.0	80.0mg/dL以上
グルコース	70~109	(空腹時)50mg/dL以下, 500mg/dL以上
Na(ナトリウム) (血清)	136~147	110mEq/L以下, 170mEq/L以上
K(カリウム) (血清)	3.6~5.0	2.5mEq/L以下, 6.5mEq/L以上
Ca(カルシウム) (血清)	8.5~10.2	6.0mg/dL以下, 14.0mg/dL以上
総ビリルビン(T-Bil)	0.3~1.2	12.0mg/dL以上
血液学的検査		
白血球数(WBC)	M 3900~9800 F 3500~9100	1000/ μ L以下, 25000/ μ L以上
血色素量(Hb)	M 13.5~17.6 F 11.3~15.2	5.0g/dL以下
血小板数	M 13.1~36.2 F 13.0~36.9	3.0×10^4 / μ L以下, 100×10^4 / μ L以上
血液像	白血球分類 Stab 0~6 Seg 32~73 Neut 41.2~75.4 Eosino 0.7~8.9 Baso 0.2~1.8 Mono 4.6~11.8 Lympho 16.5~47.8 赤血球形態 大小不同(-), 多染性(-), 奇形(-), 有核(-)	芽球出現時
プロトロンビン時間(PT)	INR:設定せず	INR 4.00以上
薬物検査		
フェノバルビタール	10~40	60 μ g/mL以上
プリミドン	5.0~12.0	15 μ g/mL以上
フェニトイン	10.0~20.0	30 μ g/mL以上
カルバマゼピン	4~12	12 μ g/mL以上
エトスクシミド	40.0~100.0	120 μ g/mL以上
バルプロ酸	50~100	150 μ g/mL以上
リチウム	治療濃度範囲 0.3~1.2	2.0mEq/L以上
ジゴキシン	消失相濃度0.8~2.0	2.5ng/mL以上
リドカイン	1.2~5.0	6.0 μ g/mL以上
プロカインアミド	4.0~10.0	12 μ g/mL以上
バンコマイシン	Trough 10~15	60 μ g/mL以上
テイコブラニン	Trough 15~30	(Trough濃度) 60 μ g/mL以上
サリチル酸	抗炎症作用として 100~250	300 μ g/mL以上
メトトレキサート	危険限界濃度 24時間値 10以上 48時間値 1以上 72時間値 0.1以上	48時間後 1.0 μ mol/L以上
テオフィリン	10.0~20.0	25 μ g/mL以上
微生物学的検査		
一般細菌, 培養同定		2類・3類・4類感染症菌が分離された場合, VRE・VRSAが検出された場合, 髄液・血液 などの無菌材料から菌が検出された場合
抗酸菌 塗抹鏡検		抗酸菌塗抹鏡検で抗酸菌が認められた場合
抗酸菌 分離培養		抗酸菌分離培養で抗酸菌が検出された場合
結核菌群核酸同定, MAC核酸同定		結核菌群核酸同定, MAC核酸同定が陽性の 場合

検査方法の概略

ウェスタンブロット法(Western blot)

目的とする蛋白質を電気泳動により分画し、電気的にニトロセルロース膜に転写して、目的の蛋白質に対する抗体を反応させた後、酵素で標識した抗体を2次反応させ、目的の蛋白質を検出する方法。イムノブロット法とも呼ばれる。

液相(核酸)ハイブリダイゼーション

液相中でrRNAを遊離させ、化学発光物質で標識したDNAプローブを用いてハイブリダイゼーションを行い、ハイブリッドを分離剤に吸着させた後、化学発光により検出する方法。

オクタロニー法(Ouchterlony method)

平板内二重免疫拡散法

平板内二重免疫拡散法と呼ばれるゲル内拡散法の1つ。ゲル内で抗体と抗原を拡散させ、抗原抗体反応により形成された沈降線の数や反応性の有無から、抗原と抗体の反応を確認する方法。

凝固時間法

測定対象となる因子の欠乏血漿とトロンボプラスチン、アクチン、塩化カルシウムを加え、凝固するまでの時間を測定する方法。

金コロイド法

金コロイド標識抗体を反応させ、抗原抗体反応により金コロイド粒子が凝集する色調変化を光学的に測定する方法。

原子吸光分析法

元素試料を化学炎中や加熱グラファイト管などで元素の原子化を行い、この原子蒸気に元素固有の共鳴線をあてると原子蒸気中の原子の数に応じて吸収されることを利用して、吸光度から元素量を定量する方法。

酵素抗体法

目的とする抗原に対して、酵素で標識した抗体を用いて抗原抗体反応を行い、発色基質を加えて酵素活性を測定する方法。

酵素で標識した抗体を直接反応させる直接法と、抗原に対して未標識の抗体を反応させた後、酵素で標識した抗体を2次反応させる間接法がある。

酵素法

測定原理は比色法と同様で、測定物質を酵素を用いて特異的に測定する方法。

サザンブロットハイブリダイゼーション(Southern blot hybridization)

制限酵素で消化したDNAを電気泳動により分画し、1本鎖DNAに変性後、毛細管現象を利用してナイロンメンブレンに転写して、標的プローブとハイブリダイゼーションを行い、目的の遺伝子を検出する方法。DNAの量的、質的変化の異常を解析する場合に用いられる。

次世代シーケンス(NGS)法

次世代シーケンサーを用いて、膨大な数のDNA断片の塩基配列の決定を、同時並行的に行う方法。

ダイレクトシーケンス法

PCR法で増幅したDNAを鋳型として直接塩基配列を決定する方法。

超遠心法

超遠心機を用いて蛋白質の比重の差により分離し測定する方法。

電気泳動法

荷電粒子の浮遊する電解質溶液に通電すると、粒子は各粒子の荷電と逆の極側に移動する現象を利用し、移動度から目的の物質を測定する方法。

水溶液支持体にはセルロースアセテート膜、アガロースゲル、ポリアクリルアミドゲルなどが用いられる。

電極法

電極と溶液界面における電荷移行反応を利用した方法。

イオン選択電極は特定のイオンに応答し、イオンの活量の対数に比例して生じる電位差からイオンの濃度を測定する。

等温核酸増幅法

PCR法とは異なり、鎖置換型DNA合成酵素などを用いて、核酸を一定温度で増幅する方法。

ネフェロメトリー(Nephelometry)

抗原抗体反応による混濁物に光を照射させ、光の散乱強度を測定する方法。

発色性合成基質法

ヘパリンを加えてAT-Ⅲ-ヘパリン複合体を形成させ、そのトロンビン不活化能をトロンビンに対する発色性合成基質を用いて測定する方法。

比色法(Colorimetry)

測定物質を着色物質に変換後、可視部波長を照射して吸光度を測定して色調を標準液と比較する方法。

フローサイトメトリー(Flow cytometry)

蛍光色素で標識したモノクローナル抗体で染色した細胞を高速度で流しながらレーザー光を照射し、前方散乱光(細胞の大きさ)や90°散乱光(細胞の内部構造)と蛍光強度(細胞表面の対応抗原)から個々の細胞を解析する方法。

2種類の蛍光色素を用いて二重染色を行い解析する場合はTwo-colorフローサイトメトリーと呼ばれる。

メチレーションPCR

非メチル化シトシンがバイサルファイト処理でウラシルに変換されることを利用し、バイサルファイト処理後のメチル化シトシンと非メチル化シトシンの塩基配列の違いから対象領域のメチル化をPCRで確認する方法。

ラインブロット法(Line immunoassay)

抗原を機械的にメンブレン上に点着し、抗原に対する特異的抗体を反応させた後、酵素で標識した抗体を、2次反応させ、抗体の検出を行う方法。

リアルタイムPCR
PCR法を基本原理とする核酸増幅法の一つであり、分解により蛍光を発するオリゴヌクレオチドを利用することにより、PCRサイクルごとに蛍光シグナルを確認することでリアルタイムにターゲット核酸の定量が可能となる測定方法。
CF(Complement fixation)
補体結合反応
補体が抗原抗体複合体と結合することと溶血反応を引き起こすことを利用した方法。 赤血球に溶血素を結合した感作赤血球は補体が結合すると溶血を起こすが、抗原抗体複合体が存在すると補体が消費され溶血が阻止されることから、溶血の程度から抗体の存在を判定する。
CLEIA(Chemiluminescent enzyme immunoassay)
化学発光酵素免疫測定法
固相化した抗体に対して抗原を反応させた後、酵素標識した抗体を抗原に2次反応させ、化学発光基質を加えて発光強度を測定する方法。
CLIA(Chemiluminescent immunoassay)
化学発光免疫測定法
固相化した抗体に対して抗原を反応させた後、化学発光性物質で標識した抗体を抗原に2次反応させ、化学発光性物質の発光強度を測定する方法。
ECLIA(Electro chemiluminescence immunoassay)
電気化学発光免疫測定法
抗体を結合したビーズを用いて抗原と反応させた後、ルテニウムビリジン錯体で標識した抗体を抗原に2次反応させ、電気化学反応によりルテニウムビリジン錯体の発光強度を測定する方法。
EIA(Enzyme immunoassay)
酵素免疫測定法
測定原理はRIAと同様で、標識物質に酵素で標識した抗原または抗体を用いて抗原抗体反応を行い、発色基質を加えて酵素活性を測定する方法。
ELISA(Enzyme-Linked immunosorbent assay)
酵素免疫測定法
固相化した抗体に対して抗原を反応させた後、酵素標識した抗体を抗原に2次反応させ、発色基質を加えて酵素活性を測定する方法。
ELISPOT(Enzyme-Linked ImmunoSpot)
抗体を固相化したプレートに、分離細胞と特異抗原を加え培養し、細胞から産生されたタンパク質を発色基質と反応させ、スポットを得る方法。
FA(Fluorescent antibody method)
蛍光抗体法
IFA(Indirect Fluorescent antibody method)
間接蛍光抗体法
目的とする抗原に対して、蛍光色素で標識した抗体を用いて抗原抗体反応を行い、蛍光顕微鏡下で蛍光強度を測定する方法。 蛍光色素で標識した抗体を直接反応させる直接法と、抗原に対して抗体を反応させた後、蛍光色素で標識した抗体を2次反応させる間接法がある。
FEIA(Fluorescence enzyme immunoassay)
蛍光酵素免疫測定法
EIAの1つで、標識物質に酵素で標識した抗原または抗体を用いて抗原抗体反応を行い、蛍光基質を加えて蛍光強度を測定する方法。

FIA(Fluorescence Immunoassay)
蛍光免疫測定法
固相化した抗原に対して標識物質を反応させた後、蛍光物質で標識した抗体または抗原を2次反応させ、蛍光強度を測定する方法。
FISH(Fluorescence in situ hybridization)
蛍光 in situ ハイブリダイゼーション
蛍光色素で標識したプローブを用いて標的DNAとハイブリダイゼーションを行い、特定の波長で発色させた蛍光部位を染色体上のシグナルとして蛍光顕微鏡下で検出する方法。 蛍光色素で標識したプローブと標的DNAを直接結合させる直接法と、標識物質で標識したプローブと標的DNAを結合させた後に、標識プローブと蛍光物質を結合させて発色させる間接法がある。
HA(Hemagglutination)
赤血球凝集反応
赤血球の表面抗原と抗体を反応させ、抗原抗体反応による凝集の有無により抗体の存在を判定する方法。
HI(Hemagglutination inhibition)
赤血球凝集抑制反応
ウイルスのもつ赤血球凝集能が、ウイルスに対する抗体により抑制されることを利用した方法。抗原抗体複合体と赤血球を反応させ、凝集抑制の有無によりウイルスに対する抗体の存在を判定する。
HPLC(High performance liquid chromatography)
高速液体クロマトグラフィー
移動相に液体を用いる液体クロマトグラフィーで、高密度充填カラムと高圧ポンプを用いて高速かつ高精度に分離する方法。
IC(Immuno-Chromatography)
イムノクロマト法
検体中の抗原または抗体と、金コロイド粒子などで標識させた標識抗体または標識抗原が、メンブレンフィルター上を免疫複合体を形成しながら移動し、メンブレンフィルター上にあらかじめ固定化された抗体または抗原で免疫複合体が補足され、呈色し、目視などで結果判定する検出法。
IRMA(Immuno radio metric assay)
免疫放射定量法
RIAの1つで、固相化した抗体に対して抗原を反応させた後、放射性同位元素(RI)で標識した抗体を抗原に2次反応させる方法。 固相化抗体と標識抗体が抗原を挟む形で結合することから、サンドイッチ法とも呼ばれる。
LA(Latex agglutination)
ラテックス凝集反応
抗原または抗体を吸着(結合)させたラテックス粒子(感作ラテックス粒子)を用いて抗原抗体反応を行い、抗原抗体反応による凝集の有無により抗体または抗原の存在を判定する方法。
LA(Latex agglutination immunoassay)
ラテックス凝集比濁法
抗原または抗体を吸着(結合)させたラテックス粒子を用いて抗原抗体反応を行い、抗原抗体反応による凝集の濁度を、光を照射させて透過率または光の散乱強度から測定する方法。
LAMP(Loop-Mediated Isothermal Amplification)
標的遺伝子の配列から6つの領域に対して4種類のプライマーを設定し、鎖置換反応を利用して一定温度で反応させる方法。

検査方法の概略

LC/MS(Liquid chromatography/mass spectrometry)

液体クロマトグラフィー質量分析法

目的物質を高速度・高精度に分離するHPLCに、MS(質量分析)を検出器として結合させ、検出選択性・定性機能を更に向上させた方法。

LC/MS/MS (Liquid chromatography tandem mass spectrometry)

液体クロマトグラフィータンデム四重極型質量分析法

液体クロマトグラフで親和性の差を利用して目的とする物質の成分を分解し、質量分析計でさらに質量ごとに分離して特定の質量イオンを解離・フラグメント化させ、それらのイオンを検出する方法。

LPIA(Latex photometric immunoassay)

ラテックス近赤外免疫比濁法

抗原または抗体を結合させたラテックス粒子を用いて抗原抗体反応を行い、抗原抗体反応による凝集の濁度を、近赤外光を照射させて透過率を測定する方法。

MALDI-TOF-MS

レーザー光を吸収するマトリックスと分析物の混合物にレーザー照射し、タンパク質を分解せずにイオン化する方法(MALDI)と、生成されたイオンの質量電荷比によりイオンの飛行時間が異なることを利用して質量分析を行う方法(TOF-MS)を組み合わせた方法。

MALDI :Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization

マトリックス支援レーザー脱離イオン化

TOF-MS:Time-of-Flight Mass Spectrometry

飛行時間型質量分析法

MLPA(Multiplex ligation-dependent probe amplification)

共通PCRプライマー配列を融合させた特異プローブを標識領域にハイブリダイズ後、PCRを行い、その増幅産物の量的変化について、比較的大規模なゲノム欠失もしくは重複を検出する方法。

NT(Neutralization test)

中和反応

ウイルスがウイルスに対する抗体との反応により感染性が失われる(中和)ことを利用した方法。

ウイルスと抗体を反応させた後、ウイルスに感受性のある培養細胞に接種し、細胞変性効果(cytopathogenic effect:CPE)の有無により中和抗体の存在を判定する。

PA(Particle agglutination)

粒子凝集反応

抗原または抗体を吸着(結合)させたゼラチン粒子など(感作粒子)を用いて抗原抗体反応を行い、抗原抗体反応による凝集の有無により抗体または抗原の存在を判定する方法。

PCR(Polymerase chain reaction)

DNAが加熱により2本鎖から1本鎖に解離し、冷却することで2本鎖に戻ることを利用し、1本鎖DNAを鋳型として目的のプライマーを結合させ、DNAポリメラーゼの転写反応によりDNA合成を行うことを繰り返し、目的とするDNA領域を指数関数的に増幅させる方法。

PHA(Passive hemagglutination)

受身赤血球凝集反応

赤血球の表面に抗原を吸着(結合)させた感作赤血球を用いて抗体を反応させ、抗原抗体反応による凝集の有無により抗体の存在を判定する方法。

RIA(Radio immunoassay)

放射性免疫測定法

抗体に対して放射性同位元素(RI)で標識した抗原と検体中の抗原を競合的に抗原抗体反応を行い、抗体と結合した標識抗原(結合型:Bound)と抗体と結合していない標識抗原(遊離型:Free)を分離し、その割合を放射活性から抗原の濃度として測定する方法。

結合型と遊離型の分離方法(B/F分離)として、抗体を固相化しておく固相法、抗原抗体複合体に第2抗体を結合させて沈澱させる2抗体法、抗原抗体複合体を硫酸アンモニウム(硫酸)で沈澱させる硫酸塩析法、抗原抗体複合体を沈澱試薬で沈澱させるPEG法などがある。

RRA(Radio receptor assay)

ラジオレセプターアッセイ

測定原理はRIAと同様で、抗体の代わりにレセプター(受容体)を用いて、その反応性から生物活性を求める方法。

RT-PCR(Reverse transcriptase-polymerase chain reaction)

RNAが増幅対象の場合に、RNAを鋳型として逆転写酵素(reverse transcriptase:RT)により相補的なcDNAを合成してPCRを行う方法。

TIA(Turbidimetric immunoassay)

免疫比濁法

抗原抗体反応による混濁物に光を照射させ、透過率を測定する方法。

TMA(Transcription mediated amplification)

2種類の酵素と2種類のプライマーおよび基質を用いてRNAを増幅する方法。

抽出したRNAから逆転写酵素により2本鎖DNAを合成し、この2本鎖DNAを鋳型としてRNAポリメラーゼの転写反応によりRNAを合成することを繰り返し、目的とするRNA領域を増幅させる。

TRC (Transcription Reverse Transcription Concerted reaction)

インターカレーター性蛍光色素が標識されたDNAプローブと一定温度RNA増幅法を組み合わせ、RNAを1ステップで増幅・リアルタイム検出する方法。

UV法(Ultraviolet absorption spectrophotometry)

紫外外部吸光度分析

測定原理は比色法と同様で、紫外外部波長を用いて測定する方法。

通常は200~400nmの近紫外部の波長が使われる。

³H-サイミジン取り込み能(³H-TdR uptake)

リンパ球が非自己抗原による刺激に反応して芽球化する現象を利用した方法。

リンパ球に刺激物質と³H-サイミジンを加えて培養し、DNA合成により³H-サイミジンが細胞に取り込まれる量を放射活性として測定する。刺激物質にはPHA、Con-A、薬剤などが用いられる。

検査項目

測定参考文献

内分泌学的検査

甲状腺刺激ホルモン(TSH) [CLEIA]・IFCC	北川 亘, 他: 医学と薬学78(1): 59~70, 2021.
成長ホルモン(GH)	小山 沙世, 他: 医学と薬学68(5): 899~910, 2012.
黄体形成ホルモン(LH)	皆方 良介, 他: 臨床検査機器・試薬22(5): 429~438, 1999.
卵巣刺激ホルモン(FSH)	皆方 良介, 他: 臨床検査機器・試薬22(5): 429~438, 1999.
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)	古屋 実, 他: 医学と薬学74(7): 819~830, 2017.
プロラクチン	古屋 実, 他: 医学と薬学74(7): 819~830, 2017.
抗利尿ホルモン(AVP)	田中 誠仁, 他: 医学と薬学72(8): 1379~1388, 2015.
遊離トリヨードサイロニン(Free T ₃)	矢野 美沙紀, 他: 医学と薬学77(5): 793~804, 2020.
遊離サイロキシニン(Free T ₄)	矢野 美沙紀, 他: 医学と薬学77(5): 793~804, 2020.
サイログロブリン	北村 由之, 他: 医学と薬学77(12): 1683~1690, 2020.
抗サイログロブリン抗体	矢野 美沙紀, 他: 医学と薬学77(5): 793~804, 2020.
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体) [CLEIA]	矢野 美沙紀, 他: 医学と薬学77(5): 793~804, 2020.
TSHレセプター抗体 [CLEIA]	矢野 美沙紀, 他: 医学と薬学77(5): 793~804, 2020.
甲状腺刺激抗体(TSAb)	田上 哲也, 他: 糖尿病・内分泌代謝科53(5): 479~486, 2021.
副甲状腺ホルモン(PTH)-インタクト	猪俣 啓子, 他: 医学と薬学74(1): 45~54, 2017.
副甲状腺ホルモン(Whole PTH)	森山 和重, 他: 医学と薬学70(4): 829~836, 2013.
副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)	福本 誠二, 他: ホルモンと臨床40(12): 1309~1314, 1992.
カルシトニン	北川 亘, 他: 医学と薬学72(1): 97~108, 2015.
オステオカルシン	吉村 典子, 他: Osteoporosis Japan 13(3): 759~765, 2005.
カテコールアミン総	Honda S et al: Analytica Chimica Acta 149: 297~303, 1983.
カテコールアミン3分画(血漿)	辻 潮, 他: 臨床検査機器・試薬11(4): 635~641, 1988.
カテコールアミン3分画(尿)	Honda S et al: Analytica Chimica Acta 149: 297~303, 1983.
ドーパミン総	守 和子: 産業医学17: 170~171, 1975.
L-ドーパ	守 和子: 産業医学17: 170~171, 1975.
VMA	Gironi A et al: Clinical Chemistry 34(12): 2504~2506, 1988.
HVA	Gironi A et al: Clinical Chemistry 34(12): 2504~2506, 1988.
メタネフリン・ノルメタネフリン分画	水村千絵, 他: 医学検査 68(2): 276~280, 2019. Xie Z, et al: J Chromatogr B Analyt. Technol Biomed Life Sci 1099: 83~91, 2018.
セロトニン(血液)	Anderson GM et al: Gastroenterology 88: 86~89, 1985.
セロトニン(血漿)	Nebinger P et al: Journal of Chromatography 427: 326~330, 1988.
5-HIAA(血漿)	小島 司, 他: 臨床化学21(2): 119~126, 1992.
5-HIAA(尿)	Mailman RB et al: Clinical Chemistry 31(11): 1849~1854, 1985.
血中11-OHCS	宇田川 美佐子, 他: 臨床化学5(3): 321~325, 1977.
コルチゾール	古屋 実, 他: 医学と薬学74(7): 819~830, 2017.
アルドステロン [CLEIA]	佐藤 文彦, 他: 医学と薬学76(12): 1819~1826, 2019.
デヒドロエピアンドロステロンサルフェート(DHEA-S)	増戸 梨恵, 他: 医学と薬学56(3): 443~448, 2006.
エストラジオール(E ₂)	古屋 実, 他: 医学と薬学74(7): 819~830, 2017.
プロゲステロン	古屋 実, 他: 医学と薬学74(7): 819~830, 2017.
プレグナンジオール	平井 利生, 他: 日本臨床検査自動化学会誌JJCLA 9(2): 564~567, 1984.
プレグナントリオール	平井 利生, 他: 日本臨床検査自動化学会誌JJCLA 9(2): 564~567, 1984.
テストステロン	古屋 実, 他: 医学と薬学74(7): 819~830, 2017.
絨毛性ゴナドトロピン(HCG)	高橋 亘 他: 医学検査57(4), 404, 2008.
HCG-βサブユニット	Cole LA: Clinical Chemistry 43(12): 2233~2243, 1997.

検査項目

測定参考文献

内分泌学的検査

子宮頸管粘液中 顆粒球エラスターゼ	北村 光, 他: 臨床検査機器・試薬21(4): 357~361, 1998.
ヒト癌胎児性フィブロネクチン	Lockwood CJ et al: The New England Journal of Medicine 325(10): 669~674, 1991.
インスリン	唐澤 美佳, 他: 医療と検査機器・試薬29(5): 479~484, 2006.
C-ペプチド(CPR)	北村 忠弘, 他: 医学と薬学82(4): 229~239, 2025.
膵グルカゴン	稲垣 貴之, 他: 医学と薬学72(3): 491~497, 2015.
抗GAD抗体	及川 洋一, 他: 医学と薬学72(9): 1551~1560, 2015.
抗IA-2抗体	川崎 英二, 他: 医学と薬学66(2): 345~352, 2011.
インスリン抗体	内湯 安子, 他: 医学と薬学65(4): 525~530, 2011.
ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)	松岡 泰弘, 他: 医療と検査機器・試薬33(4): 535~540, 2010.
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)	伊藤 洋子, 他: 医学と薬学64(6): 931~939, 2010.
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)	古屋 実, 他: 医学と薬学74(5): 607~617, 2017.
レニン活性(PRA)(EIA)	宇津 貴央, 他: 医学と薬学73(3): 311~321, 2016.
レニン濃度(ARC)(CLEIA)	佐藤 文俊, 他: 医学と薬学76(12): 1827~1832, 2019.
ペントラキシン3(PTX3)	Inoue et al: Arterioscler Thromb Vasc Biol. 27(1): 161~167, 2007.
サイクリックAMP	孫 孝義, 他: 日本内分泌学会雑誌61(9): 912~923, 1985.
肝細胞増殖因子(HGF)	二井谷 好行, 他: 臨床検査35(13): 1360~1364, 1991.
エリスロポエチン	増田 詩織, 他: 医学と薬学67(2): 297~306, 2012.
アディポネクチン(LA)	Nishimura A. et al: Clinica Chimica Acta 371: 163~168, 2006.

腫瘍関連検査

癌胎児性抗原(CEA)	鈴木 尚子, 他: 医学と薬学56(6): 897~907, 2006.
血清p53抗体	橋本 礼輔, 他: 医学と薬学75(8): 955~964, 2018.
α -フェトプロテイン定量	鈴木 尚子, 他: 医学と薬学56(6): 897~907, 2006.
PIVKA-II	古谷 桃子, 他: 医学検査68(1): 56~60, 2019.
DUPAN-2	櫻林 郁之介, 他: 臨床病理34(6): 705~710, 1986.
CA19-9	鈴木 尚子, 他: 医学と薬学56(6): 897~907, 2006.
SPan-1	梅山 馨, 他: 膵臓3(4): 528~539, 1988.
NCC-ST-439	吉岡 久, 他: 臨床病理35(11): 1233~1238, 1987.
CA15-3	黒田 雅顕: 医療と検査機器・試薬29(6): 589~596, 2006.
BCA225	小林 美耶子, 他: 医学と薬学72(7): 1249~1259, 2015.
血清 HER2タンパク	LuftnerD, et al: The International Journal of Biological Markers 19(3): 175~182, 2004.
シアリルLe ^x 抗原(CSLEX)	三嶋 芳樹, 他: 医学と薬学29(5): 1193~1200, 1993.
シアリルLe ^x -i抗原(SLX)	井村 裕夫, 他: 癌と化学療法14(5): 1315~1321, 1987.
前立腺特異抗原(PSA)	細羽 恵美子, 他: 医学と薬学76(11): 1635~1641, 2019.
γ -セミノプロテイン(γ -Sm)	佐藤 達郎, 他: 医学と薬学43(1): 97~106, 2000.
CA125	黒田 雅顕: 医療と検査機器・試薬29(6): 589~596, 2006.
CA54/61	野澤 志朗, 他: 癌と化学療法19(12): 2085~2093, 1992.
CA72-4	矢田 紗世, 他: 医学と薬学74(7): 831~840, 2017.
SCC	林 圭織, 他: 医学と薬学76(12): 1809~1818, 2019.
シフラ(CYFRA)(サイトケラチン19フラグメント)	黒田 雅顕: 医療と検査機器・試薬29(6): 597~602, 2006.
ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)	山本 典江, 他: 医療と検査機器・試薬32(2): 263~267, 2009.
NSE(神経特異エノラーゼ)	矢田 紗世, 他: 医学と薬学74(7): 831~840, 2017.
塩基性フェトプロテイン(BFP)	設楽 光弘, 他: 臨床病理36(9): 1039~1044, 1988.
可溶性IL-2レセプター	林 圭織, 他: 医学と薬学75(12): 1611~1620, 2018.

検査項目

測定参考文献

腫瘍関連検査

チミジンキナーゼ活性	鳥住 和民, 他: 核医学25(6): 561~567, 1988.
5-S-システニルドーパ(5-S-CD)	Wakamatsu K et al: Clinical Chemistry 40(3): 495~496, 1994.

ウイルス感染症検査

アデノウイルス	北村 元仕, 他: 臨床検査マニュアル(文光堂): 880~886, 1988.
アデノウイルス 1型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
アデノウイルス 2型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
アデノウイルス 3型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
アデノウイルス 4型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
アデノウイルス 5型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
アデノウイルス 6型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
アデノウイルス 7型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
アデノウイルス 8型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
アデノウイルス 11型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
アデノウイルス 19型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
アデノウイルス 21型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
アデノウイルス 37型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
インフルエンザウイルス A型(H1N1)(H3N2)	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
インフルエンザウイルス A型	北村 元仕, 他: 臨床検査マニュアル (文光堂): 880~886, 1988.
インフルエンザウイルス B型(HI)	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 214~225, 1973.
インフルエンザウイルス B型(CF)	北村 元仕, 他: 臨床検査マニュアル (文光堂): 880~886, 1988.
パラインフルエンザウイルス 1型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 214~225, 1973.
パラインフルエンザウイルス 2型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 214~225, 1973.
パラインフルエンザウイルス 3型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 214~225, 1973.
RSウイルス(CF)	北村 元仕, 他: 臨床検査マニュアル (文光堂): 880~886, 1988.
RSウイルス(NT)	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 1型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 3型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 4型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 5型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 6型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 7型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 9型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 11型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 12型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 13型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 14型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 16型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 17型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 18型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 19型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 21型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 22型(パレコウイルス1型)	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.
エコーウイルス 24型	国立予防衛生研究所学会: ウイルス実験学 総論 2版 (丸善): 260~274, 1973.

検査項目

測定参考文献

ウイルス感染症検査

エコーウイルス 25型	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
エコーウイルス 30型	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス A群2型	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス A群3型	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス A群4型	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス A群5型	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス A群6型	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス A群7型	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス A群9型(NT)	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス A群9型(CF)	北村 元仕, 他：臨床検査マニュアル (文光堂)：880～886, 1988.
コクサッキーウイルス A群10型	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス A群16型	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス B群1型(NT)	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス B群1型(CF)	北村 元仕, 他：臨床検査マニュアル (文光堂)：880～886, 1988.
コクサッキーウイルス B群2型(NT)	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス B群2型(CF)	北村 元仕, 他：臨床検査マニュアル (文光堂)：880～886, 1988.
コクサッキーウイルス B群3型(NT)	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス B群3型(CF)	北村 元仕, 他：臨床検査マニュアル (文光堂)：880～886, 1988.
コクサッキーウイルス B群4型(NT)	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス B群4型(CF)	北村 元仕, 他：臨床検査マニュアル (文光堂)：880～886, 1988.
コクサッキーウイルス B群5型(NT)	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス B群5型(CF)	北村 元仕, 他：臨床検査マニュアル (文光堂)：880～886, 1988.
コクサッキーウイルス B群6型(NT)	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
コクサッキーウイルス B群6型(CF)	北村 元仕, 他：臨床検査マニュアル (文光堂)：880～886, 1988.
エンテロウイルス 70型	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
エンテロウイルス 71型	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
日本脳炎ウイルス (JaGAr株)	厚生省監修：微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第2分冊：81～97, 1987.
日本脳炎ウイルス	北村 元仕, 他：臨床検査マニュアル (文光堂)：880～886, 1988.
ムンプスウイルス IgM	厚生省監修：微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊：48～61, 1987.
ムンプスウイルス IgG	中山 哲夫 医学と薬学42(2)：303～306, 1999.
ムンプスウイルス(NT)	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
ムンプスウイルス(CF)	北村 元仕, 他：臨床検査マニュアル(文光堂)：880～886, 1988.
麻疹ウイルス IgM	厚生省監修：微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊：48～61, 1987.
麻疹ウイルス IgG	厚生省監修：微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊：48～61, 1987.
麻疹ウイルス	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：214～225, 1973.
風疹ウイルス IgM	佐藤 俊則, 他：臨床とウイルス23(1)：44～47, 1995.
風疹ウイルス IgG	厚生省監修：微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊：48～61, 1987.
風疹ウイルス	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：214～225, 1973.
ヒトパルボウイルスB19 IgM	要藤 裕孝, 他：感染症学雑誌69(10)：1135～1140, 1995.
ヒトパルボウイルスB19 IgG	要藤 裕孝, 他：感染症学雑誌69(10)：1135～1140, 1995.
水痘・帯状疱疹ウイルス IgM	平野 勝, 他：医学と薬学42(2)：641～645, 1999.
水痘・帯状疱疹ウイルス IgG	吉田 晃, 他：臨床とウイルス13(4)：490～496, 1985.
水痘・帯状疱疹ウイルス	北村 元仕, 他：臨床検査マニュアル(文光堂)：880～886, 1988.

検査項目

測定参考文献

ウイルス感染症検査

単純ヘルペス ウイルス IgM	厚生省監修：微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊：48～61, 1987.
単純ヘルペス ウイルス IgG	厚生省監修：微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊：48～61, 1987.
単純ヘルペス ウイルス 1型	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
単純ヘルペス ウイルス 2型	国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論 2版 (丸善)：260～274, 1973.
単純ヘルペス ウイルス	北村 元仕, 他：臨床検査マニュアル(文光堂)：880～886, 1988.
サイトメガロウイルス IgM	熊田 洋高, 他：医学と薬学72(6)：1087～1094, 2015.
サイトメガロウイルス IgG	熊田 洋高, 他：医学と薬学72(6)：1087～1094, 2015.
サイトメガロウイルス	北村 元仕, 他：臨床検査マニュアル(文光堂)：880～886, 1988.
EBウイルス 抗EA IgG	脇口 宏, 他：医学と薬学58(2)：363～369, 2007.
EBウイルス 抗VCA IgM(EIA)	脇口 宏, 他：医学と薬学58(2)：363～369, 2007.
EBウイルス 抗VCA IgG(EIA)	脇口 宏, 他：医学と薬学58(2)：363～369, 2007.
EBウイルス 抗EBNA IgG	脇口 宏, 他：医学と薬学58(2)：363～369, 2007.
EBウイルス 抗EA-DR IgG	日沼 頼夫, 他：臨床病理 特(35)：179～189, 1978.
EBウイルス 抗VCA IgM(FA)	日沼 頼夫, 他：臨床病理 特(35)：179～189, 1978.
EBウイルス 抗VCA IgG(FA)	日沼 頼夫, 他：臨床病理 特(35)：179～189, 1978.
EBウイルス 抗EBNA	日沼 頼夫, 他：臨床病理 特(35)：179～189, 1978.
EBウイルス 抗VCA IgA	日沼 頼夫, 他：臨床病理 特(35)：179～189, 1978.
EBウイルス 抗EA-DR IgA	日沼 頼夫, 他：臨床病理 特(35)：179～189, 1978.
ウイルス分離	Hsiung GD : Diagnostic Virology An Illustrated Handbook : 3～20, 1973.
ウイルス同定	Hsiung GD : Diagnostic Virology An Illustrated Handbook : 3～20, 1973.
アデノウイルスDNA定性	Hierholzer JC et al : Journal of Clinical Microbiology 31(7) : 1886～1891, 1993.
ヒトパルボウイルス B19DNA定性	Sevall JS : Molecular and Cellular Probes 4 : 237～246, 1990.
水痘・帯状疱疹ウイルスDNA定性	本藤 良, 他：日本臨床50(特別号)：160～165, 1992.
水痘・帯状疱疹ウイルス抗原	新村 真人, 他：感染症学雑誌64(2)：195～201, 1990.
単純ヘルペスウイルス DNA定量	Stevens J : 実験医学15(7S) : 728～733, 1997.
単純ヘルペスウイルス DNA定性	Cao M et al : J Invest Dermatol 82 : 391～392, 1989.
単純ヘルペスウイルス 特異抗原	川名 尚, 他：感染症学雑誌61(9)：1030～1037, 1987.
ヒトヘルペスウイルス 6型DNA定性	近藤 一博, 他：蛋白質核酸酵素35(17)：3041～3047, 1990.
ヒトヘルペスウイルス 7型DNA定性	Yalcin S et al : Archives of Virology 136 : 183～190, 1994.
サイトメガロウイルス DNA定性	Olive DM et al : Journal of Clinical Microbiology 27(6) : 1238～1242, 1989.
サイトメガロウイルス pp65抗原(C7-HRP)	権藤 久司, 他：臨床血液 34(11)：1438～1444, 1993.
EBウイルスDNA定量	Kimura H, et al : J Clin Microbiol 37(1) : 132～136, 1999.
EBウイルスDNA(クロナリティ)	Raab-Traub N et al : Cell 47 : 883～889, 1986.
ヒトパピローマウイルスDNA(16型, 18型, その他ハイリスクグループ)	三浦 俊昭, 他：医学と薬学69(1)：157～162, 2013.
ヒトパピローマウイルス(HPV)ジェノタイプ判定	尾崎 聡, 他：臨床病理60(7)：621～626, 2012.
HTLV-I (ATLV)抗体(CLEIA)	植柳 泰, 他：医学と薬学73(6)：1031～1035, 2016.
HTLV-1抗体	Zrein M, et al : Clin Diagn Lab Immunol 5(1) : 45～49, 1998.
HTLV-I 核酸検出(定性)	Miyazato P. et al : Journal of Virology 80(21) : 10683～10691, 2006.
HTLV-I プロウイルスDNA定性	Miyazato P. et al : Journal of Virology 80(21) : 10683～10691, 2006.
HTLV-I (ATLV) プロウイルスDNA(クロナリティ)	渡辺 俊樹, 他：Medical Immunology 16(6) : 785～791, 1988.
HIV抗原・抗体	桜庭 尚哉, 他：医学と薬学65(5) : 663～672, 2011.
HIV-1/2特異抗体	Kondo M, et al : PLoS ONE 13(10)e0198924 : 1～10, 2018.
HIV-1RNA定量	目崎 和久, 他：医学と薬学73(6) : 705～709, 2016.

検査項目

測定参考文献

ウイルス感染症検査

HA抗体	矢野 公士, 他: 医学と薬学58(1): 151~161, 2007.
IgM-HA抗体	矢野 公士, 他: 医学と薬学58(1): 151~161, 2007.
HBs抗原(HQ)	戸来 孝, 他: 医学と薬学72(9): 1569~1577, 2015.
HBs抗体[CLIA]	大根 久美子, 他: 臨床病理63(8): 907~912, 2015.
HBc抗体(IgG)	八橋 弘, 他: 医学と薬学66(6): 1075~1081, 2011.
IgM-HBc抗体	熊谷 保之: 日本臨床検査自動化学会誌JJCLA 25(1): 70~74, 2000.
HBVゲノタイプ	田中 靖人, 他: 臨床病理57(1): 42~47, 2009.
B型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)	Inoue T, et al: J Hepatol 75(2): 302~310, 2021.
HBV DNA定量(IU)	菅原 昌章, 他: 医学と薬学73(10): 1329~1339, 2016.
HCV群別(グルーピング)	長谷川 瞳, 他: 医学と薬学70(3): 633~641, 2013.
HCV抗原(コア蛋白質)	田原 和子, 他: 日本臨床検査自動化学会誌36(2): 267~274, 2011.
HCV RNA定量	菅原 昌章, 他: 医学と薬学73(10): 1329~1339, 2016.
HCV RNAコアジェノタイプ	Ohno T et al: Journal of Clinical Microbiology 35(1): 201~207, 1997.
HCV RNA 1b(NS5A)	Enomoto N et al: The New England Journal of Medicine 334(2): 77~81, 1996.
IgA-HEV抗体(定性)	飯野 四郎, 他: 医学と薬学53(4): 461~469, 2005.

免疫学的検査

マイコプラズマニューモニエ(CF)	北村 元仕, 他: 臨床検査マニュアル(文光堂): 880~886, 1988.
マイコプラズマニューモニエ(PA)	大関 トシイ, 他: 自治医科大学臨床検査技師年報12: 62~64, 1988.
ツツガムシギリアム IgG	山本 正悟: 臨床とウイルス12(3): 270~274, 1984.
ツツガムシギリアム IgM	山本 正悟: 臨床とウイルス12(3): 270~274, 1984.
ツツガムシカトー IgG	山本 正悟: 臨床とウイルス12(3): 270~274, 1984.
ツツガムシカトー IgM	山本 正悟: 臨床とウイルス12(3): 270~274, 1984.
ツツガムシカーブ IgG	山本 正悟: 臨床とウイルス12(3): 270~274, 1984.
ツツガムシカーブ IgM	山本 正悟: 臨床とウイルス12(3): 270~274, 1984.
クラミジアトラコマティス IgG	梶原 祥子, 他: 医学と薬学37(3): 711~719, 1997.
クラミジアトラコマティス IgA	梶原 祥子, 他: 医学と薬学37(3): 711~719, 1997.
クラミドフィラシタシ IgG	厚生省監修: 微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊: 62~75, 1987.
クラミドフィラシタシ IgM	厚生省監修: 微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊: 62~75, 1987.
オーム病クラミドフィラ(クラミジアシタシ)	北村 元仕, 他: 臨床検査マニュアル(文光堂): 880~886, 1988.
クラミドフィラニューモニエ IgG	松本 明: 第22回日本臨床微生物学会総会ワークショップ1
クラミドフィラニューモニエ IgA	松本 明: 第22回日本臨床微生物学会総会ワークショップ1
クラミドフィラニューモニエ IgM	宮下 修行, 他: 小児科診療71(1): 95~99, 2008.
マイコプラズマニューモニエDNA	山口 恵三, 他: 医学と薬学58(4): 565~571, 2007.
クラミジアトラコマティスDNA	熊本 悦明, 他: 医学と薬学66(6): 1007~1014, 2011.
淋菌DNA	熊本 悦明, 他: 医学と薬学66(6): 1007~1014, 2011.
淋菌およびクラミジアトラコマティスDNA同時測定	熊本 悦明, 他: 医学と薬学66(6): 1007~1014, 2011.
結核菌特異的IFN- γ	Meier T, et al: European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 24: 529~536, 2005.
ニューモシスチス・イロベチイDNA定性	Monroy-Vaca EX, et al. J Clin Microbiol. 52(1): 45~51, 2014.
寒冷凝集反応	原島 典子, 他: 衛生検査27(1): 67~71, 1978.
抗ストレプトリジン-O抗体(ASO)	伊藤 忠一: 日本臨床39(6): 685~688, 1995.
便中ヘリコバクターピロリ抗原	朝日 佳代子, 他: 医学と薬学57(2): 253~260, 2007.
抗ヘリコバクターピロリ抗体(LA)	乾 正幸, 他: 日本ヘリコバクター学会誌19(1): 33~42, 2007.

検査項目

測定参考文献

免疫学的検査

プロカルシトニン	小林 一三, 他: 医学と薬学73(4): 459~467, 2016.
エンドトキシン定量	土谷 正和, 他: 日本細菌学雑誌45(6): 903~911, 1990.
β -D-グルカン	吉田 耕一郎, 他: 感染症学雑誌79(7): 433~442, 2005.
カンジダマンナン抗原	新崎 晃弘, 他: 臨床検査機器・試薬23(3): 107~2003, 2000.
クリプトコックス・ネオフォルマンس抗原	篠田 孝子, 他: 真菌と真菌症30(3): 211~221, 1989.
アスペルギルス抗原	見手倉 久治, 他: 医学と薬学42(1): 207~212, 1999.
アスペルギルス抗体IgG	Dumollard C, et al: J Clin Microbiol 54(5): 1236~1242, 2016.
百日咳抗体IgG	岡田 賢司: 医学と薬学65(4): 531~536, 2011.
百日咳抗体IgM	小児呼吸器感染症診療ガイドライン作成委員会: 小児呼吸器感染症ガイドライン2017(協和企画): 236~240, 2016.
百日咳DNA	Kamachi K, et al: J Clin Microbiol 44(5): 1899~1902, 2006.
トキソプラズマ IgG抗体	亀井 喜世子, 他: 臨床病理42(7): 743~747, 1994.
トキソプラズマ IgM抗体	亀井 喜世子, 他: 臨床病理42(7): 743~747, 1994.
梅毒定性 RPR(LA)	桜庭 尚哉: 医学と薬学63(1): 103~109, 2010.
梅毒定性 TP抗体(LA)	高橋 勝幸, 他: 機器・試薬33(1): 89~95, 2010.
梅毒定量 RPR(LA)	桜庭 尚哉: 医学と薬学63(1): 103~109, 2010.
梅毒定量 TP抗体(LA)	高橋 勝幸, 他: 機器・試薬33(1): 89~95, 2010.
リウマチ因子(RF)定量	鬼塚 聖子, 他: 日本臨床検査自動化学会誌35(1): 17~22, 2010.
抗シトルリン化ペプチド(CCP)抗体	山下 里美, 他: 医学と薬学66(3): 569~576, 2011.
抗ガラクトース欠損IgG抗体	平山 吉郎, 他: 医学と薬学42(5): 817~828, 1999.
IgG型リウマチ因子	中園 清, 他: 医学と薬学45(3): 481~486, 2001.
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	氏家 真二, 他: 医学と薬学67(5): 741~747, 2012.
抗核抗体(ANA)	東條 毅: 臨床検査30(7): 687~692, 1986.
抗DNA抗体(RIA)	鈴木 王洋, 他: 臨床免疫25(8): 1096~1102, 1993.
抗ss-DNA IgG抗体	陣内 記代, 他: 日本臨床検査自動化学会誌26(6): 747~753, 2001.
抗ss-DNA IgM抗体	山下 雅樹, 他: 医学と薬学58(5): 763~767, 2007.
抗ds-DNA IgG抗体	陣内 記代, 他: 日本臨床検査自動化学会誌26(6): 747~753, 2001.
抗ds-DNA IgM抗体	山下 雅樹, 他: 医学と薬学58(5): 763~767, 2007.
ループスアンチコアグラント(APTT凝固時間法)	後藤 守孝, 他: Modern Physician 15(12): 1545~1550, 1995.
ループスアンチコアグラント(希釈ラッセル蛇毒時間法)	藤岡 貴, 他: 医学と薬学73(5): 621~626, 2016.
ループスアンチコアグラント(リン脂質中和法)	藤岡 貴, 他: 医学と薬学73(5): 621~626, 2016.
抗カルジオリピン β 2グリコプロテインI複合体抗体(抗CL- β 2GP I抗体)	野島 順三, 他: 医学と薬学32(6): 1315~1320, 1994.
抗カルジオリピン抗体(IgG)	小川 昌起, 他: 医学と薬学78(4): 447~459, 2021.
抗カルジオリピン抗体(IgM)	小川 昌起, 他: 医学と薬学78(4): 447~459, 2021.
抗RNP抗体(CLEIA)	西山 進, 他: 医学と薬学68(2): 345~355, 2012.
抗Sm抗体(CLEIA)	西山 進, 他: 医学と薬学68(2): 345~355, 2012.
抗SS-A/Ro抗体(CLEIA)	西山 進, 他: 医学と薬学68(2): 345~355, 2012.
抗SS-B/La抗体(CLEIA)	西山 進, 他: 医学と薬学68(2): 345~355, 2012.
抗Scl-70抗体(CLEIA)	松下 雅和, 他: 医学と薬学70(1): 109~117, 2013.
抗RNAポリメラーゼIII抗体	桑名 正隆: リウマチ科40(3): 239~245, 2008.
抗Jo-1抗体(CLEIA)	松下 雅和, 他: 医学と薬学70(1): 109~117, 2013.
抗ARS抗体	Ran Nakashima, et al: PLOS ONE9(1)e85062: 1~7, 2014.
抗セントロメア抗体	小島 和夫, 他: 医学と薬学69(4): 677~687, 2013.
抗ミトコンドリア抗体	山内 進, 他: 臨床免疫7(7): 825~830, 1975.

検査項目

測定参考文献

免疫学的検査

抗ミトコンドリア M2抗体	丹野 瑞木, 他: 医学と薬学67(3): 485~495, 2012.
抗LKM-1抗体	竹村 真理, 他: 医学と薬学46(1): 109~114, 2001.
抗平滑筋抗体	山内 進: 臨床免疫7(7): 825~830, 1975.
抗胃壁細胞抗体	山内 進: 衛生検査22(12): 1085~1089, 1973.
抗内因子抗体	Elizabeth A.Gomez et al: Clinical Chemistry 51(1): 232~235, 2005.
ロイシンリッチ α_2 グリコプロテイン(LRG)	Serada S, et al: Ann Rheum Dis69(4): 770~774, 2010. Serada S, et al: Inflamm Bowel Dis18(11): 2169~2179, 2012. Naka T, et al: Immunological Medicine41(2): 62~67, 2018.
抗好中球細胞質抗体(PR3-ANCA)	松下 雅和, 他: 医学と薬学66(5): 823~828, 2011.
抗好中球細胞質抗体(MPO-ANCA)	松下 雅和, 他: 医学と薬学66(5): 823~828, 2011.
抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)	臼井 丈一, 他: 医学と薬学68(4): 697~704, 2012.
抗アクアポリン4抗体	高橋 利幸, 他: 医学と薬学73(10): 1297~1300, 2016.
抗デスモグレイン1抗体	吉田 かおり, 他: 医学と薬学70(5.6): 989~1000, 2013.
抗デスモグレイン3抗体	吉田 かおり, 他: 医学と薬学70(5.6): 989~1000, 2013.
抗BP180抗体(血清中抗BP180NC16a抗体)	吉田 かおり, 他: 医学と薬学70(5.6): 989~1000, 2013.
抗表皮成分自己抗体〔直接法〕	川生 明: 病理と臨床6(増): 10~13, 1988.
抗血小板抗体	柴田 洋一: 輸血学(中外医学社): 457~470, 1978.
PAIgG(血小板関連IgG)	林 悟, 他: 臨床病理32(11): 1253~1257, 1984.
HIT抗体(血小板第4因子・ヘパリン複合体抗体)	阪田 敏幸: 医学と薬学68(3): 547~555, 2012.
抗アセチルコリン受容体抗体(抗AChR抗体)	太田 光熙, 他: ホルモンと臨床48(1): 89~93, 2000.
抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体(抗MuSK抗体)	本村 政勝, 他: 医学と薬学70(2): 421~428, 2013.
精子不動化抗体	香山 浩二: 日本産科婦人科学会雑誌42(11)N209~N212, 1990.
精子不動化抗体(SI50)	香山 浩二: 日本産科婦人科学会雑誌42(11)N209~N212, 1990.
ABO・Rh(D因子)式血液型	長田 広司: 医薬ジャーナル32(S1): 215~219, 1996.
Rh-Hr式血液型	長田 広司: 医薬ジャーナル32(S1): 215~219, 1996.
直接クームス試験	浅井 隆善: 医学のあゆみ167(9): 700~700, 1993.
間接クームス試験	浅井 隆善: 医学のあゆみ167(9): 700~700, 1993.
不規則性抗体(抗体同定・抗体価測定)	浅井 隆善: 医学のあゆみ167(9): 700~700, 1993.
血液型不適合妊娠	支倉 逸人: 日本臨床26(2): 262~272, 1968.
免疫電気泳動(特異抗血清による同定)	大谷 英樹, 他: 日常検査法シリーズ11 免疫電気泳動 2版: 8~26, 1977.
尿中免疫電気泳動(尿中ヘンスジョーンズ蛋白の同定)	大谷 英樹, 他: 日常検査法シリーズ11 免疫電気泳動 2版: 8~26, 1977.
免疫グロブリン遊離L鎖 κ/λ 比(フリーライトチェーン)	守田 由香, 他: 医学と薬学74(8): 945~950, 2017.
オリゴクローナルバンド	佐々木 征治, 他: 最新電気泳動実験法(医歯薬出版): 61~74, 1999.
IgG	金井 正光, 編: 臨床検査法提要 第31版(金原出版): 823~827, 1998.
IgGサブクラス分画	川 茂幸, 他: 医学と薬学74(4): 463~470, 2017.
IgA	金井 正光, 編: 臨床検査法提要 第31版(金原出版): 823~827, 1998.
IgM	金井 正光, 編: 臨床検査法提要 第31版(金原出版): 823~827, 1998.
クリオグロブリン定性	青木 紀生, 他: Medical Technology 6(8): 619~624, 1978.
血清補体価	中藤 聡子, 他: 臨床検査機器・試薬19(4): 609~613, 1996.
C1q	櫻林 郁之介, 他: 臨床病理 特(53): 71~81, 1983.
C1インアクチベーター活性(C1エステラーゼインヒビター活性)	Dick W et al: Immun Infekt13: 113~118, 1985.
C3	金井 正光, 編: 臨床検査法提要 第31版(金原出版): 833~837, 1998.
C4	金井 正光, 編: 臨床検査法提要 第31版(金原出版): 833~837, 1998.
プレアルブミン	古田島 伸雄, 他: 日本臨床検査自動化学会誌32(1): 84~88, 2007.

検査項目

測定参考文献

免疫学的検査

レチノール結合蛋白(RBP)	古田島 伸雄, 他: 日本臨床検査自動化学会誌32(1): 84~88, 2007.
α 1-マイクログロブリン	中野 卓, 他: 臨床検査機器・試薬11(3): 469~476, 1988.
α 1アンチトリプシン	櫻林 郁之介, 他: 臨床病理 特(53): 71~81, 1983.
α 1アシドグリコプロテイン	櫻林 郁之介, 他: 臨床病理 特(53): 71~81, 1983.
α 2-マクログロブリン	櫻林 郁之介, 他: 臨床病理 特(53): 71~81, 1983.
ハプトグロビン	伊藤 忠一: 検査と技術 22(5)増刊号: 42~43, 1994.
セルプラスミン	櫻林 郁之介, 他: 臨床病理 特(53): 71~81, 1983.
フェリチン	唐澤 美佳, 他: 医療と検査機器・試薬29(5): 493~497, 2006.
トランスフェリン	伊藤 忠一: 検査と技術16(7): 593~598, 1988.
尿中トランスフェリン	齋藤 良一, 他: 日本臨床検査自動化学会誌JJCLA 25(5): 687~690, 2000.
尿中トランスフェリン(クレアチニン換算値)	齋藤 良一, 他: 日本臨床検査自動化学会誌JJCLA 25(5): 687~690, 2000.
β 2-マイクログロブリン	伊藤 浩治, 他: 医療と検査機器・試薬26(2): 127~134, 2003.
β 2-マイクログロブリン	伊藤 浩治, 他: 医療と検査機器・試薬26(2): 127~134, 2003.
シスタチンC	Tanaka M, et al: Clinical Biochemistry 37: 27~35, 2004.
C反応性蛋白(CRP)定量	小林 咲絵, 他: 医学と薬学78(1): 81~89, 2021.
血清アミロイドA蛋白(SAA)	永徳 広美, 他: 生物物理化学37(1): 19~23, 1993.
ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)	藤田 孝, 他: 臨床検査機器・試薬33(5): 629~632, 2010.
心室筋ミオシン軽鎖 I	宮崎 修一, 他: 医学と薬学52(3): 443~449, 2004.
心筋トロポニンT	古屋 実, 他: 医学と薬学74(5): 607~617, 2017.
プロコラーゲンⅢペプチド(P-Ⅲ-P)	北原 志穂, 他: 医学と薬学72(9): 1579~1590, 2015.
Ⅳ型コラーゲン・7S(CLEIA)	大高木 結媛, 他: 医学と薬学77(5): 785~792, 2020.
尿中Ⅳ型コラーゲン	小幡 賢一, 他: 臨床検査機器・試薬18(3): 439~444, 1995.
KL-6	桜庭 尚哉, 他: 医学と薬学61(4): 629~635, 2009.
肺サーファクタント プロテインD(SP-D)	土居 耕介, 他: 医学と薬学78(3): 261~263, 2021.
肺サーファクタントプロテインA(SP-A)	大木 卓, 他: 医学と薬学71(1): 161~166, 2014.
デオキシビリジノリン	山本 逸雄, 他: ホルモンと臨床44(7): 747~757, 1996.
I型コラーゲンC末端 テロペプチド(ICTP)	清原 剛, 他: ホルモンと臨床42(12): 1189~1193, 1994.
Mac-2 結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi)定量	Uojima H, et al: J Gastroenterol 58(12): 1252~1260, 2023.
サイトケラチン18フラグメント(CK-18F)	Tada T, et al: Eur J Gastroenterol Hepatol33(11): 1451~1458, 2021.

アレルギー検査

IgE(非特異的IgE)	岩崎 栄作, 他: 小児科臨床50(1): 145~151, 1997.
アトピー鑑別試験(12種吸入性アレルギー)	奥田 勲, 他: 医学検査46(10): 1525~1530, 1997.
特異的IgE(MAST36アレルギー)	中川 武正, 他: アレルギーの臨床26(3): 238~242, 2006.
特異的IgE(Viewアレルギー39)	張田 聖恵: 医学と薬学73(6): 721~726, 2016.
特異的IgE(シングルアレルギー)FEIA	奥田 勲, 他: 医学検査46(10): 1525~1530, 1997.
特異的IgE(マルチアレルギー)FEIA	奥田 勲, 他: 医学検査46(10): 1525~1530, 1997.
TARC(Th2ケモカイン)	山脇 一恋, 他: 医療と検査機器・試薬44(5): 428~433, 2021.

生化学的検査

総蛋白(TP)(血清)	Gornall AG et al: J Biol Chem: 177: 751~766, 1949.
総蛋白(TP)(髄液, 蓄尿)	田中 雅美, 他: 機器・試薬33: 393~397, 2010.
アルブミン(Alb)	浅井 孝道, 他: 検査と技術7(10): 815~820, 1979.
尿中アルブミン	舩方 栄二: 検査と技術3(7): 625~630, 2005.

検査項目

測定参考文献

免疫学的検査

尿中アルブミン(クレアチニン換算値)	舩方 栄二：検査と技術3(7)：625～630, 2005.
A/G比	浅井 孝道：検査と技術7(10)：815～820, 1979.
蛋白分画	伊藤 喜久：Medical Technology 39(3)：278～248, 2011.
リパーゼ	宇治 義則，他：検査と技術25(10)：819～824, 1997.
アミラーゼ(AMY)	日本臨床化学会酵素・試薬専門委員会：臨床化学34(4)：350～361, 2005.
アミラーゼアイソザイム	星野 忠：JJCLA VOL.37 No.3：293～297, 2012.
P型アミラーゼ定量	高笠 信之：The Chemical Times：201(3)：9～11, 2006.
トリブシン	植田 進之介，他：医学と薬学77(12)：1659～1668, 2020.
膵ホスホリパーゼA ₂ (膵PLA ₂)	竹田 昌弘，他：ホルモンと臨床38(7)：729～734, 1990.
エラスターゼ1	大出 勝也，他：肝と膵23(6)：477～480, 2002.
リゾチーム	北村 元仕：実践臨床化学 増補：432～436, 1982.
CK(CPK)	日本臨床化学会：臨床化学19(2)：184～208, 1990.
CK-MB(CPK-MB)〔免疫阻止-UV法〕	Wurzburg U et al：Klinische Wochenschrift 54：357～360, 1976.
CK-MB(CPK-MB)〔CLEIA〕	Piran U et al：Clinical Chemistry：33(9)：1517～1520, 1987.
アルドラーゼ	三浦 雅一，他：臨床検査機器・試薬12(5)：1005～1009, 1989.
AST(GOT)	日本臨床化学会：臨床化学18(4)：226～230, 1989.
ALT(GPT)	日本臨床化学会：臨床化学18(4)：250～254, 1989.
LD(LDH)IFCC	Schumann et al：Clin Chem Lab Med49(9)：1439～1446, 2011.
LD(LDH)アイソザイム	森山 隆則，他：Medical Technology：25(1)：45～51, 1997.
アルカリフォスファターゼ(ALP)IFCC	Schumann et al：Clin Chem Lab Med49(9)：1439～1446, 2011.
骨型アルカリフォスファターゼ(BAP)	倉澤 健太郎，他：医学と薬学55(2)：279～285, 2006.
ALPアイソザイム	芝 紀代子：目でみる電気泳動法2(医歯薬出版)：55～71, 1989.
ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)	小林 照明，他：機器・試薬14(6)：929～935, 1991.
γ-GT(γ-GTP)	日本臨床化学会酵素専門委員会：臨床化学24(2)：106～121, 1995.
コリンエステラーゼ(ChE)	大澤 進，他：臨床化学24：138～145, 1995.
アンギオテンシンⅠ転換酵素(ACE)	Kasahara Y et al：Clinical Chemistry 27(11)：1922～1925, 1981.
グアナーゼ	手登根 稔，他：検査と技術13(10)：901～905, 1985.
アデノシンデアミナーゼ(ADA)	佐野 史良，他：臨床検査機器・試薬9(4)：715～720, 1986.
ペプシノゲン	三木 一正，他：医学と薬学56(6)：889～896, 2006.
胃がんリスク層別化検査(ABC分類)〔LA〕	乾 正幸，他：日本ヘリコバクター学会誌19(1)：33～42, 2017.
アンモニア	奥田 拓道，他：最新医学21(3)：622～627, 1966.
尿素窒素(UN)	森下 芳孝：Medical Technology 26(6)：695～700, 1998.

生化学的検査

クレアチニン	安原 正喜，他：臨床検査機器・試薬17(1)：59～67, 1994.
尿酸(UA)	金井 泉，他：臨床検査提要 第32版：503～507, 2005.
L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)	森 さゆり，他：医療と検査機器・試薬41(6)：615～620, 2018.
アミノ酸分析(39種類)〔LC/MS〕	Kazutaka Shimbo et al：Biomedical Chromatography 24：683～691, 2010.
アミノ酸分析(41種類)	日本生化学会：生化学実験講座11 アミノ酸代謝と生体アミン 1版：53～67, 1976.
アミノ酸分析(9種類)〔LC/MS〕	Kazutaka Shimbo et al：Biomedical Chromatography 24：683～691, 2010.
アミノ酸分析2種類(チロシン・フェニルアラニン)〔LC/MS〕	Kazutaka Shimbo et al：Biomedical Chromatography 24：683～691, 2010.
総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)	中村 俊之，他：臨床病理37(8)：911～917, 1989.
総ホモシステイン	Christian Hellmuth, et al：Journal of Chromatography B, 879：83～89, 2011.

検査項目

測定参考文献

生化学的検査

ハイドロキシブロリン-総	鈴木 隆夫, 他: 日本臨床化学会年会記録28: 118~118, 1988.
グルコース	日本臨床化学会試薬専門委員会: 臨床化学20(4): 247~254, 1991.
ヘモグロビンA1c(HbA1c)	水松 良光, 他: 日本臨床検査自動化学会誌41(2): 215~220, 2016.
グリコアルブミン	石橋 みどり, 他: 医学と薬学52(3): 403~412, 2004.
1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)	遠藤 輝夫, 他: 医療と検査機器・試薬26(1): 45~50, 2003.
ヒアルロン酸	島村 朗, 他: 医学と薬学44(6): 1141~1146, 2000.
シアル酸	水田 亘, 他: 臨床病理 特(54): 128~134, 1983.
乳酸	浅沼 和子, 他: 生物試料分析8(3): 16~24, 1985.
ピルビン酸	浅沼 和子, 他: 生物試料分析8(3): 16~24, 1985.
尿中シュウ酸	小川 由英, 他: 腎と透析 臨増: 151~157, 1997.
血中ケトン体分画	西ヶ谷 晴美, 他: 医学検査45(3): 353, 1996.
アセトン定量	深掘 すみ江, 他: 労働科学59(12): 555~562, 1983.
有機酸スクリーニング検査	河野 芳功, 他: 日本小児科学会雑誌89(10): 2327~2334, 1985.
中性脂肪(TG)	Tamaoku K et al: Chem Pharm Bull 30(7): 2492~2497, 1982.
リン脂質	Takayama M et al: Clinica Chimica Acta 79: 93~98, 1977.
総コレステロール(T-Cho)	金井 正光, 他: 臨床検査法提要 第34版(金原出版): 512, 2015.
エステル型コレステロール(Echo)	Richmond W: Clinical Chemistry 19(12): 1350~1356, 1973.
遊離コレステロール(F-Cho)	Richmond W: Clinical Chemistry 19(12): 1350~1356, 1973.
コレステロールエステル比	Richmond W: Clinical Chemistry 19(12): 1350~1356, 1973.
HDL-コレステロール	田口 隆由, 他: 臨床検査機器・試薬24(1): 35~41, 2001.
HDL _{2,3} コレステロール	Bronzert TJ et al: Clinical Chemistry 23(11): 2089~2098, 1977.
LDL-コレステロール	菅野 剛史, 他: 医学と薬学37(3): 635~644, 1997.
レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C)	大石 千早, 他: 日本臨床検査自動化学会誌35(1): 83~87, 2010.
脂肪酸分画(24成分)	小沢 昭夫, 他: 分析化学31: 87~91, 1982.
脂肪酸分画(4成分)	小沢 昭夫, 他: 分析化学31: 87~91, 1982.
極長鎖脂肪酸	小池 亮子: 小児科診療53(増): 394~397, 1990.
総胆汁酸	今野 稔: 臨床検査機器・試薬16(3): 472~479, 1993.
β-リポ蛋白	金井 正光, 他: 臨床検査法提要 第30版(金原出版): 574~575, 1993.
リポ蛋白分画	芝 紀代子: 目でみる電気泳動法2: 91~99, 1989.
コレステロール分画	櫻林 郁之介, 他: HDL-コレステロール基礎と臨床 (株)テクノ: 207~220, 1980.
酸化LDL(MDA-LDL)	小谷 一夫: 酸化ストレスマーカー 学術出版センター: 243~246, 2005.
リポ蛋白(a)	岡野 芳幸, 他: 日本臨床検査自動化学会誌JJCLA 21(5): 705~709, 1996.
リポ蛋白リパーゼ(LPL)	Kobayashi J et al: Clinica Chimica Acta 216: 113~123, 1993.
アポリポ蛋白 A-I	岡崎 伸次, 他: 日本臨床検査自動化学会誌12(4): 334~334, 1987.
アポリポ蛋白 A-II	岡崎 伸次, 他: 日本臨床検査自動化学会誌12(4): 334~334, 1987.
アポリポ蛋白 B	岡崎 伸次, 他: 日本臨床検査自動化学会誌12(4): 334~334, 1987.
アポリポ蛋白 C-II	岡崎 伸次, 他: 日本臨床検査自動化学会誌12(4): 334~334, 1987.
アポリポ蛋白 C-III	岡崎 伸次, 他: 日本臨床検査自動化学会誌12(4): 334~334, 1987.
アポリポ蛋白 E	岡崎 伸次, 他: 日本臨床検査自動化学会誌12(4): 334~334, 1987.
ビタミンA	須原 聡, 他: 臨床検査36(3): 235~239, 1992.
β-カロチン	加美山 茂利, 他: 臨床検査31(3): 268~274, 1987.
ビタミンB ₁	宮川 秀則, 他: 生物試料分析36(4): 327~330, 2013.
ビタミンB ₂	大石 誠子: ビタミンハンドブック3 ビタミン分析法(化学同人): 71~80, 1989.

検査項目

測定参考文献

生化学的検査

ビタミンB ₆	吉田 継親, 他: 薬学雑誌98(10): 1319~1326, 1978.
ビタミンB ₁₂	中森 誠, 他: 医療と検査機器・試薬27(3): 215~221, 2004.
ビタミンC(アスコルビン酸)	Lykkesfeldt J et al Analytical Biochemistry 229: 329~335, 1995.
1,25-(OH) ₂ ビタミンD	Fraser WD et al: Ann Clin Biochem 34: 632~637, 1997.
25-OHビタミンD(骨粗鬆症)	小島 哲: 臨床化学48(3): 239~244, 2019.
25ヒドロキシビタミンD(くる病・骨軟化症)	小島 哲: 臨床化学48(3): 239~244, 2019.
ビタミンE	阿部 皓一, 他: 栄養と食糧28(5): 277~280, 1975.
葉酸	西村 和子, 他: 生物試料分析35(4): 300~309, 2012.
ビタミンK分画	langenbergh JP et al: Journal of Chromatography 305: 61~72, 1984.
ニコチン酸(ナイアシン)	宮沢 滋: ビタミン56(9・10): 487~499, 1982.
カルニチン分画	伊丹 儀友, 他: 臨床検査58(5): 651~658, 2014.
Na(ナトリウム)	桑 克彦: 臨床検査34(11): 1353~1358, 1990.
Cl(クロール)	関口 光夫: 検査と技術17(9): 1167~1172, 1989. 桑 克彦: 臨床検査34(11): 1353~1358, 1990.
K(カリウム)	桑 克彦: 臨床検査34(11): 1353~1358, 1990. 高橋 勝幸: 検査と技術20(6): 106~110, 1992.
Ca(カルシウム)	根占 哲也: 都臨技会誌34(5): 270~281, 2006.
P(無機リン)	Drewes PA: Clinica Chimica Acta 39: 81~88, 1972.
Mg(マグネシウム)	北村 元仕: 実践臨床化学 1版: 166~171, 1974.
浸透圧	鈴木 明, 他: 検査と技術6(9): 759~762, 1978.
鉄(Fe)(血清)	荒明 洋, 他: 臨床検査機器・試薬6(2): 359~366, 1983.
鉄(Fe)(尿)	溝口 秀昭: 臨床医8(10): 1624~1626, 1982.
総鉄結合能(TIBC)	荒明 洋, 他: 臨床検査機器・試薬6(2): 359~366, 1983.
不飽和鉄結合能(UIBC)	荒明 洋, 他: 臨床検査機器・試薬6(2): 359~366, 1983.
Cu(銅)(血清)	Abe A et al: Clinical Chemistry 35(4): 552~554, 1989.
Cu(銅)(尿)	Ichida T et al: Clinica Chimica Acta 24: 299~303, 1969.
Zn(亜鉛)(血清)	井上 哲, 他: 医療と検査機器・試薬41(3): 283~287, 2018.
Zn(亜鉛)(尿)	Meret S et al: Clinical Chemistry 17(5): 369~373, 1971.
総ビリルビン(T-Bil)	徳田 邦明, 他: 臨床化学22(2): 116~122, 1993.
ビリルビン分画(直接, 間接)	徳田 邦明, 他: 臨床化学22(2): 116~122, 1993.
コプロポルフィリン 定性	近藤 雅雄: 日本臨床53(6): 1377~1382, 1995.
コプロポルフィリン(尿)	近藤 雅雄: 日本臨床53(6): 1377~1382, 1995.
δ-アミノレブリン酸(δ ALA)	園藤 陽子, 他: 産業医学35: 126~127, 1993.
コプロポルフィリン(血液)	Salmi M et al: Clinical Chemistry 26(13): 1832~1835, 1980.
ウロポルフィリン(血液)	Salmi M et al: Clinical Chemistry 26(13): 1832~1835, 1980.
プロトポルフィリン	Salmi M et al: Clinical Chemistry 26(13): 1832~1835, 1980.
尿中馬尿酸	岸浪 菊江子, 他: 臨床化学17(3): 128~135, 1988.
尿中メチル馬尿酸	岸浪 菊江子, 他: 臨床化学17(3): 128~135, 1988.
尿中スチレン代謝物	岸浪 菊江子, 他: 臨床化学17(3): 128~135, 1988.
尿中総三塩化物 トリクロロエチレン	城山 康, 他: 松仁会医誌25(2): 225~231, 1986.
尿中総三塩化物 1・1・1-トリクロロエタン	城山 康, 他: 松仁会医誌25(2): 225~231, 1986.
尿中総三塩化物 テトラクロロエチレン	城山 康, 他: 松仁会医誌25(2): 225~231, 1986.
尿中トリクロロ酢酸 トリクロロエチレン	城山 康, 他: 松仁会医誌25(2): 225~231, 1986.
尿中トリクロロ酢酸 1・1・1-トリクロロエタン	城山 康, 他: 松仁会医誌25(2): 225~231, 1986.

検査項目

測定参考文献

生化学的検査

尿中トリクロロ酢酸 テトラクロロエチレン	城山 康, 他: 松仁会医誌25(2): 225~231, 1986.
尿中N-メチルホルムアミド	Mraz J et al: Journal of Chromatography 414: 399~404, 1987.
尿中2,5-ヘキサジオン	Iwata M et al: Int Arch Occup Environ Health 51: 253~260, 1983.
アルミニウム(Al)	Oster O: Clinica Chimica Acta 114: 53~60, 1981.
クロム	松岡 澄: 産業医学13(6): 525~537, 1971. 田中 俊行, 他: 医学と生物学101(5): 277~281, 1980.
マンガン	Tsalev DL et al: Bulletin of Environmental Contamination & Toxicology 17(6): 660~666, 1977.
カドミウム	Lagesson V et al: Clinical Chemistry 25(11): 1948~1953, 1979.
イヌリン定量(酵素法)	木全 伸介, 他: 医療と検査機器・試薬28(2): 143~149, 2005.
結石分析(成分比率)	神 ちひろ, 他: 分析化学53(7): 735~741, 2004.
エタノール	馬嶋 正隆, 他: 北里医学14: 424~430, 1984.
ネオプテリン	Hausen A et al: Journal of Chromatography 227: 61~70, 1982.
骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ(TRACP-5b)	西沢 良記, 他: 医学と薬学54(5): 709~717, 2005.
デオキシピリジノリン(DPD)(骨粗鬆症)	山本 逸雄, 他: ホルモンと臨床44(7): 747~757, 1996.
I型プロコラーゲン-N-プロペプチド(total PINP)	日高 好博, 他: 医学と薬学70(2): 357~365, 2013.

血液学的検査

末梢血液一般検査	金井 正光, 他: 臨床検査提要 第32版(金原出版): 265~295, 2005.
網状赤血球	金井 正光, 他: 臨床検査提要 第32版(金原出版): 265~295, 2005.
好酸球数	金井 正光, 他: 臨床検査提要 第32版(金原出版): 265~295, 2005.
末梢血液像	西 国広, 他: 血液形態観察のすすめ方 第2版: 1~288, 1995. 巽 典之, 他: 自動血液検査品質保証論: 26~27, 2005.
鼻汁中好酸球	奥田 稔: 臨床検査29(3): 267~272, 1985.
β -トロポグロブリン(β -TG)	高橋 芳右, 他: 血液と脈管18(4): 326~335, 1987.
血小板第4因子(PF-4)	高橋 芳右, 他: 血液と脈管18(4): 326~335, 1987.
プロトロンビン時間(PT)	高宮 脩: 臨床検査機器・試薬17(6): 1079~1085, 1994.
活性化部分 トロポプラスチン時間(APTT)	日野 志郎: 臨床検査講座15 血液学: 244~250, 1984.
フィブリノーゲン	金井 正光, 他: 臨床検査法提要33: 358~360, 2010.
凝固因子活性検査 第Ⅱ因子(F2)	安達 眞二: Medical Technology 24(6): 629~633, 1996.
凝固因子活性検査 第Ⅴ因子(F5)	安達 眞二: Medical Technology 24(6): 629~633, 1996.
凝固因子活性検査 第Ⅶ因子(F7)	安達 眞二: Medical Technology 24(6): 629~633, 1996.
凝固因子活性検査 第Ⅷ因子(F8)	安達 眞二: Medical Technology 24(6): 629~633, 1996.
凝固因子活性検査 第Ⅸ因子(F9)	安達 眞二: Medical Technology 24(6): 629~633, 1996.
凝固因子活性検査 第Ⅹ因子(F10)	安達 眞二: Medical Technology 24(6): 629~633, 1996.
凝固因子活性検査 第ⅩⅠ因子(F11)	安達 眞二: Medical Technology 24(6): 629~633, 1996.
凝固因子活性検査 第ⅩⅡ因子(F12)	安達 眞二: Medical Technology 24(6): 629~633, 1996.
凝固因子活性検査 第ⅩⅢ因子(F13)	Fickenscher K et al: Thrombosis and Haemostasis 65(5): 535~540, 1991.
凝固抑制因子検査 第Ⅷ(8)因子	Sirridge MS et al: Laboratory Evaluation of Hemostasis and Thrombosis 3rd: 196~198, 1983.
凝固抑制因子検査 第Ⅸ(9)因子	Sirridge MS et al: Laboratory Evaluation of Hemostasis and Thrombosis 3rd: 196~198, 1983.
フォン・ウィルブランド因子抗原定量	Stufano F. et al: Haemophilia 20(1): 147~153, 2014.
フォン・ウィルブランド因子活性(リストセチンコファクター)	Stufano F. et al: Haemophilia 20(1): 147~153, 2014.
フォン・ウィルブランド因子マルチマー解析	Susan Oliver et al: international journal of laboratory hematology 41(6): 762~771, 2019.
プラスミノゲン	Friberger P et al: Haemostasis 7: 138~145, 1978.
アンチプラスミン(α 2プラスミンインヒビター)	Friberger P et al: Haemostasis 7: 138~145, 1978.

検査項目

測定参考文献

血液学的検査

アンチトロンビンⅢ(ATⅢ)	Scully MF et al : Clinica Chimica Acta 79 : 595~602, 1977.
FDP定量(血漿)	長野 美恵子, 他 : 医療と検査機器・試薬27(1) : 23~29, 2004.
FDP定量(尿)	堀内 伸純, 他 : 臨床検査機器・試薬14(2) : 267~270, 1991.
可溶性フィブリンモノマー複合体(SFMC)	八戸 雅彦, 他 : 臨床病理60(12)別冊, 1139~1144, 2012.
フィブリンモノマー複合体定量	内藤 澄悦, 他 : 医学と薬学48(4) : 595~599, 2002.
Dダイマー	大石 彩, 他 : Sysmex Journal Web 17(4) : 1~10, 2016.
α_2 プラスミンインヒビター・プラスミン複合体(PICテスト)	徐 吉夫, 他 : 臨床検査機器・試薬16(6) : 1107~1113, 1993.
トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(TAT)	木村 真波, 他 : 医療と検査機器・試薬33(4) : 525~533, 2010.
プロトロンブフラグメントF1+2	Pelzer H et al : Thrombosis and Haemostasis 65(2) : 153~159, 1991.
プロテインC(抗原量)	筒井 聡明, 他 : 検査と技術12(7) : 581~587, 1984.
プロテインC活性	藤岡 貴, 他 : 医学と薬学73(5) : 621~626, 2016.
プロテインS(抗原量)	安藤 秀実, 他 : 機器・試薬41(5) : 509~519, 2018.
プロテインS活性	藤岡 貴, 他 : 医学と薬学73(5) : 621~626, 2016.
プロテインS(遊離型抗原量)	安藤 秀実, 他 : 機器・試薬41(5) : 509~519, 2018.
トータルPAI-1(tPA・PAI-1複合体)	曾我部 万紀, 他 : 医学のあゆみ173(12) : 997~998, 1995.
トロンボモジュリン	小野 真弓, 他 : 日本臨床検査自動化学会誌38(1) : 114~117, 2013.

一般検査

尿中一般検査	金井 泉, 他 : 臨床検査法提要 第30版(金原出版) : 99~105, 1993.
便中ヘモグロビン及びトランスフェリン	加藤 節子, 他 : 機器・試薬29(5) : 473~478, 2006.
便中ヘモグロビン	加藤 節子, 他 : 機器・試薬29(5) : 473~478, 2006.

微生物学的検査

一般細菌 (塗抹鏡検, 培養同定, 嫌気性培養, 感受性検査, 尿中生菌数定量, 目的菌, 環境検査, 便検診検査)	Kring NR, et al : Bergey's Manual of Systematic Bacteriology vol.1 Williams & Wilkins, 1984. Kring NR, et al : Bergey's Manual of Systematic Bacteriology vol.2 Williams & Wilkins, 1986. 小酒井 望 : 臨床検査技術全書7 微生物検査 初版 医学書院, 1974. 微生物検査必携 細菌・真菌検査(厚生省監修) 第3版 財団法人日本公衆衛生協会, 1987. 日本化学療法学会抗菌薬感受性測定法検討委員会報告(1989年) : Chemotherapy 38(1) : 102~105, 1990. 抗菌感受性測定法検討委員会報告(1992年) : Chemotherapy 41(2) : 183~190, 1993. 三原 利仁, 他 : 臨床と微生物23(2) : 249~254, 1996. 川上 小夜子, 他 : 日本臨床微生物雑誌12(2) : 86~92, 2002. Clinical Microbiology Procedures Handbook-4th edition, 2016. 永沢 善三, 他 : 日本臨床微生物雑誌 第27巻 : 臨床微生物質量分析計検査法ハンドブック : 5~40, 2017.
ヘリコバクター培養同定・感受性検査	後藤 陽一郎 : 検査と技術21(13) : 1061~1066, 1993. 日本化学療法学会抗菌薬感受性測定法検討委員会 : ヘリコバクターピロリ委員会 : 日本化学療法学会誌50(1) : 54~58, 2002.
CDトキシシン(GDH)	蔵田 訓 : 臨床と微生物37(5) : 465~470, 2010. AJIT P. LIMAYE, 他 : JOURNAL of CLIMICALMICROBIOLOGY 38(4) : 1696~1697, 2000.

薬物検査

フェノバルビタール	石橋 みどり, 他 : 医学と薬学42(6) : 1061~1074, 1999.
ブリミドン	宮本 侃治 : 臨床化学6(3) : 202~211, 1978.
フェニトイン	石橋 みどり, 他 : 医学と薬学42(6) : 1061~1074, 1999.
カルバマゼピン	石橋 みどり, 他 : 医学と薬学42(6) : 1061~1074, 1999.
エトサキシミド	宮本 侃治 : 臨床化学6(3) : 202~211, 1978.
バルプロ酸	石橋 みどり, 他 : 医学と薬学42(6) : 1061~1074, 1999.
ゾニサミド	安田 真依, 他 : 医療と検査機器・試薬38(2) : 205~210, 2015.
トリメタジオン	斉藤 正行, 他 : ドラッグレベルモニタリング 治療への臨床化学的アプローチ : 100~110, 1982.
ジアゼパム	Brodie RR et al : Journal of Chromatography 150 : 361~366, 1978.

検査項目	測定参考文献
薬物検査	
レベチラセタム	Mendu, D R, Soldin S J : Clinical Biochemistry 43 : 485~489, 2010.
トピラマート	Matar, K M : Clinica Chimica Acta 411 : 729~734, 2010.
アセタゾラミド	Sadee W et al : ドラッグレベルモニタリング : 90~91, 1982.
ラコサミド	Drew Payto, et al : Bioanalysis 6(23) : 3161~3168, 2014.
リチウム	細羽 恵美子, 他 : 臨床化学46(1) : 39~46, 2017.
ハロペリドール	白井 晶子, 他 : 医学と薬学49(6) : 1011~1017, 2003.
プロムペリドール	白井 晶子, 他 : 医学と薬学50(1) : 101~107, 2003.
ジゴキシン	水内 由利, 他 : 医学と薬学35(4) : 847~851, 1996.
リドカイン	宮本 侃治 : 臨床化学6(3) : 202~211, 1978.
ジソピラミド	扇谷 茂樹, 他 : 臨床検査機器・試薬6(2) : 520~523, 1983.
ビルメノール	市川 林, 他 : 臨床医薬11(4) : 903~906, 1995.
プロプラノロール	Ahnoff M et al : Journal of Chromatography 340 : 73~138, 1985.
ゲンタマイシン	石橋 みどり, 他 : 医学と薬学42(6) : 1061~1074, 1999.
トブラマイシン	木村 英樹, 他 : 日本臨床検査自動化学会誌33(5) : 860~864, 2008.
アミカシン	木村 英樹, 他 : 日本臨床検査自動化学会誌33(5) : 860~864, 2008.
バンコマイシン	石澤 春美, 他 : 栃木県臨床衛生検査技士会雑誌8(2) : 103~107, 2013.
テイコプラニン	諸岡 美里, 他 : JJCLA 38(1) : 79~82, 2013.
サリチル酸	木村 英樹, 他 : 日本臨床検査自動化学会誌33(5) : 860~864, 2008.
アセトアミノフェン	木村 英樹, 他 : 日本臨床検査自動化学会誌33(5) : 860~864, 2008.
シクロスポリン	大前 星佳, 他 : 医学と薬学81(3) : 257~261, 2024.
タクロリムス	岡崎 一幸, 他 : 医学と薬学79(8) : 1109~1116, 2022.
メトトレキサート	中原 佑香里, 他 : 医学と薬学72(4) : 761~767, 2015.
テオフィリン	石橋 みどり, 他 : 医学と薬学42(6) : 1061~1074, 1999.
イマニチブ	Bakhtiar R, et al : Journal of Chromatography B 768 : 325~340, 2002.
細胞性免疫検査	
PHAによるリンパ球幼若化検査	笠原 忠, 他 : 臨床検査23(7) : 660~667, 1979.
Con-Aによるリンパ球幼若化検査	笠原 忠, 他 : 臨床検査23(7) : 660~667, 1979.
薬剤によるリンパ球刺激試験(DLST)	北見 啓之, 他 : 臨床免疫15(9) : 727~736, 1983.
アミノ酸解析サービス	
男性AIRS(認知機能評価あり)	Kazutaka Shimbo et al : Biomedical Chromatography 24 : 683~691, 2010.
女性AIRS(認知機能評価あり)	Kazutaka Shimbo et al : Biomedical Chromatography 24 : 683~691, 2010.
男性AIRS(認知機能評価なし)	Kazutaka Shimbo et al : Biomedical Chromatography 24 : 683~691, 2010.
女性AIRS(認知機能評価なし)	Kazutaka Shimbo et al : Biomedical Chromatography 24 : 683~691, 2010.
男性AIRS(5種)	Kazutaka Shimbo et al : Biomedical Chromatography 24 : 683~691, 2010.
女性AIRS(6種)	Kazutaka Shimbo et al : Biomedical Chromatography 24 : 683~691, 2010.

専用容器の取り扱い方法

検体の採取・取り扱い方法

血 液

〔採血時間〕 一般的に早朝安静空腹時(緊急性や指定条件を除き)を原則としています。

〔検体採取〕

- 血液 所定の抗凝固剤入り採血容器にて採血後、速やかに転倒混和させ、特に指定が無い場合、室温および冷蔵保存の場合はこのままで、凍結保存の場合は提出容器に移して指定の保存条件にてご提出ください。
- 血清 必要量の3倍量を目安に血液を採血してください。
特に指定が無い場合、採血後室温に静置させ、凝固を確認後3000rpm10～15分間遠心分離してください。
遠心分離後、上清を提出容器に移し、指定の保存条件にてご提出ください。
保存条件は検査項目により異なりますので、各検査項目の保存条件をご参照ください。
- 血漿 必要量の3倍量を目安に血液を採血してください。
特に指定が無い場合、所定の抗凝固剤入り採血容器にて採血後、速やかに転倒混和させ、3000rpm10～15分間遠心分離してください。
遠心分離後、上清を提出容器に移し、指定の保存条件にてご提出ください。
採取方法および保存条件は検査項目により異なりますので、各検査項目の備考および保存条件、専用容器の取り扱い方法をご参照ください。

〔注意事項〕

- 真空採血にあたり
容器の規定採血量より少ない場合、容器内部が陰圧状態のままとなり溶血を引き起こす原因となります。必ず、指定容量を採取してください。
- シリンジ採血にあたり
シリンジから注射針を外し、採血管の側面に沿わせてゆっくりと注入してください。
- 溶血を避けるにあたり
採血時に無理な圧力や泡立ちを避けてください。
十分に乾燥した採血容器を用いてください。
物理的刺激(極度の高温や低温、振動など)を避けてください。


尿

〔部分尿〕

採尿容器に尿を採取して、必要量を提出容器に移し、指定の保存条件にてご提出ください。
採尿時間を指定している検査項目もありますので、各検査項目の備考および専用容器の取り扱い方法をご参照ください。

〔24時間蓄尿〕

蓄尿開始時に完全に排尿させ(捨てる)、それ以降の翌日同時刻までに排尿した尿の全てを蓄尿容器に採尿します。蓄尿の間は、蓄尿容器に蓋をして冷暗所にて保存してください。
蓄尿終了後、蓄尿量を測定し、よく混和させ必要量を提出容器に移し蓄尿時間と蓄尿量を記入のうえ指定の保存条件にてご提出ください。
防腐・安定化などの目的で蓄尿開始時に添加剤を必要とする場合がありますので、各検査項目の備考をご参照ください。



専用容器について

各頁掲載の専用容器は弊社にて準備してございますので担当営業員にお申し付けください。
なお、有効期間につきましては目安とお考えください。

汎用容器

容 器 形 態	検 査 項 目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	検体の取り扱い方法																													
01  8.5mL用  5mL用	分離剤入り (真空採血量 8.5mL又は5mL) 貯蔵方法 室温 有効期間 1年	生化学検査一般 血清学的検査一般 その他	適量	適量	左図の容器に、検査項目に応じて必要量を採血した後、4～5回静かに転倒混和し、室温にて30～60分放置してください。 血液の凝固を確認後、遠心分離し容器⊗（ポリスピッツ）に血清を分注しご提出ください。 検体量不足にならないようご注意ください。 遠心分離は、2000Gで10分間遠心してください。 (下表は2000Gにおけるローターの回転半径と回転数との関係を示します。) <table><caption>換 算 表</caption><tr><th>半径(cm)</th><th>回転数(rpm)</th><th>半径(cm)</th><th>回転数(rpm)</th></tr><tr><td>10</td><td>4200</td><td>22</td><td>2800</td></tr><tr><td>12</td><td>3800</td><td>24</td><td>2700</td></tr><tr><td>14</td><td>3500</td><td>26</td><td>2600</td></tr><tr><td>16</td><td>3300</td><td>28</td><td>2500</td></tr><tr><td>18</td><td>3100</td><td>30</td><td>2400</td></tr><tr><td>20</td><td>3000</td><td></td><td></td></tr></table>	半径(cm)	回転数(rpm)	半径(cm)	回転数(rpm)	10	4200	22	2800	12	3800	24	2700	14	3500	26	2600	16	3300	28	2500	18	3100	30	2400	20	3000		
半径(cm)	回転数(rpm)	半径(cm)	回転数(rpm)																														
10	4200	22	2800																														
12	3800	24	2700																														
14	3500	26	2600																														
16	3300	28	2500																														
18	3100	30	2400																														
20	3000																																
02  9mL用  5mL用	分離剤なし (真空採血量 9mL又は5mL) 貯蔵方法 室温 有効期間 1年	薬物検査	適量	適量	左図の容器に、検査項目に応じて必要量を採血した後、4～5回静かに転倒混和し、室温にて30～60分放置してください。 血液の凝固を確認後、遠心分離し容器⊗（ポリスピッツ）に血清を分注しご提出ください。また、項目（頁参照）により血餅が必要な場合があります。 遠心分離は、2000Gで10分間遠心してください。 (下表は2000Gにおけるローターの回転半径と回転数との関係を示します。) <table><caption>換 算 表</caption><tr><th>半径(cm)</th><th>回転数(rpm)</th><th>半径(cm)</th><th>回転数(rpm)</th></tr><tr><td>10</td><td>4200</td><td>22</td><td>2800</td></tr><tr><td>12</td><td>3800</td><td>24</td><td>2700</td></tr><tr><td>14</td><td>3500</td><td>26</td><td>2600</td></tr><tr><td>16</td><td>3300</td><td>28</td><td>2500</td></tr><tr><td>18</td><td>3100</td><td>30</td><td>2400</td></tr><tr><td>20</td><td>3000</td><td></td><td></td></tr></table>	半径(cm)	回転数(rpm)	半径(cm)	回転数(rpm)	10	4200	22	2800	12	3800	24	2700	14	3500	26	2600	16	3300	28	2500	18	3100	30	2400	20	3000		
半径(cm)	回転数(rpm)	半径(cm)	回転数(rpm)																														
10	4200	22	2800																														
12	3800	24	2700																														
14	3500	26	2600																														
16	3300	28	2500																														
18	3100	30	2400																														
20	3000																																

専用容器の取り扱い方法

容器形態		容器形態	
X ポリスピッツ 尿用 	X 新容器記号 A00 分離血清・血漿用 	Y 尿用容器 新容器記号 U00 	尿用容器

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
E 	フッ化Na入り (真空採血量2mL) 内 容 フッ化Na 2.5mg ヘパリンNa 25uspu EDTA-2Na 7.4mg 貯蔵方法 室温 有効期間 2年	ヘモグロビンA1c (HbA1c) (NGSP)	血液 2.0 (フッ化Na加)		冷蔵 左図の容器に採血し、よく混和させ、冷蔵保存してください。 左図の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。 血漿は冷蔵保存してください。
	グルコース	血液 1.5~2.0	血漿 0.5		

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
G 	EDTA-2K入り (真空採血量2mL) 内 容 EDTA-2K 2.4mg 貯蔵方法 室温 有効期間 2年	末梢血液一般検査	血液 (EDTA-2K加) 2.0		冷蔵 左図の容器に採血し、よく混和させ、冷蔵保存してください。 溶血、凝固および凍結検体は測定できません。 検体は採取後、当日中にご提出ください。
		網状赤血球数			
		好酸球数			
		末梢血液像			

細菌容器

容器形態	検査項目	容器形態	検査項目
r1 滅菌ポリスピッツ  貯蔵方法 室温	細菌検査(培養) (尿・皮膚・爪) (各種材料, 目的菌により異なりますが、いずれも検体を乾燥させないようにしてください。)	m1 血液カルチャーボトル(嫌気用) q1 血液カルチャーボトル(好気用)   抗生物質吸着中和剤入 貯蔵方法 室温 有効期間 9カ月 最適量 8~10mL (許容範囲 3~10mL)	細菌検査 (動脈血, 静脈血)
ℓ 滅菌喀痰採取容器 新容器記号 (X00)  貯蔵方法 室温	細菌検査(喀痰) (各種材料, 目的菌により異なりますが、いずれも検体を乾燥させないようにしてください。)	n シードチューブⅡ  内容: 寒天、塩化ナトリウム、リン酸塩等 貯蔵方法: 室温 有効期間: 製造から6ヵ月	細菌検査 (嫌気性菌培養用)
k eSwab105レギュラー FLOQスワブ k1 eSwab106ミニチップ FLOQスワブ   内容 アミューズ培地 1mL 貯蔵方法 室温 有効期間 1年3ヵ月	細菌検査 (咽液, 耳液, 分泌液, 便, 膿) (各種材料, 目的菌により異なりますが、いずれも検体を乾燥させないようにしてください。)	U1 キャリーブリア採便管  貯蔵方法 室温 有効期間 6ヵ月	細菌検査(便)

専用容器の取り扱い方法

容 器 形 態	検 査 項 目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保 存	検体の取り扱い方法
A 新容器記号 PN7 	抗利尿ホルモン(AVP)	血液 各4.0~5.0	速やかに 冷却遠心 血漿 各1.5	凍結	左図の容器に採血し、速やかによく混和させ、低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。
	カテコールアミン3分画 A:アドレナリン NA:ノルアドレナリン DA:ドーパミン				
	ドーパミン総				
	L-ドーパ		血漿 各1.5	凍結	左図の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。
	VMA				
	HVA				
	MHPG		速やかに 冷却遠心 血漿 1.5	凍結	左図の容器に採血し、速やかによく混和させ、低温(4℃)で900rpm20分間(PRP)または1,500rpm10分間(P)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。
	セロトニン				
	5-HIAA		血漿 1.5		左図の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。
	水痘・带状疱疹 ウイルスDNA定性	血液 (EDTA-2Na加) 各5.0		冷蔵	左図の容器に採血し、よく混和させ、冷蔵保存してください。他項目との重複依頼は避けてください。本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。
	単純ヘルペスウイルス DNA定量				
	単純ヘルペスウイルス DNA定性				
	ヒトヘルペスウイルス 6型DNA定性				
	ヒトヘルペスウイルス 7型DNA定性				
	サイトメガロウイルス DNA定性				
	サイトメガロウイルス pp65抗原(C10, C11)				
	EBウイルスDNA定量				左図の容器に採血し、よく混和させ、冷蔵保存してください。他項目との重複依頼は避けてください。本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。

EDTA-2Na入り
(真空採血量7mL)

内 容
EDTA-2Na
10.5mg
貯蔵方法
室温
有効期間
2年

専用容器の取り扱い方法

容 器 形 態	検 査 項 目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保 存	検体の取り扱い方法
A 新容器記号 (PN7) 	HTLV- I (ATLV) プロウイルスDNA 定性	血液 (EDTA-2Na加) 各7.0		冷蔵	左図の容器に採血し、よく混和させ、冷蔵保存してください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。
	HTLV- I 核酸検出 定性				
	HTLV- I (ATLV) プロウイルスDNA (クロナリティ)				
EDTA-2Na入り (真空採血量7mL) 内 容 EDTA-2Na 10.5mg 貯蔵方法 室温 有効期間 2年					左図の容器に採血し、よく混和させ、冷蔵保存してください。

容 器 形 態	検 査 項 目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保 存	検体の取り扱い方法
B 新容器記号 (PAC) 	PAIgG (血小板関連IgG)	血液 7.5	血液 (ACD-A液加) 7.5	冷蔵	指定の採取量を採血し、左図の容器に注入し、よく混和させ、冷蔵保存してください。 (注) 末梢血の血小板数が $3 \times 10^4 / \mu\text{L}$ 以下の場合は、専用容器2本を使用し必ず10mL以上採血してください。
ACD-A保存液入り 内 容 ACD-A保存液 貯蔵方法 室温 有効期間 1年 (アルミ包装 開封後1カ月)					

容 器 形 態	検 査 項 目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保 存	検体の取り扱い方法
b2 新容器記号 (U90) 	FDP定量	部分尿 (新鮮尿) 2	部分尿 (上清) 0.5	凍結	新鮮尿を採取し、左図の容器に注入し、よく混和後、3000rpm5～10分間遠心分離してください。 上清(部分尿)は必ず凍結保存してください。
抗プラスミン剤入り 内 容 アプロチニン 精製ゼラチン デヒドロ酢酸 ナトリウム 貯蔵方法 室温 有効期間 2年 (アルミ包装 開封後1週間)					

専用容器の取り扱い方法

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
 2mL用  5mL用	副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)	血液 各1.5~2.0	冷却 遠心 血漿 0.5	凍結	早朝安静時に左図の容器に採血し、よく混和させ、低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。
	副甲状腺ホルモン (Whole PTH)		血漿 0.5		左図の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。
	セロトニン	血液 (EDTA-2Na加) 1.0			左図の容器に採血し、よく混和させた後、血液をポリスピッツに移し、必ず凍結保存してください。
	コルチゾール	血液 各1.5~2.0	血漿 0.2		早朝安静時に左図の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。血漿は凍結保存してください。
	アルドステロン		血漿 0.5		
	ヒト脳性ナトリウム 利尿ペプチド(BNP)		速やかに 遠心 血漿 0.5		安静時に左図の容器に採血し、よく混和させ、冷蔵保存にて6時間以内に血漿分離してください。血漿は速やかに凍結保存してください。
	レニン活性(PRA) [EIA]		冷却 遠心 血漿 0.3	凍結	左図の容器に採血し、よく混和させ、低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。
	レニン濃度(ARC) [CLEIA]	血液 各2.0~3.0	冷却 遠心 血漿 0.5		
	アルドステロン/ レニン活性比		冷却 遠心 血漿 0.8		
	アルドステロン/ レニン濃度比		冷却 遠心 血漿 1.0		
	ペントラキシン3 (PTX3)	血液 各1.5~2.0	速やかに 冷却遠心 血漿 0.3		左図の容器に採血し、速やかによく混和させ、低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。
	サイクリックAMP		冷却 遠心 血漿 各0.3		左図の容器に採血し、よく混和させ、低温(4℃)で血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。
	PIVKA-II	血液 1.5~2.0	血漿 0.5	冷蔵	左図の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。血漿は冷蔵保存してください。
	ガストリン放出 ペプチド前駆体 (ProGRP)	血液 1.5~2.0	血漿 0.4	凍結	左図の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。血漿は必ず凍結保存してください。
	サイトメガロウイルス pp65抗原(C7-HRP)	血液 (EDTA-2Na加) 3.0		室温	左図の容器に採血し、よく混和させ、室温保存してください。採血後速やかにご提出ください。採血後24時間以内の血液を使用しない場合、検出率の低下が認められます。
	イマチニブ	血液 1.5~2.0	血漿 0.3	冷蔵	左図の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。血漿は冷蔵保存してください。

C
新容器記号
PN2

2mL用

C
新容器記号
PN5

5mL用

EDTA-2Na入り
(真空採血量
2mLまたは5mL)
内 容
EDTA-2Na
3.0mgまたは
7.5mg
貯蔵方法
室温
有効期間
2年

専用容器の取り扱い方法

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法	
C 新容器記号 PN2  2mL用 C 新容器記号 PN5  5mL用	EDTA-2Na入り (真空採血量 2mLまたは5mL) 内 容 EDTA-2Na 3.0mgまたは 7.5mg 貯蔵方法 室温 有効期間 2年	ABO・Rh(D因子) 式血液型	血液 (EDTA-2Na加) 2.0	冷蔵	左図の容器に採血し、よく混和させ、冷蔵保存してください。	
		Rh-Hr式血液型				
		直接クームス試験	血液 (EDTA-2Na加) 1.0			溶血、凝固および凍結検体は測定できません。 検体は採取後、当日中にご提出ください。
		不規則性抗体 (抗体同定・抗体価測定)	血液 10.0～15.0 (別容器②に採血) と 血液 2.0	速やかに遠心 血清 5.0と	冷蔵	血液2.0mLを左図の容器に採血し、よく混和させ、室温保存で速やかにご提出ください。 また、別容器②に血液 9.0～15.0mL採血し、速やかに血清分離し、冷蔵保存してください。 他項目との重複依頼は避けてください。
			血液 (EDTA-2Na加) 2.0		室温	
		血液型不適合妊娠	血液 10.0～12.0 (別容器②に採血) と 血液 2.0	速やかに遠心 血清 4.0と	冷蔵	血液2.0mLを左図の容器に採血し、よく混和させ、室温保存で速やかにご提出ください。 また、別容器②に血液9.0～12.0mL採血し、速やかに血清分離し、冷蔵保存してください。 他項目との重複依頼は避けてください。
			血液 (EDTA-2Na加) 2.0		室温	
		腓ホスホリパーゼA ₂ (腓PLA ₂)		血漿 0.3		左図の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。 血漿は必ず凍結保存してください。
		アミノ酸分析(39種) [LC/MS]				
		アミノ酸分析(9種) [LC/MS]	血液 各1.5～2.0	速やかに冷却遠心 血漿 各0.5	凍結	左図の容器に採血し、速やかによく混和させ、低温(4℃)で血漿分離してください。 血漿は必ず凍結保存してください。
アミノ酸分析2種類 (チロシン・フェニルアラニン)[LC/MS]						
総ホモシステイン		血漿 0.3	冷蔵	左図の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。 血漿は冷蔵保存してください。		
C 新容器記号 PN5  5mL用	EDTA-2Na入り (真空採血量5mL) 内 容 EDTA-2Na 7.5mg 貯蔵方法 室温 有効期間 2年	男性AICS (5種)	血液 3.0～5.0	速やかに冷却遠心 血漿 0.5	凍結	1. EDTA・2Na入り採血チューブにて血液約5mLを採取してください。 2. 採血直後、血液を2～3回軽く転倒混和してください(ローラでの混和は行わないでください)。 3. 混和後直ちに(1分以内)採血チューブを氷水中(血液の液面まで氷水につかる状態)で冷却(15分間以上、遠心操作まで冷却)してください。 4. 採血から8時間以内に冷却条件で遠心分離(4℃, 3,000回転, 15分)または通常遠心分離(3,000回転, 15分, ローターが昇温していないこと)してください。 5. 遠心後、直ちに上清の血漿を血液との界面に触れないように血漿上清の中央部から採取し、分注してください。 6. 分注後、血漿を4時間以内に凍結保存してください。
		女性AICS (6種)				

専用容器の取り扱い方法

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
D 新容器記号 (PAP) 	EDTA-2Na+ アプロチニン入り (真空採血量3mL)	血液 各1.5~2.0	冷却 遠心 血漿 各0.5	凍結	左図の容器に採血し、よく混和させ、低温(4℃)で血漿分離してください。 血漿は必ず凍結保存してください。
	内 容 EDTA-2Na 3.75mg アプロチニン (1500単位)				
	貯蔵方法 室温 有効期間 1年	血液 各1.5~2.0	速やかに 冷却遠心 血漿 0.5		安静時に指定の採取量を左図の容器に採血し、よく混和させ、低温(4℃)で血漿分離してください。 血漿は必ず凍結保存してください。

容器形態	検査項目	保存	採取方法
d4 新容器記号 (F20) 	便中ヘリコバクター ピロリ抗原	冷蔵	1. (準備) 容器の白ラベルを途中まではがし氏名・日付等を記入し、また巻いてください。ピンクの採便棒を回して引き抜いてください。 2. (便をとる) 採便棒先端の溝すべてが便でうまるように、便の表面をこすりとってください。 3. (便をとったあと) 採便棒を容器にもどして根元までしっかりねじ込んでください。再び開けないでください。 4. (保管上の注意) 添付のビニール袋に入れて提出まで冷暗所に保管してください。採便後は、すみやかに提出してください。 (注) 出来るだけ新しい便を提出してください。 (注) 採便容器の緑キャップは、絶対にはずしたり、ゆるめたりしないでください。
内 容 貯蔵方法 有効期間 ほう酸1.0mL 室温 1年			

容器形態	検査項目	保存	採取方法
d8 便中ヘモグロビン及びトランスフェリン専用容器 新容器記号 (F80)  内容 保存液 貯蔵方法 室温 有効期間 1年	便中ヘモグロビン及びトランスフェリン	冷蔵	●採取方法 1. キャップを回してスティックを取り出し、便の表面をまんべんなくこすり採ります。 2. 1回だけ差し込み、キャップをしっかり締めます。 3. 袋に入れ冷蔵保存し、ご提出ください ●注意事項 1. 容器の中の保存液は捨てないでください。 2. 便は溝が埋まるくらい採ります。採りすぎ、少なすぎにご注意ください。 採便時の食事制限はありません。
	便中ヘモグロビン定性〔金コロイド法〕		
	便中ヘモグロビン定量〔金コロイド法〕		

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
e 新容器記号 (SZZ)  内容 トロンビンヘパリン中和剤 貯蔵方法 室温 有効期間 1年	アルミニウム (Al)	血液 2.0~3.0	血清 1.0	冷蔵	コンタミネーション防止のため、シャントから滴下または真空採血してください。 採血後は直ちに十分転倒混和し、遠心分離後そのまま冷蔵保存にてご提出ください。

専用容器の取り扱い方法

容 器 形 態	検 査 項 目	保 存	検体の取り扱い方法	
F3 新容器記号 V50  内 容 グアニジン塩酸塩 貯蔵方法 室温 有効期間 1年	クラミジア トラコマトリス DNA	冷蔵	1	スワブ検体採取セット付属の1本目のスワブで子宮頸管とその周辺部の過剰な粘液を充分拭い取ります。
	淋菌DNA		2	付属されている2本目のスワブを子宮頸管内に挿入します。同じ方向にそっと5回スワブを回します。
	淋菌およびクラミジア トラコマトリス DNA同時同定		3	専用容器のキャップを開け、採取したスワブの先端の綿球が容器内の溶液に漬からないように注意しながら入れ、柄につけられた黒い線を専用容器の縁に合わせます。
			4	専用容器の縁を利用して、スワブの柄につけられた線で折り入れキャップをしっかりと閉め、冷蔵保存にて提出してください。

容 器 形 態	
f 新容器記号 X10 細胞診(喀痰集細胞法) 内 容 サコマノ氏液、粘液融解剤 貯蔵方法 室温(冷暗所) 有効期間 製造から 1年	

容 器 形 態	検 査 項 目	保 存	採 取 方 法
f6 新容器記号 V41  内 容 メタノール55%含有 貯蔵方法 室温 有効期間 1年6カ月	細胞診(婦人科) [ベセスダシステム]	室温	①子宮頸部の細胞を採取する 綿棒以外の採取器具(ブラシ、スパーテル)を用いて細胞を採取してください。
	細胞診(婦人科CR)		②細胞を洗い落とす 採取器具を容器に入れ、容器の底で採取器具の先端が広がるように10回程度押し付けた後、強くかき回して採取した細胞を洗い落としてください。
	ヒトパピローマ ウイルスDNA (16型, 18型, その他 ハイリスクグループ)		③しっかりフタを閉める 採取器具を取り出し、蓋の黒いラインが容器本体の黒いラインを左に超えるように、しっかり蓋を閉め、室温保存してください。 (注)採取器具の先端は容器に残さないでください。
	ヒトパピローマ ウイルス(HPV) ジェノタイプ判定		【ご注意】 妊婦より細胞を採取する場合は、安全性を考慮し、ブラシ、スパーテル等の採取器具の使用は避け、綿棒を使用してください。ただし、綿棒で検査に必要な細胞量を採取するために、採取前に別の綿棒で粘液を除去し、採取に使用した綿棒を保存液中で十分にすすぎ、採取した細胞を洗い落としてください。容器には綿棒の先端を残さないで室温保存してください。また、綿棒では無理な力がかかりますと折れる可能性がありますので十分にご注意ください。
	細胞診 (婦人科LBC)		
	細胞診 (婦人科LBC) [ベセスダシステム]		

専用容器の取り扱い方法

容 器 形 態		検 査 項 目		採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
G 新容器記号 PH5 	ヘパリン入り (真空採血量5mL) 内 容 ヘパリンNa 65IU 貯蔵方法 室温 有効期間 2年	結核菌特異的 IFN-γ	血液 (ヘパリン加) 5.0			室温	本図の容器に採血し、よく混和させ、室温保存(18~25℃)してください。検体は採取後、当日中にご提出ください。
		脂肪酸分画	血液 各1.5~2.0	血漿 各0.5	凍結	早朝空腹時に左図の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。 血漿は凍結保存してください。	
		極長鎖脂肪酸	血液 4.0~5.0	血漿 2.0		左図の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。 血漿は凍結保存してください。	
		リポ蛋白リパーゼ (LPL)	血液 1.5~2.0	速やかに 冷却速心 血漿 0.3		早朝空腹時にヘパリンを体重1kgあたり30単位静注し、15分後に左図の容器に採血し低温(4℃)で遠心分離してください。 血漿は必ず凍結保存してください。	
		ニコチン酸 (ナイアシン)	血液 (ヘパリン加) 1.5		冷蔵	左図の容器に採血し、よく混和させた後、血液をポリスピッツに移し、冷蔵保存してください。	
		鉛(Pb)	血液 (ヘパリン加) 3.0			左図の容器に採血し、よく混和させ、冷蔵保存してください。	
		クロム	血液 (ヘパリン加) 各0.7				
		マンガン					
		カドミウム	血液 (ヘパリン加) 0.5				
		エタノール	血液 (ヘパリン加) 1.0		凍結	左図の容器に採血し、よく混和させた後、血液をポリスピッツに移し、必ず凍結保存してください。	
		フェノバルビタール	血液 各1.5~2.0	血漿 0.2	冷蔵	左図の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。 血漿は冷蔵保存してください。	
		プリミドン		血漿 0.3			

容 器 形 態		検 査 項 目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保 存	検体の取り扱い方法
G 新容器記号 PH5  ヘパリン入り (真空採血量5mL) 内 容 ヘパリンNa 65IU 貯蔵方法 室温 有効期間 2年	フェニトイン	血液 各1.5～2.0	血漿 各0.2	冷蔵	左図の容器に採血し、よく混和させ、血漿分離してください。 血漿は冷蔵保存してください。	
	カルバマゼピン					
	エトスクシミド					
	レベチラセタム		血漿 各0.3			
	トピラマート					
	ラモトリギン		血漿 各0.5			
	ガバペンチン					
	ジソピラミド		血漿 0.3			
	プロカインアミド		血漿 0.4			
	ピルシカイニド		血漿 各0.5			
	シベンゾリン					
	フレカイニド		血漿 0.3			
	ピルメノール	血液 3.0～4.0	血漿 1.3			
	アブリンジン	血液 各1.5～2.0	血漿 0.5			
	ベプリジル		血漿 0.5			
	アミオダロン		血漿 0.6			
	プロプラノロール		血漿 0.3			
	ポリコナゾール		血漿 0.5			
	メトトレキサート	血液 2.0～3.0	血漿 1.0			

専用容器の取り扱い方法

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
G3 新容器記号 (PHS) 	ヘパリン入り (真空採血量4mL) 内 容 ヘパリンNa 83.6単位 貯蔵方法 室温 有効期間 18カ月 (アルミ包装 開封後1カ月)	遮光 コプロポリフィリン	血液 (ヘパリン加) 各1.5	冷蔵	左図の遮光容器に採血し、よく混和させ、冷蔵保存してください。 血液は必ず遮光容器にてご提出ください。
		遮光 ウロポリフィリン			
		遮光 プロトポリフィリン			

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
g1 新容器記号 (PKF) 	EDTA-2K入り (真空採血量2mL) 内 容 EDTA-2K 3.6mg 貯蔵方法 室温 有効期間 1年	シクロスポリン	血液 (EDTA-2K加) 0.7	凍結	左図の容器に採血し、よく混和させ、血液のまま凍結保存してください。 他の検査項目との同時依頼はできませんのでご注意ください。
		タクロリムス	血液 (EDTA-2K加) 0.7		左図の容器に採血し、よく混和させ、血液のまま凍結保存してください。 他の検査項目との同時依頼はできませんのでご注意ください。 投与量を明記してください。
		エベロリムス	血液 (EDTA-2K加) 1.0		

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
g4 新容器記号 (PNS) 	EDTA-2Na入り (真空採血量2mL) 貯蔵方法 EDTA-2Na 5mg 貯蔵方法 室温 有効期間 製造から 1年6カ月	遮光 ビタミンB ₁	血液 (EDTA-2Na加) 各0.5	凍結	左図の遮光容器に採血し、よく混和させ、凍結保存してください。 血液は必ず遮光容器にてご提出ください。
		遮光 ビタミンB ₂			

容器形態

i 貯蔵方法 室温

新容器記号

ASS



遮光ポリスピッツ

容 器 形 態	検 査 項 目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
 K1 3.2%クエン酸 ナトリウム入り (真空採血量1.8mL) 内 容 3.2%クエン酸Na 0.2mL 貯蔵方法 室温 有効期間 1年	プロトロンビン時間 (PT)	血液 各1.8	速やかに遠心 血漿 各0.5	凍結	3.2%のクエン酸 ナトリウム0.2mLに 血液 1.8mLの割合で採血し、転倒混和を5～6回 繰り返した後、速やかに血漿分離してくださ い。 血漿は必ず凍結保存してください。 (複数の検査項目をご依頼される場合で、採 血量が1.8mL以上の場合、(L) の容器をご利 用ください。)
	活性化部分 トロンボ プラスチン時間 (APTT)				
	フィブリノゲン				
	HIT抗体(血小板第4因子・ ヘパリン複合体抗体)		速やかに遠心 血漿 0.5	凍結	3.2%のクエン酸 ナトリウム0.2mLに 血液 1.8mLの割合で採血し、転倒混和を5～6回 繰り返した後、速やかに血漿分離してくださ い。血漿は必ず凍結保存してください。
	C1インアクチベーター活性 (C1エステラーゼインヒター活性)		速やかに遠心 血漿 0.2		
	FDP定量		速やかに遠心 血漿 0.2		
	第Ⅱ因子(F2)		速やかに遠心 血漿 各0.3		
	第Ⅴ因子(F5)				
	第Ⅶ因子(F7)				
	第Ⅷ因子(F8)				
	第Ⅸ因子(F9)				
	第Ⅹ因子(F10)		速やかに遠心 血漿 0.4	凍結	3.2%のクエン酸 ナトリウム0.2mLに 血液 1.8mLの割合で採血し、転倒混和を5～6回 繰り返した後、速やかに血漿分離してくださ い。 血漿は必ず凍結保存してください。 (複数の検査項目をご依頼される場合で、採 血量が1.8mL以上の場合、(L) の容器をご利 用ください。)
	第ⅩⅠ因子(F11)				
第ⅩⅡ因子(F12)					
第ⅩⅢ因子(F13)					

専用容器の取り扱い方法

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
K1  3.2%クエン酸 ナトリウム入り (真空採血量1.8mL) 内 容 3.2%クエン酸Na 0.2mL 貯蔵方法 室温 有効期間 1年	フォン・ウィルブランド 因子抗原定量	血液 各1.8	速やかに 遠心 血漿 0.2	凍結	3.2%のクエン酸ナトリウム0.2mLに血液 1.8mLの割合で採血し、転倒混和を5～6回 繰り返した後、速やかに血漿分離してくださ い。 血漿は必ず凍結保存してください。 (複数の検査項目をご依頼される場合で、採 血量が1.8mL以上の場合、(L) の容器をご利 用ください。)
	フォン・ウィルブランド 因子活性 (リストセチンコファクター)		速やかに 遠心 血漿 各0.5		
	フォン・ウィルブランド 因子マルチマー解析				
	プラスミノゲン				
	アンチプラスミン (α2プラスミンインヒビター)				
	アンチトロンビンⅢ (ATⅢ)				
	ヘパリン		速やかに 遠心 血漿 0.3	3.2%のクエン酸ナトリウム0.2mLに血液 1.8mLの割合で採血し、転倒混和を5～6回 繰り返した後、速やかに血漿分離してくださ い。 血漿は必ず凍結保存してください。 (複数の検査項目をご依頼される場合で、採 血量が1.8mL以上の場合、(L) の容器をご利 用ください。) (注意事項) * トータルPAI-1につきましては以下の点に ご注意ください。 1. 採取容器は(K1) を用い、必ず冷却遠心し てください。室温遠心や容器 (L) での採 血はデータが高値となるため、避けてく ださい。 2. 速やかに分離できない場合は、氷水中に 保存し、1時間以内に分離してください。	
	可溶性フィブリン モノマー複合体(SFMC)				
	フィブリンモノマー 複合体定量		速やかに 遠心 血漿 各0.5		
	Dダイマー		速やかに 遠心 血漿 0.2		
	α ₂ プラスミン インヒビター・ プラスミン複合体 (PICテスト)		速やかに 遠心 血漿 0.5		
	トロンビン・ アンチトロンビン 複合体(TAT)		速やかに 遠心 血漿 各0.3		
	プロトロンビン フラグメントF1+2		速やかに 遠心 血漿 各0.2		
	プロテインC(抗原量)				
	プロテインC活性				
	プロテインS(抗原量)		速やかに 遠心 血漿 各0.2		
	プロテインS活性				
	プロテインS (遊離型抗原量)		速やかに 冷却遠心 血漿 0.5		
	トータルPAI-1 (tPA・PAI-1複合体)		速やかに 遠心 血漿 0.4		

専用容器の取り扱い方法

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
L 新容器記号 (PC5) 	遮光 ビタミンK分画	血液 各4.5	速やかに遠心 血漿 2.5	凍結	3.2%のクエン酸ナトリウム0.5mLに血液4.5mLの割合で採血し、転倒混和を5~6回繰り返した後、速やかに血漿分離してください。 血漿は必ず「遮光ポリスピッツ」(i)にてご提出ください。 血漿は必ず凍結保存してください。
	内 容 3.2%クエン酸Na 0.5mL 貯蔵方法 室温 有効期間 1年 (25本入りプラスチックケース 開封後1カ月)		速やかに遠心 血漿 1.0		採血後、速やかに室温で1500G以上15分間遠心後、パフィーコートより5mm以上うえから血漿を採取して凍結保存にてご提出ください。血小板の混入は、測定結果に影響しますのでご注意ください。 ※遠心器回転数の計算式 $G = 1.118 \times 10^{-5} \times r \times n^2$ r: 遠心器のローター半径(cm) n: 1分間あたりの回転数(rpm)
	凝固抑制因子検査 第Ⅷ(8)因子 第Ⅸ(9)因子		速やかに遠心 血漿 各1.0		3.2%のクエン酸ナトリウム0.5mLに血液4.5mLの割合で採血し、転倒混和を5~6回繰り返した後、速やかに血漿分離してください。 血漿は必ず凍結保存してください。



















容器形態	
貯蔵方法 室温 L2 新容器記号 (XC0)	 結石専用容器

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
ℓ 新容器記号 (X00) 	滅菌喀痰採取容器 貯蔵方法 室温 マイコプラズマニューモニエDNA 結核菌群核酸同定 (TRC) MAC核酸同定 (TRC) ニューモシスチス・イロペチイDNA定性	喀痰 各2.0		凍結	他項目との重複依頼は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。

専用容器の取り扱い方法

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
P1 新容器記号 (S5F)  5mL採血用	HBV DNA定量 (IU)	血液 5.0	血清 1.8		指定の採取量を左図の容器に採取後、4～5回静かに転倒混和し、室温にて30～60分放置してください。凝固完了を確認後、遠心分離しそのまま凍結してご提出ください。 左記項目以外との重複依頼は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。
	HCV RNA コアジェノタイプ	血液 各3.0	血清 各0.5	凍結	指定の採取量を左図の容器に採取後、4～5回静かに転倒混和し、室温にて30～60分放置してください。凝固完了を確認後、遠心分離しそのまま凍結してご提出ください。 左記項目以外との重複依頼は避けてください。 なお、左記項目内重複依頼の場合は、5mL採血用容器をご使用ください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。
	HCV RNA 1b(NS5A)				
	HCV DCV耐性変異 (L31/Y93)				
	HCV RNA定量	血液 5.0	血清 1.8		指定の採取量を左図の容器に採取後、4～5回静かに転倒混和し、室温にて30～60分放置してください。凝固完了を確認後、遠心分離しそのまま凍結してご提出ください。 左記項目以外との重複依頼は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。

容 器 形 態	検 査 項 目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
P3 新容器記号 PSF 	EDTA-2K+ 血漿分離剤入り (真空採血量5mL) 貯蔵方法 4～25℃ 有効期間 製造から1年	HIV-1RNA定量	血液 各5.0	血漿 各1.8	凍結 指定の採取量を左図の容器に採血後、4～5回静かに転倒混和し、室温にて遠心分離しそのまま凍結してご提出ください。 他項目との重複依頼は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので検体採取にあたっては取り扱いに充分ご注意ください。

容器形態	検査項目	保存	採 取 方 法																																																																																																			
<div><div><div>Q</div><div>新容器記号</div><div>PBT</div></div><div></div><div><div>(真空採血禁止)</div><div>抗血小板剤入り</div></div></div> <div>β-トロンボ グロブリン(β-TG)</div> <div rowspan="7">凍結</div> <tr><td></td><td>あらかじめ専用容器 (Q) を冷却しておいてください。</td><td>砕氷水の水面より専用容器中の液面が下になるようにしてください。 角氷は使用しないでください。</td></tr> <tr><td></td><td>できるだけ20ゲージ (19～21ゲージでも可) の針を用いたプラスチック注射器で血液3.0mL を採取してください。(採血にあたって、専用容器 (Q) を使用しての直接採血は絶対にしないでください。)</td><td>真空採血管、カテーテルおよび他の方法は使用しないでください。 また、駆血帯も使用しないでください。 10mL 以上の採血は避け、出来るだけ血管壁を損傷しないようにスムーズに採血してください。</td></tr> <tr><td></td><td>針を取って静かに専用容器 (Q) のフタを開け、血液2.7mL を静かに移し、ゆっくり2～3回反転倒混和してください。</td><td>指定の専用容器以外は使用しないでください。 専用容器は振とうさせないでください。</td></tr> <tr><td></td><td>専用容器を速やかに砕氷と水の入ったラックに入れてください。</td><td>砕氷水の水面より専用容器中の血液液面が下になるようにしてください。</td></tr> <tr><td colspan="2">以上の操作を2分以内に行ってください。</td></tr> <tr><td></td><td>砕氷水に15～30分間放置後、採取血液を2,000G で30分間、2～4℃で遠心分離してください。(右表は2,000G におけるローターの回転半径と回転数との関係を示します。) * 遠心回転数の計算式 $G = 1.118 \times 10^{-5} \times r \times n^2$ r : 遠心器のローター半径 (cm) n : 1分間あたりの回転数 (rpm)</td><td>1時間以内に必ず冷却下で遠心分離してください。</td></tr> <tr><td rowspan="2"></td><td>上清の表面よりやや下の部分をマイクロピペットで各0.3mL 検体容器へ採取してください。 血餅に近い部分からの採取は絶対に避けてください。 (血漿の全量採取は避けてください。) 検体は必ず凍結保存してください。 (1ヵ月安定)</td><td><table><tr><th colspan="4">換 算 表</th></tr><tr><th>半径 (cm)</th><th>回転数 (rpm)</th><th>半径 (cm)</th><th>回転数 (rpm)</th></tr><tr><td>10</td><td>4,200</td><td>22</td><td>2,800</td></tr><tr><td>12</td><td>3,800</td><td>24</td><td>2,700</td></tr><tr><td>14</td><td>3,500</td><td>26</td><td>2,600</td></tr><tr><td>16</td><td>3,300</td><td>28</td><td>2,500</td></tr><tr><td>18</td><td>3,100</td><td>30</td><td>2,400</td></tr><tr><td>20</td><td>3,000</td><td></td><td></td></tr></table></td></tr> <tr><td>内容</td><td>血小板第4因子 (PF-4)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>テオフィリン</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>アデノシン</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ジピリダモール</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>クエン酸ナトリウム</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>クエン酸</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>貯蔵方法</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>遮光・冷蔵</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>有効期間</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1年</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		あらかじめ専用容器 (Q) を冷却しておいてください。	砕氷水の水面より専用容器中の液面が下になるようにしてください。 角氷は使用しないでください。		できるだけ20ゲージ (19～21ゲージでも可) の針を用いたプラスチック注射器で血液3.0mL を採取してください。(採血にあたって、専用容器 (Q) を使用しての直接採血は絶対にしないでください。)	真空採血管、カテーテルおよび他の方法は使用しないでください。 また、駆血帯も使用しないでください。 10mL 以上の採血は避け、出来るだけ血管壁を損傷しないようにスムーズに採血してください。		針を取って静かに専用容器 (Q) のフタを開け、血液2.7mL を静かに移し、ゆっくり2～3回反転倒混和してください。	指定の専用容器以外は使用しないでください。 専用容器は振とうさせないでください。		専用容器を速やかに砕氷と水の入ったラックに入れてください。	砕氷水の水面より専用容器中の血液液面が下になるようにしてください。	以上の操作を2分以内に行ってください。			砕氷水に15～30分間放置後、採取血液を2,000G で30分間、2～4℃で遠心分離してください。(右表は2,000G におけるローターの回転半径と回転数との関係を示します。) * 遠心回転数の計算式 $G = 1.118 \times 10^{-5} \times r \times n^2$ r : 遠心器のローター半径 (cm) n : 1分間あたりの回転数 (rpm)	1時間以内に必ず冷却下で遠心分離してください。		上清の表面よりやや下の部分をマイクロピペットで各0.3mL 検体容器へ採取してください。 血餅に近い部分からの採取は絶対に避けてください。 (血漿の全量採取は避けてください。) 検体は必ず凍結保存してください。 (1ヵ月安定)	<table><tr><th colspan="4">換 算 表</th></tr><tr><th>半径 (cm)</th><th>回転数 (rpm)</th><th>半径 (cm)</th><th>回転数 (rpm)</th></tr><tr><td>10</td><td>4,200</td><td>22</td><td>2,800</td></tr><tr><td>12</td><td>3,800</td><td>24</td><td>2,700</td></tr><tr><td>14</td><td>3,500</td><td>26</td><td>2,600</td></tr><tr><td>16</td><td>3,300</td><td>28</td><td>2,500</td></tr><tr><td>18</td><td>3,100</td><td>30</td><td>2,400</td></tr><tr><td>20</td><td>3,000</td><td></td><td></td></tr></table>	換 算 表				半径 (cm)	回転数 (rpm)	半径 (cm)	回転数 (rpm)	10	4,200	22	2,800	12	3,800	24	2,700	14	3,500	26	2,600	16	3,300	28	2,500	18	3,100	30	2,400	20	3,000			内容	血小板第4因子 (PF-4)				テオフィリン					アデノシン					ジピリダモール					クエン酸ナトリウム					クエン酸					貯蔵方法					遮光・冷蔵					有効期間					1年				
		あらかじめ専用容器 (Q) を冷却しておいてください。	砕氷水の水面より専用容器中の液面が下になるようにしてください。 角氷は使用しないでください。																																																																																																			
		できるだけ20ゲージ (19～21ゲージでも可) の針を用いたプラスチック注射器で血液3.0mL を採取してください。(採血にあたって、専用容器 (Q) を使用しての直接採血は絶対にしないでください。)	真空採血管、カテーテルおよび他の方法は使用しないでください。 また、駆血帯も使用しないでください。 10mL 以上の採血は避け、出来るだけ血管壁を損傷しないようにスムーズに採血してください。																																																																																																			
		針を取って静かに専用容器 (Q) のフタを開け、血液2.7mL を静かに移し、ゆっくり2～3回反転倒混和してください。	指定の専用容器以外は使用しないでください。 専用容器は振とうさせないでください。																																																																																																			
		専用容器を速やかに砕氷と水の入ったラックに入れてください。	砕氷水の水面より専用容器中の血液液面が下になるようにしてください。																																																																																																			
	以上の操作を2分以内に行ってください。																																																																																																					
		砕氷水に15～30分間放置後、採取血液を2,000G で30分間、2～4℃で遠心分離してください。(右表は2,000G におけるローターの回転半径と回転数との関係を示します。) * 遠心回転数の計算式 $G = 1.118 \times 10^{-5} \times r \times n^2$ r : 遠心器のローター半径 (cm) n : 1分間あたりの回転数 (rpm)	1時間以内に必ず冷却下で遠心分離してください。																																																																																																			
	上清の表面よりやや下の部分をマイクロピペットで各0.3mL 検体容器へ採取してください。 血餅に近い部分からの採取は絶対に避けてください。 (血漿の全量採取は避けてください。) 検体は必ず凍結保存してください。 (1ヵ月安定)	<table><tr><th colspan="4">換 算 表</th></tr><tr><th>半径 (cm)</th><th>回転数 (rpm)</th><th>半径 (cm)</th><th>回転数 (rpm)</th></tr><tr><td>10</td><td>4,200</td><td>22</td><td>2,800</td></tr><tr><td>12</td><td>3,800</td><td>24</td><td>2,700</td></tr><tr><td>14</td><td>3,500</td><td>26</td><td>2,600</td></tr><tr><td>16</td><td>3,300</td><td>28</td><td>2,500</td></tr><tr><td>18</td><td>3,100</td><td>30</td><td>2,400</td></tr><tr><td>20</td><td>3,000</td><td></td><td></td></tr></table>	換 算 表				半径 (cm)	回転数 (rpm)	半径 (cm)	回転数 (rpm)	10	4,200	22	2,800	12	3,800	24	2,700	14	3,500	26	2,600	16	3,300	28	2,500	18	3,100	30	2,400	20	3,000																																																																						
	換 算 表																																																																																																					
半径 (cm)	回転数 (rpm)	半径 (cm)	回転数 (rpm)																																																																																																			
10	4,200	22	2,800																																																																																																			
12	3,800	24	2,700																																																																																																			
14	3,500	26	2,600																																																																																																			
16	3,300	28	2,500																																																																																																			
18	3,100	30	2,400																																																																																																			
20	3,000																																																																																																					
内容	血小板第4因子 (PF-4)																																																																																																					
テオフィリン																																																																																																						
アデノシン																																																																																																						
ジピリダモール																																																																																																						
クエン酸ナトリウム																																																																																																						
クエン酸																																																																																																						
貯蔵方法																																																																																																						
遮光・冷蔵																																																																																																						
有効期間																																																																																																						
1年																																																																																																						

専用容器の取り扱い方法

容器形態

r 貯蔵方法 室温
新容器記号
(ARR)



滅菌ポリスピッツ

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
r3 新容器記号 (M30) 	除蛋白液入り (内容量1mL) 内 容 0.8N過塩素酸 貯蔵方法 冷蔵 有効期間 1年	乳酸 ビルビン酸	血液 各1.0	速やかに遠心 除蛋白液 各0.4 冷蔵	採血後、直ちに正確に血液1.0mLを専用容器に加え、十分攪拌後3000rpm5分間遠心分離し、その上清液をご提出ください。




容 器 形 態	検 査 項 目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
r4 新容器記号 M40 	除蛋白液入り (内容量4mL) 内 容 タングステン酸Na, 硫酸 貯蔵方法 冷蔵 有効期間 1年 アンモニア	血液 1.0	速やかに遠心 除蛋白液 3.0	凍結	採血後、直ちに正確に血液1.0mLを専用容器に加え、十分攪拌後3000rpm5分間遠心分離し、その上清液をご提出ください。

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
r5 新容器記号 (M50) 	除蛋白液入り (内容量0.5mL) 内 容 0.8N過塩素酸 貯蔵方法 冷蔵 有効期間 1年	ビタミンC (アスコルビン酸) 遮光	血清 0.5	除蛋白上清 0.5 凍結	採血後、直ちに血清分離し、正確に血清0.5mLを専用容器に加え、十分攪拌後3000rpm5分間遠心分離し、その上清液を遮光ポリスピッツ(i)に移し替え、凍結してご提出ください。

専用容器の取り扱い方法

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
t 新容器記号 (Z10) 	特殊染色標本作成		血液塗抹標本 必要枚数		血液塗抹標本をご提出ください。 室温保存してください。
	鼻汁中好酸球		鼻汁塗抹標本 2~3枚		標本は新鮮鼻汁で作成しご提出ください。 室温保存してください。



容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
T3 新容器記号 (PE2) 	(真空採血量2mL) エンドトキシン定量		血液 (ノボヘパリン加) 各2.0		左図の容器に採血し、よく混和してください。 室温保存ではデータ影響が認められるため、 速やかに冷蔵保存してください。 β-D-グルカン以外との重複依頼は避けてください。
	β-D-グルカン				左図の容器に採血し、よく混和してください。 速やかに冷蔵保存してください。 エンドトキシン定量以外との重複依頼は避けてください。

容器形態	検査項目	保存	検体の取り扱い方法
T4 新容器記号 (PE4) 	(真空採取量:4.0mL) 内容 安定化剤 0.1mL 貯蔵方法 冷蔵 有効期間 1年	冷蔵 	 1 T4容器のカラーキャップを矢印の方向に引き上げ、アルミ部分を切らないように、(カラーキャップが完全に外に落ちないように)開け、ゴム栓部分を消毒用アルコール綿で拭きます。  2 無菌的に透析液を注射針付きのシリンジで採取し、T4容器のゴム栓部に刺します。  3 注入が終わりましたら、カラーキャップを元通りに被せ、ただちに4回ほど容器を振り、安定化剤を均質に混ぜ、速やかに冷蔵保存し、提出してください。


専用容器の取り扱い方法

容器形態		検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
U 	糞便容器 貯蔵方法 室温	アデノウイルスDNA 定性	糞便 500mg62		凍結	糞便500mgを指定の容器に入れ、必ず凍結保存してください。 他項目との重複依頼は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。


容器形態		容器形態	
u1 凍結組織材料作製セット 新容器記号 VP1		u5 病理専用容器 新容器記号 VP0	
貯蔵方法 室温 有効期間 製造から1年		貯蔵方法 室温	10%～20%ホルマリン液を充填してお使いください。



容器形態	検査項目	保存	検体の取り扱い方法
V 新容器記号 V10  ウイルス専用保存液入り 貯蔵方法 冷蔵 有効期間 6ヵ月	ウイルス分離		●患部ぬぐい液・水疱内容・糞便 等 滅菌綿棒でぬぐい、下図の採取方法でウイルス専用保存液に採取し、冷蔵保存してください。 
	ウイルス同定	冷蔵	●尿・髄液・胸水・鼻汁 等 下図の採取方法でウイルス専用保存液と等量の検体を採取し、冷蔵保存してください。  液状検体(尿等)は、ウイルス専用保存液と等量混合してください。検体量が保存液より少ない場合、保存液は捨てずに、そのままご提出可能な量の検体を入れてください。 ●組織 組織小片(5mm角程度)をウイルス専用保存液に入れ、冷蔵保存してください。

容器形態	検査項目	保存
W1 新容器記号 V30  貯蔵方法 室温 有効期間 製造から1年	単純ヘルペスウイルス特異抗原 水痘・帯状疱疹ウイルス抗原 ●検体の採取方法 病巣基底細胞が多数得られるように採取してください。 早期の水疱病巣が検体として最適です。水疱内容液および膿は、検体として不適当です。 ①滅菌針を用いて、上部の皮あるいは痂皮を剥がします。(図1) ②病巣を覆っていた上部の皮を、ピンセット等で除去します。(図2) ③綿棒を精製水や生理食塩水で軽く湿らせます。 ④ウイルス感染細胞は、病巣基底部にありますので、病巣基底部全面を綿棒で強くぬぐいます。(図3) ●注意 膿がでている場合には綿棒でまず膿をぬぐい取り、別の綿棒で検体を採取してください。この時、病巣基底部をかき乱さないよう注意してください。 ●操作法 ●検体の塗抹 ①綿棒を回転させながらスライドガラスの2個の円内に塗りつけます。このとき綿棒は、スライドガラスに平行にして、全表面が触れるように塗抹します。不均一にならないように注意してください。(図4) ②綿棒をすてる前に検体が均一に広がっているかどうか確認します。均一になっていれば不透明に見えます。透明に見える部分があれば、そこへ綿棒をあてて再び塗抹します。 ③そのまま風乾します。 ④乾燥したスライドガラス上に十分な量(検体にゆきわたる)のアセトンを添加し、蒸発させます。 ・検体はスライドガラス2枚をご提出ください。 ●検体の保存 乾燥後のスライドガラスは、塗抹面を下にし、オブジェクトケースに入れ、検査項目名、病院名、氏名等を記入後、凍結保存してください。	凍結









専用容器の取り扱い方法

容器形態	検査項目	保存	採取方法	
W5 新容器記号 VP5  内容抽出液 貯蔵方法室温 有効期間1年	ヒト癌胎児性 フィブロネクチン	凍結		専用綿棒を後陰円蓋に挿入し、約10秒間回して分泌物を吸収させます。 ※腔表面を強くこすらないでください。 ※粘液は混入させないでください。
				検体抽出容器の紫色キャップをはずし、分泌液を吸収させた綿棒を浸けて、5回程度綿棒を回します。(この際、容器から液がこぼれないよう注意してください。)
				綿棒を検体抽出容器から引き抜きます。
				検体抽出容器に検体濾過フィルターを取り付けます。
				検体抽出液の全量を検体保存チューブに滴下し、チューブの蓋を締めて必ず凍結保存してください。
			●注意事項 ・検体の採取は腔洗浄前に行ってください。 ・検体中に精液が混入しているときは、その検体は使用しないでください。 ・検体中に0.1%以上の血液混入が認められた場合、正確な結果が得られない可能性があります。 ・検体は後陰円蓋から採取してください。 ・腔表面を強くこすらないように注意してください。	

容器形態	検 査 項 目		保存
W6 新容器記号 VP6 	子宮頸管粘液中 顆粒球エラストラーゼ		凍結
	採 取 方 法		
	正しい採取部位 	子宮腔部の粘液を綿球で丁寧に拭き取ります。	●注意事項 1) 子宮頸管部より採取してください。 2) 検体採取は腔部洗浄前に行ってください。 3) 綿棒が外子宮口周辺の分泌物や粘液に接触しないようにしてください。綿棒の先が初めて接触する部分が頸管内腔であるように挿入してください。 4) 綿棒1回転あたり約5秒をかけ、自然に粘液を浸み込ませるようにしてください。少量の固形物が付着した場合には、接子等で取り除いてください。 
		綿球を子宮頸管内腔に挿入します。注3)	
		綿棒をゆっくりと2回転させ、頸管粘液を採取します。注4)	
内 容 抽出液 (リン酸バッファー) 貯蔵方法 室温 (抽出液は冷蔵) 有効期間 1年	①	抽出液の入った抽出容器の青いキャップをはずします。	③ 綿棒に浸み込んだ検体抽出液を抽出容器ごと指で押しつぶす等して絞り出した後、綿棒を取り除きます。
	②	頸管粘液を採取した綿棒を浸けて、2～3分間放置します。その後、綿棒を20～30回細かく上下させて検体を抽出します。	
	④	フィルターをセットします。	
	⑤	検体抽出液を検体保存容器へ濾過します。この時の加圧は1回のみとし、5～7滴(約300μL)を分取します。必要量が得られない場合は検体採取からやり直してください。検体保存容器に白色キャップをして保存します。冷蔵(8℃)で3日以内、冷凍(−15℃以下)で3カ月以内に測定してください。	

容 器 形 態	検 査 項 目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
X6  貯蔵方法 室温 有効期間 製造日より5年	尿素呼吸試験	250mL以上		室温	空腹時に実施願います。 検査薬ユービットの服用前後の呼吸を用いた測定の為、前後ペア提出してください。

専用容器の取り扱い方法

容器形態	検査項目	保存
Y1 新容器記号 U10 滅菌スポイト 滅菌カップ  内 容 グアニジン塩酸塩 貯蔵方法 室温 有効期間 1年	クラミジアトラコマティスDNA 淋菌DNA 淋菌およびクラミジアトラコマティスDNA同時測定 ●尿検体からの採取 最後の排尿から少なくとも1時間以上経過後の初尿を採取してください。 ①滅菌済みカップに初尿を採取し、滅菌済みスポイトを用いて初尿を専用容器に移します。 ②専用容器に記載されている2つのラインの間に収まるように初尿を加えてください。 ③専用容器のキャップをしっかりと閉めてください。 ④専用容器を5回転倒混和して冷蔵にて提出してください。     ●うがい液からの採取 検体採取前の食事・うがい・歯磨き・ガムを噛むことなどは避けてください。 ①滅菌生理食塩水をカップに15～20mL入れ口に含み、顔を上に向けて10～20秒間、勢いよくうがいを行ないます。 ②うがい液全量をコップに回収し、スポイトで専用容器に記載されている2つのラインの間に収まるように添加します。 ③専用容器のキャップをしっかりと閉め、5回転倒混和して冷蔵保存にて提出してください。    	冷蔵

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
Y5 新容器記号 U50  保存剤入り (容器容量10mL) 貯蔵方法 室温 有効期間 2年	尿中ミオグロビン		部分尿 6	冷蔵	採取した尿を速やかに専用容器 (Y5) のラベルに印刷してある線まで入れ、よく混和させ冷蔵保存にてご提出ください。 凍結保存は避けてください。

容器形態	検査項目	採取量 (mL)	提出量 (mL)	保存	検体の取り扱い方法
Y7 新容器記号 U70  Tris+Hcl入り (容器容量10mL) 内 容 1.5M Tris-Hcl 0.5mL 貯蔵方法 室温 有効期間 2年	尿中Ⅳ型コラーゲン		部分尿 5	冷蔵	早朝一番尿を採取し、左図の容器に注入し、よく混和させ、冷蔵保存してください。 凍結保存および他項目との重複依頼は避けてください。

	項目コード (統一コード)	検 査 項 目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値(単位) (治療濃度範囲)	備 考



臨床検査振興協議会

www.jpclt.org

ラボラトリーズ

本社ラボ (総合ラボ)	第8号	〒613-0046	京都府久世郡久御山町大橋辺16番地10	TEL 075-631-6181
京都ラボ	第1038号	〒604-0933	京都府京都市中京区御幸町通二条下る山本町425番地	TEL 075-354-6144
宇治ラボ	4山北保企第27号	〒611-0033	京都府宇治市大久保町南ノ口60-2	
大阪中央ラボ (地域基幹ラボ)	大阪市衛生検査所登録第64号	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町3丁目1番48号西本町ビル4階	TEL 050-2000-5048
舞鶴ラボ	中丹東 第2号	〒625-0062	京都府舞鶴市字森96番地3	TEL 0773-64-0828
北大阪ラボ	大阪府知事登録第154号	〒564-0004	大阪府吹田市原町2丁目45番1号	TEL 06-6384-4411
堺ラボ	大阪府知事登録第30号	〒593-8328	大阪府堺市西区鳳北町7丁目7番地	TEL 072-265-4141
西宮ラボ	西保総指令45号	〒663-8142	兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番24	
元町健診ラボ	神医第23D-002号	〒650-0022	兵庫県神戸市中央区元町通り2丁目8番地14号オルタンシアビル701号	
兵庫西ラボ	神医第20D-006号	〒651-2122	兵庫県神戸市西区玉津町高津橋136-3	TEL 050-2000-5409
阪奈ラボ	奈良県第18号	〒630-0252	奈良県生駒市山崎町5番21号	TEL 0743-75-6021
和歌山ラボ	登録第12号	〒640-8066	和歌山県和歌山市東布経丁3丁目1番	TEL 073-421-8280
田辺ラボ (血清分離ラボ)	登録第17号	〒646-0027	和歌山県田辺市朝日ヶ丘22番21号	TEL 0739-24-8582
浜田ラボ	第15号	〒697-0024	島根県浜田市黒川町4107番地	TEL 0855-23-4755
出雲ラボ	第14号	〒699-0722	島根県出雲市大社町北荒木1504番地	TEL 0853-53-5156
山口ラボ (血清分離ラボ)	第113号	〒754-0024	山口県山口市小郡若草町2番21号	TEL 083-972-6853
前橋ラボ	前保第10号	〒379-2141	群馬県前橋市鶴光路町141-15	TEL 027-265-6498
長野ラボ	第86号	〒380-0918	長野県長野市アークス1番19号	TEL 026-223-6311
伊那ラボ	第85号	〒396-0026	長野県伊那市西町4931-3	TEL 026-223-6311

関連事業

サブライ事業

〒593-8328 大阪府堺市西区鳳北町7丁目7番地

TEL 072-265-7631

医薬品分析センター

〒570-0033 大阪府守口市大宮通1丁目13番36号

TEL 06-6995-2680



株式会社 日本医学臨床検査研究所

ホームページ <https://www.jcl.co.jp/>

本 社 〒613-0046

京都府久世郡久御山町大橋辺16番地10 TEL 075-631-6181



日本医学臨床検査研究所HP

検査データのお問い合わせや、検査容器・依頼書のご請求、ご意見、ご指摘につきましては、最寄りの営業所へご連絡いただきますようお願い致します。

営業所・営業拠点

京 阪 営 業 所	〒613-0046	京都府久世郡久御山町大橋辺16番地10	TEL 075-631-6181
京都中央営業拠点	〒604-0933	京都府京都市中京区御幸町通二条下る山本町425番地	TEL 075-354-5191
舞鶴営業拠点	〒625-0062	京都府舞鶴市字森96番地3	TEL 0773-64-0828
敦賀出張所	〒914-0045	福井県敦賀市古田刈68号1015番シャロームⅡ103	TEL 0773-64-0828
阪 奈 営 業 所	〒630-0252	奈良県生駒市山崎町5番21号	TEL 0743-75-6021
大阪東営業拠点	〒570-0033	大阪府守口市大宮通1丁目13番36号	TEL 06-6991-3958
大阪中央営業所	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町3丁目1番48号西本町ビル3階	TEL 050-2000-5048
大阪北営業所	〒564-0004	大阪府吹田市原町2丁目45番1号	TEL 06-6384-4411
大阪南営業所	〒593-8328	大阪府堺市西区鳳北町7丁目7番地	TEL 072-265-4141
兵庫営業所	〒663-8142	兵庫県西宮市鳴尾浜2-1-24杏和総合医学検査センター内	TEL 050-2000-5407
兵庫西営業拠点	〒651-2122	兵庫県神戸市西区玉津町高津橋136-3	TEL 050-2000-5409
和歌山営業所	〒640-8066	和歌山県和歌山市東布経丁3丁目1番	TEL 073-421-8280
和歌山南営業拠点	〒646-0027	和歌山県田辺市朝日ヶ丘22番21号	TEL 0739-24-8582
新宮営業拠点	〒647-0044	和歌山県新宮市神倉4丁目1番47号	TEL 0735-23-1101
中国中央営業所	〒754-0024	山口県山口市小郡若草町2番21号	TEL 083-972-6853
浜田営業拠点	〒697-0024	島根県浜田市黒川町4107番地	TEL 0855-23-4755
出雲営業拠点	〒699-0722	島根県出雲市大社町北荒木1504番地	TEL 0853-53-5156
北関東営業所	〒379-2141	群馬県前橋市鶴光路町141-15	TEL 027-265-6498
長野営業所	〒380-0918	長野県長野市アークス1-19	TEL 026-223-6311

～ 私たちの住む地球はかけがえないものです ～

弊社は、地球環境保全の重要性を強く認識し、検査及び関連事業活動を通して環境に与える影響を常に監視し、使用する物質の適正管理、廃棄物の削減、省資源、省エネルギーに努めております。

検査案内書につきましても、環境への配慮から大豆油を含む環境配慮型インキと有害な廃液を排出しない水なし印刷を採用しており、「適切に管理された森林からの木材（認証材）」と「保護価値の高い森林や、違法伐採材等問題のある材を入れないように管理された木材（管理材）」から作られたFSC認証用紙を使用しております。（詳しくは下記のホームページをご参照下さい。）



この印刷物は、責任ある木質資源や再生資源を使用したFSC®認証用紙を使用しています。

<https://www.waterless.jp/>

<http://www.wwf.or.jp/activity/forest/sus-use/fsc/index.htm>